

経皮鎮痛消炎剤

ミルタックスパップ® 30mg**識別コード表示削除のご案内**

このたび、経皮鎮痛消炎剤「ミルタックスパップ30mg」につきまして内袋(6枚入り/袋・7枚入り/袋)に表示しておりました識別コードを今回の弊社本社移転に伴う住所表示変更時に併せて削除いたしましたので下記のとおりご案内申し上げます。

なお、識別コード削除品が既に出荷され、事前にご案内を申し上げず、多大なご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。


今後ともご指導、ご支援を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

記

対象製品

ミルタックスパップ30mg 240枚〔1袋(6枚)×40〕、720枚〔1袋(6枚)×120〕、560枚〔1袋(7枚)×80〕

変更内容

内袋(6枚入り/袋または7枚入り/袋)の裏面・左下に表示している識別コード「141」を削除いたしました。

削除理由

内袋に製品名が記載されていることから識別コードの併記は不要であるため削除いたしました。(詳細は裏面の変更前、変更後の写真をご覧ください。)















変更品の出荷時期、製造番号

品名	包装	統一商品コード	出荷時期	製造番号
ミルタックスパップ30mg	240枚〔1袋(6枚)×40〕	081-100439	2012年1月上旬	LJ360
	720枚〔1袋(6枚)×120〕	081-100446	2012年1月上旬	LJ361
	560枚〔1袋(7枚)×80〕	081-100453	2012年1月下旬	LJ373

※本変更は2011年11月にご案内しました「弊社本社移転に伴う添付文書、個装箱等の住所表示変更および日本薬局方収載に伴う表示変更、調剤包装単位コード表示等のご案内」の住所変更と併せて実施いたしました。

裏面もご覧ください。▶▶▶▶



変更前	→	変更後
<p>〈表面〉</p> <p>◀◀◀切り口（手で簡単に開封できます。）</p> <p>開封後はチャックを合わせて、しめてください。</p> <p style="text-align: right;">チャック</p> <p style="text-align: center;">外用薬 6枚</p> <p style="text-align: center;">経皮鎮痛消炎剤</p> <p style="text-align: center;">ミルタックスパップ® 30mg</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">様</p> <hr/> <p style="text-align: center;">患部に 1日 回 日分</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>使い方1: (肩 ひじ) などにはる場合</p> <p>①丸い部分を持ってはがします。</p>  <p>②粘着面を患部にはり残りのフィルムを引きます。</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>使い方2: (ひざ 足首) などにはる場合</p> <p>①左右にひっぱりず。</p>  <p>②粘着面を患部にはり両側のフィルムをはがします。</p>  </div> </div> <p>ご使用前には必ず裏面の注意をお読みください。</p> <p style="text-align: center;"> <small>プロパップ株式会社 第一三共トスフ株式会社 第一三共株式会社</small> <small>東京都江戸川区北葛西1-16-13</small> </p> <p style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px;">東京都江戸川区北葛西1-16-13</p>		<p>〈表面〉</p> <p>◀◀◀切り口（手で簡単に開封できます。）</p> <p>開封後はチャックを合わせて、しめてください。</p> <p style="text-align: right;">チャック</p> <p style="text-align: center;">外用薬 6枚</p> <p style="text-align: center;">経皮鎮痛消炎剤</p> <p style="text-align: center;">ミルタックスパップ® 30mg</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">様</p> <hr/> <p style="text-align: center;">患部に 1日 回 日分</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>使い方1: (肩 ひじ) などにはる場合</p> <p>①丸い部分を持ってはがします。</p>  <p>②粘着面を患部にはり残りのフィルムを引きます。</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>使い方2: (ひざ 足首) などにはる場合</p> <p>①左右にひっぱりず。</p>  <p>②粘着面を患部にはり両側のフィルムをはがします。</p>  </div> </div> <p>ご使用前には必ず裏面の注意をお読みください。</p> <p style="text-align: center;"> <small>プロパップ株式会社 第一三共トスフ株式会社 第一三共株式会社</small> <small>東京都中央区日本橋本町3-5-1</small> </p> <p style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px;">東京都中央区日本橋本町3-5-1</p>
<p>〈裏面〉</p> <p style="text-align: center;">ミルタックスパップ 30mg 6枚</p> <p>上手な貼り方：ミルタックスに切り込みを入れてはると関節を無理なく動かせます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p style="text-align: center;">※汗等をふき取り、患部を清潔にしてから貼ってください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>注意（医師・薬剤師の指導のもと下記のことにご注意して使用してください。）</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の方は必ず使用前に担当の医師または薬剤師に申し出てください。 <ol style="list-style-type: none"> 本剤もしくは本剤成分で過敏症を起こしたことのある方 ぜんそくを起こしたことのある方 医薬品や化粧品、日焼け止め等で過敏症を起こしたことのある方 光線過敏症の既往歴のある方 使用中または使用後は次のことに注意して使用してください。 <ol style="list-style-type: none"> 発疹・発赤、腫脹、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。 光によるかぶれを起こすことがあるので、はがした後も4週間程度は、はっていた部位に日光が当たらないようにしてください。（戸外に出る時は天候にかかわらず濃い色の衣服、サポーター等を着用し、はっていた部位を紫外線にあてないようにしてください。） 正しく安全に使用していただくため、処方された患者さん以外の方は使用しないでください。 <p style="text-align: center;">保管および取扱い上の注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 小児の手の届かない所に保管してください。 直射日光や高温の所をさけ、涼しい所に保管してください。 開封後は、開封口のチャックを合わせて、しめてください。 <p style="text-align: center;">D141 登録商標</p> </div> <p style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px;">D141 登録商標</p>		<p>〈裏面〉</p> <p style="text-align: center;">ミルタックスパップ 30mg 6枚</p> <p>上手な貼り方：ミルタックスに切り込みを入れてはると関節を無理なく動かせます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p style="text-align: center;">※汗等をふき取り、患部を清潔にしてから貼ってください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>注意（医師・薬剤師の指導のもと下記のことにご注意して使用してください。）</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の方は必ず使用前に担当の医師または薬剤師に申し出てください。 <ol style="list-style-type: none"> 本剤もしくは本剤成分で過敏症を起こしたことのある方 ぜんそくを起こしたことのある方 医薬品や化粧品、日焼け止め等で過敏症を起こしたことのある方 光線過敏症の既往歴のある方 使用中または使用後は次のことに注意して使用してください。 <ol style="list-style-type: none"> 発疹・発赤、腫脹、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。 光によるかぶれを起こすことがあるので、はがした後も4週間程度は、はっていた部位に日光が当たらないようにしてください。（戸外に出る時は天候にかかわらず濃い色の衣服、サポーター等を着用し、はっていた部位を紫外線にあてないようにしてください。） 正しく安全に使用していただくため、処方された患者さん以外の方は使用しないでください。 <p style="text-align: center;">保管および取扱い上の注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 小児の手の届かない所に保管してください。 直射日光や高温の所をさけ、涼しい所に保管してください。 開封後は、開封口のチャックを合わせて、しめてください。 <p style="text-align: center;">登録商標</p> </div> <p style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px;">登録商標</p>

※7枚入りの内袋も同様な変更となっています。

以上