

アンジオテンシン変換選択性阻害剤
 処方せん医薬品*
 日本薬局方 イミダプリル塩酸塩錠

イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg「DSEP」 イミダプリル塩酸塩錠 5mg「DSEP」

※注意-医師等の処方せんにより使用すること

効能・効果、用法・用量追加のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、このたび上記製品の効能・効果、用法・用量に「1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の追加が承認されましたので、下記の通りご案内申し上げます。
 今後とも引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

● 今回、追加された内容(下線部)

【効能・効果】

高血圧症、腎実質性高血圧症、1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症

【用法・用量】

○高血圧症、腎実質性高血圧症

通常、成人にはイミダプリル塩酸塩として5～10mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
 ただし、重症高血圧症、腎障害を伴う高血圧症又は腎実質性高血圧症の患者では2.5mgから投与を開始することが望ましい。

○1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症

通常、成人にはイミダプリル塩酸塩として5mgを1日1回経口投与する。ただし、重篤な腎障害を伴う患者では2.5mgから投与を開始することが望ましい。

【お願い】

- ・今般の「効能・効果」および「用法・用量」の追加に伴い「使用上の注意」も追加・改訂されております。「効能・効果／用法・用量／使用上の注意改訂のお知らせ」ならびに「改訂添付文書」をご参照賜りますようお願い申し上げます。
- ・流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数が必要ですので、ご使用に際しましては、「お知らせ」ならびに「改訂添付文書」をご参照賜りますようお願い申し上げます。

以上

