

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2008 に準拠して作成

高血圧症・狭心症治療薬／持続性 Ca 拮抗薬

劇薬、処方せん医薬品

日本薬局方アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠

アムロジピンOD錠2.5mg「NS」

アムロジピンOD錠5mg「NS」

AMLODIPINE OD TABLETS「NS」

剤形	OD錠2.5mg：錠剤（素錠：口腔内崩壊錠） OD錠5mg：錠剤（片面割線入り素錠：口腔内崩壊錠）
製剤の規制区分	劇薬、処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）
規格・含量	アムロジピン OD錠2.5mg「NS」： 1錠中アムロジピンベシル酸塩（日局）3.47mg （アムロジピンとして2.5mg）を含有 アムロジピン OD錠5mg「NS」： 1錠中アムロジピンベシル酸塩（日局）6.93mg （アムロジピンとして5mg）を含有
一般名	和名：アムロジピンベシル酸塩（JAN） 洋名：Amlodipine Besilate（JAN）
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2009年7月13日 薬価基準収載年月日：2009年11月13日 発売年月日：2009年11月13日
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	製造販売元：日新製薬株式会社 販売元：第一三共エスファ株式会社 販売提携：第一三共株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 TEL：0120-100-601 医療関係者向けホームページ： http://www.daiichisankyo-ep.co.jp/

本 IF は 2013 年 4 月改訂（第 8 版）の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/>にてご確認ください。

IF利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和63年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、IFと略す）の位置付け並びにIF記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成10年9月に日病薬学術第3小委員会においてIF記載要領の改訂が行われた。

更に10年が経過した現在、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成20年9月に日病薬医薬情報委員会において新たなIF記載要領が策定された。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

【IFの様式】

- ①規格はA4版、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁にまとめる。

【IFの作成】

- ①IFは原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ②IFに記載する項目及び配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠する。
- ③添付文書の内容を補完するとIFの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。

- ⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領2008」（以下、「IF記載要領2008」と略す）により作成されたIFは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[IFの発行]

- ①「IF記載要領2008」は、平成21年4月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ②上記以外の医薬品については、「IF記載要領2008」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはIFが改訂される。

3. IFの利用にあたって

「IF記載要領2008」においては、従来の主にMRによる紙媒体での提供に替え、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則で、医療機関でのIT環境によっては必要に応じてMRに印刷物での提供を依頼してもよいこととした。

電子媒体のIFについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IFを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IFは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、IFがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、今後インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2008年9月)

目 次

I. 概要に関する項目	1	9. 製剤中の有効成分の確認試験法	11
1. 開発の経緯	1	10. 製剤中の有効成分の定量法	11
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	11. 力 価	12
II. 名称に関する項目	2	12. 混入する可能性のある夾雑物	12
1. 販売名	2	13. 治療上注意が必要な容器に関する情報	12
(1) 和 名	2	14. その他	12
(2) 洋 名	2	V. 治療に関する項目	13
(3) 名称の由来	2	1. 効能又は効果	13
2. 一般名	2	2. 用法及び用量	13
(1) 和 名 (命名法)	2	3. 臨床成績	13
(2) 洋 名 (命名法)	2	(1) 臨床データパッケージ	13
(3) システム	2	(2) 臨床効果	13
3. 構造式又は示性式	2	(3) 臨床薬理試験：忍容性試験	13
4. 分子式及び分子量	2	(4) 探索的試験：用量反応探索試験	13
5. 化学名 (命名法)	2	(5) 検証的試験	13
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2	1) 無作為化並行用量反応試験	13
7. CAS登録番号	3	2) 比較試験	13
III. 有効成分に関する項目	4	3) 安全性試験	13
1. 物理化学的性質	4	4) 患者・病態別試験	13
(1) 外観・性状	4	(6) 治療の使用	14
(2) 溶解性	4	1) 使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・	
(3) 吸湿性	4	製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)	14
(4) 融点(分解点)、沸点、凝固点	4	2) 承認条件として実施予定の内容	
(5) 酸塩基解離定数	4	又は実施した試験の概要	14
(6) 分配係数	4	VI. 薬効薬理に関する項目	15
(7) その他の主な示性値	4	1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	15
2. 有効成分の各種条件下における安定性	4	2. 薬理作用	15
3. 有効成分の確認試験法	4	(1) 作用部位・作用機序	15
4. 有効成分の定量法	5	(2) 薬効を裏付ける試験成績	15
IV. 製剤に関する項目	6	(3) 作用発現時間・持続時間	15
1. 剤 形	6	VII. 薬物動態に関する項目	16
(1) 剤形の区別、規格及び性状	6	1. 血中濃度の推移・測定法	16
(2) 製剤の物性	6	(1) 治療上有効な血中濃度	16
(3) 識別コード	6	(2) 最高血中濃度到達時間	16
(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、		(3) 臨床試験で確認された血中濃度	16
無菌の旨及び安定なpH域等	6	(4) 中毒域	18
2. 製剤の組成	6	(5) 食事・併用薬の影響	18
(1) 有効成分(活性成分)の含量	6	(6) 母集団(ポピュレーション)解析により	
(2) 添加物	6	判明した薬物体内動態変動要因	19
(3) その他	6	2. 薬物速度論的パラメータ	19
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	6	(1) コンパートメントモデル	19
4. 製剤の各種条件下における安定性	7	(2) 吸収速度定数	19
5. 調製法及び溶解後の安定性	8	(3) バイオアベイラビリティ	19
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	8	(4) 消失速度定数	19
7. 溶出性	8	(5) クリアランス	19
8. 生物学的試験法	11	(6) 分布容積	19

(7) 血漿蛋白結合率	19	13. 過量投与	24
3. 吸 収	19	14. 適用上の注意	25
4. 分 布	19	15. その他の注意	25
(1) 血液－脳関門通過性	19	16. その他	25
(2) 血液－胎盤関門通過性	19		
(3) 乳汁への移行性	19	IX. 非臨床試験に関する項目	26
(4) 髄液への移行性	19	1. 薬理試験	26
(5) その他の組織への移行性	19	(1) 薬効薬理試験	26
5. 代 謝	20	(2) 副次的薬理試験	26
(1) 代謝部位及び代謝経路	20	(3) 安全性薬理試験	26
(2) 代謝に関与する酵素（CYP450等） の分子種	20	(4) その他の薬理試験	26
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	20	2. 毒性試験	26
(4) 代謝物の活性の有無及び比率	20	(1) 単回投与毒性試験	26
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	20	(2) 反復投与毒性試験	26
6. 排 泄	20	(3) 生殖発生毒性試験	26
(1) 排泄部位及び経路	20	(4) その他の特殊毒性	26
(2) 排泄率	20		
(3) 排泄速度	20	X. 管理的事項に関する項目	27
7. 透析等による除去率	20	1. 規制区分	27
		2. 有効期間又は使用期限	27
VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	21	3. 貯法・保存条件	27
1. 警告内容とその理由	21	4. 薬剤取扱い上の注意点	27
2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）	21	5. 承認条件等	27
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意 とその理由	21	6. 包 装	27
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意 とその理由	21	7. 容器の材質	27
5. 慎重投与内容とその理由	21	8. 同一成分・同効薬	28
6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	21	9. 国際誕生年月日	28
7. 相互作用	22	10. 製造販売承認年月日及び承認番号	28
(1) 併用禁忌とその理由	22	11. 薬価基準収載年月日	28
(2) 併用注意とその理由	22	12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の 年月日及びその内容	28
8. 副作用	22	13. 再審査結果、再評価結果公表年月日 及びその内容	28
(1) 副作用の概要	22	14. 再審査期間	28
(2) 重大な副作用と初期症状	22	15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	29
(3) その他の副作用	23	16. 各種コード	29
(4) 項目別副作用発現頻度及び 臨床検査値異常一覧	23	17. 保険給付上の注意	29
(5) 基礎疾患、合併症、重症度 及び手術の有無等背景別の 副作用発現頻度	23		
(6) 薬物アレルギーに対する注意 及び試験法	23	XI. 文 献	30
9. 高齢者への投与	24	1. 引用文献	30
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	24	2. その他の参考文献	30
11. 小児等への投与	24	XII. 参考資料	31
12. 臨床検査結果に及ぼす影響	24	1. 主な外国での発売状況	31
		2. 海外における臨床支援情報	31
		XIII. 備 考	32
		その他の関連資料	32

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

アムロジピンベシル酸塩は持続性 Ca 拮抗薬であり、本邦では 1993 年 12 月に上市されている。

日新製薬株式会社は、アムロジピン錠 2.5mg「NS」・アムロジピン錠 5mg「NS」を 2008 年 7 月より販売している。

そして、口腔内崩壊製剤であるアムロジピン OD 錠 2.5mg「NS」・アムロジピン OD 錠 5mg「NS」を後発医薬品として企画し、薬食発第 0331015 号（平成 17 年 3 月 31 日）に基づき、規格及び試験方法を設定して加速試験、生物学的同等性試験を実施し、2009 年 7 月に承認を取得し、2009 年 11 月より販売を開始した。

その後、小児（6 歳以上）の用法・用量の追加の一部変更承認申請を行い、2012 年 8 月に承認を取得した。

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

(1) アムロジピンはジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬としての作用を示すが、作用の発現が緩徐で持続的であるという特徴を有する。

従来のカルシウム拮抗薬は、作用時間が短く、血圧をコントロールするには 1 日 2～3 回の投与を要していたが、1 日 1 回の投与で 24 時間にわたり安定した降圧効果が得られる。

(2) アムロジピン OD 錠 2.5mg「NS」・アムロジピン OD 錠 5mg「NS」は、唾液のみで服用可能である。

(3) 重大な副作用として、肝機能障害、黄疸、血小板減少、白血球減少、房室ブロックが報告されている。

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1)和 名

アムロジピン OD 錠 2.5mg 「NS」

アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」

(2)洋 名

AMLODIPINE OD TABLETS 2.5mg 「NS」

AMLODIPINE OD TABLETS 5mg 「NS」

(3)名称の由来

本剤の一般名「アムロジピンベシル酸塩」に由来する。

2. 一般名

(1)和 名（命名法）

アムロジピンベシル酸塩（JAN）


(2)洋 名（命名法）

Amlodipine Besilate（JAN）、Amlodipine（INN）

(3)ステム

ニフェジピン系カルシウム拮抗薬：-dipine

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式：C₂₀H₂₅ClN₂O₅・C₆H₆O₃S

分子量：567.05

5. 化学名（命名法）

3-Ethyl 5-methyl (4*RS*)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate monobenzenesulfonate (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

別名：ベシル酸アムロジピン

7. CAS 登録番号

111470-99-6 (Amlodipine Besilate)

88150-42-9 (Amlodipine)

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色～帯黄白色の結晶性の粉末である。わずかに特異なおいがあり、味はわずかに苦い。

(2) 溶解性

メタノールに溶けやすく、エタノール（99.5）にやや溶けにくく、水に溶けにくい。

溶解度（37℃）¹⁾

pH1.2	3.3mg/mL
pH4.0	3.3mg/mL
pH6.8	1.0mg/mL
水	3.5mg/mL

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

融点：約 198℃（分解）

(5) 酸塩基解離定数¹⁾

pKa：8.85（アミノ基、滴定法、25℃）

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

旋光度：メタノール溶液（1→100）は旋光性を示さない。

$E_{1\text{cm}}^{1\%}(237\text{nm})$ ：約 342（塩酸酸性メタノール溶液）

2. 有効成分の各種条件下における安定性

溶解後の安定性（37℃）¹⁾

pH1.2	6時間で約5%分解する。
pH4.0	26時間で約3%分解する。
pH6.8	26時間は安定である。
水	26時間は安定である。

3. 有効成分の確認試験法

日本薬局方アムロジピンベシル酸塩の確認試験法による。

(1) 紫外可視吸光度測定法

(2) 赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）

(3) 本品 30mg に硝酸ナトリウム 0.1g 及び無水炭酸ナトリウム 0.1g を加えてよく混ぜ合せ、徐々に強熱する。

冷後、残留物を希塩酸 2mL 及び水 10mL に溶かし、必要ならばろ過し、ろ液に塩化バリウム試液を加えるとき白色の沈殿を生じる。

4. 有効成分の定量法







日本薬局方アムロジピンベシル酸塩の定量法による。

液体クロマトグラフィー

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別、規格及び性状

販売名	有効成分	剤形	色	外形			識別コード
				直径(mm)	厚さ(mm)	重さ(mg)	
アムロジピン OD錠 2.5mg 「NS」	1錠中アムロジピンベシル酸塩(日局) 3.47mg (アムロジピンとして 2.5mg)	素錠	淡黄色				NS541
				6.0	3.2	85	
アムロジピン OD錠 5mg 「NS」	1錠中アムロジピンベシル酸塩(日局) 6.93mg (アムロジピンとして 5mg)	素錠 (割線入)	淡黄色				NS542
				7.0	3.4	120	

(2) 製剤の物性

該当資料なし

(3) 識別コード

アムロジピン OD錠 2.5mg 「NS」 : NS541 (錠剤、PTPシート表面)

アムロジピン OD錠 5mg 「NS」 : NS542 (錠剤、PTPシート表面)

(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等

該当しない

2. 製剤の組成

(1) 有効成分(活性成分)の含量

アムロジピン OD錠 2.5mg 「NS」 :

1錠中に日本薬局方アムロジピンベシル酸塩 3.47mg (アムロジピンとして 2.5mg) 含有

アムロジピン OD錠 5mg 「NS」 :

1錠中に日本薬局方アムロジピンベシル酸塩 6.93mg (アムロジピンとして 5mg) 含有

(2) 添加物

D-マンニトール、合成ケイ酸アルミニウム、ヒドロキシプロピルスターチ、結晶セルロース、クロスポビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、エデト酸ナトリウム水和物、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、タウマチン、黄色4号(タートラジン)、*l*-メントール、ステアリン酸マグネシウム

(3) その他

該当しない

3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

4. 製剤の各種条件下における安定性²⁾

(1)加速条件下での安定性試験

アムロジピン OD 錠 2.5mg 「NS」 及びアムロジピン OD 錠 5mg 「NS」 のそれぞれの最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度 75%、6 ヶ月）の結果、室温保存において 3 年間安定であることが推測された。

試験項目〔規格値〕		40±1℃、75±5%RH			
		開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	OD 錠 2.5mg〔淡黄色の素錠〕	適	適	適	適
	OD 錠 5mg〔淡黄色の片面割線入り素錠〕	適	適	適	適
確認試験	(1)沈殿反応	適	/	/	適
	(2)紫外可視吸光度測定法				
純度試験		/	/	/	適
製剤均一性試験〔15.0%以内〕		適	適	適	適
崩壊試験（秒）〔水、2分以内〕	OD 錠 2.5mg	19～30	19～26	15～45	17～44
	OD 錠 5mg	22～35	19～33	15～30	15～31
溶出試験（%） 〔水、50rpm、15分間、75%以上〕	OD 錠 2.5mg	/	/	/	81～97
	OD 錠 5mg	/	/	/	85～95
定量（%）〔95.0～105.0〕	OD 錠 2.5mg	100.8	100.1	100.7	100.6
	OD 錠 5mg	101.9	101.3	102.0	101.3

(2)長期保存試験

アムロジピン OD 錠 2.5mg 「NS」 及びアムロジピン OD 錠 5mg 「NS」 のそれぞれの最終包装製品を用いた長期保存試験（室温保存、3 年）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、室温保存における 3 年間の安定性が確認された。

試験項目〔規格値〕		室 温			
		開始時	12 ヶ月後	24 ヶ月後	36 ヶ月後
性状	OD 錠 2.5mg〔淡黄色の素錠〕	適	適	適	適
	OD 錠 5mg〔淡黄色の片面割線入り素錠〕	適	適	適	適
確認試験	(1)沈殿反応	適	適	適	適
	(2)紫外可視吸光度測定法	適	適	適	適
純度試験		/	/	適	適
製剤試験	製剤均一性試験〔15.0%以内〕	適	適	適	適
	崩壊試験〔水、2分以内〕	適	適	適	適
	溶出試験〔水、50rpm、15分間、75%以上〕	/	/	適	適
定量（%）〔95.0～105.0%〕	OD 錠 2.5mg	100.8	100.4	100.2	100.0
	OD 錠 5mg	101.9	101.5	101.1	101.3

(3)無包装状態での安定性

アムロジピン OD 錠 2.5mg 「NS」 及びアムロジピン OD 錠 5mg 「NS」 の無包装の製剤について、各種条件下で保存し安定性試験（性状、定量、溶出性、純度、崩壊試験、硬度）を行った。

IV. 製剤に関する項目

	試験条件	結 果	
		OD錠 2.5mg 「NS」	OD錠 5mg 「NS」
温度	50℃、3 ヶ月、密栓	変化なし	変化なし
湿度	30℃、75%RH、0.5 ヶ月、開放	膨張、肌荒れ、硬度低下	膨張、肌荒れ、硬度低下
	30℃、75%RH、1 ヶ月、開放	膨張、肌荒れ、硬度低下	膨張、肌荒れ、硬度低下
光	室内散光下、1 ヶ月、開放	変化なし	変化なし
	総照射量 60 万 Lux・hr、開放	変色（規格内）、硬度低下、 類縁物質増加	変色（規格内）、硬度低下
	総照射量 120 万 Lux・hr、開放	変色（規格内）、硬度低下、 類縁物質増加	変色（規格内）、硬度低下、 類縁物質増加

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化（物理化学的变化）

該当しない

7. 溶出性³⁾

(1) アムロジピン OD錠 2.5mg 「NS」 の溶出挙動における類似性

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン：平成 9 年 12 月 22 日付医薬審第 487 号（一部改正：平成 13 年 5 月 31 日付医薬審発第 786 号、平成 18 年 11 月 24 日付薬食審査発第 1124004 号）

試験方法：日局一般試験法「溶出試験法パドル法」による。

試験条件：

試験液量：900mL 温度：37±0.5℃

試験液：pH1.2 日本薬局方溶出試験第 1 液

pH5.0 薄めた McIlvaine の緩衝液

pH6.8 日本薬局方溶出試験第 2 液

水 日本薬局方精製水

回転数：50rpm（pH1.2、pH5.0、pH6.8、水）、100rpm（pH6.8）

判定基準：

ガイドラインの判定基準のうち、次の該当する項目に従って類似性を判定した。

【pH1.2、50rpm】、【pH5.0、50rpm】、【pH6.8、50rpm】、【pH6.8、100rpm】：

標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合

試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

【水、50rpm】：

標準製剤が 30 分以内に平均 85%以上溶出しない場合

規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 85%以上となる時、標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあるか、又は f2 関数の値が 42 以上である。

試験結果：すべての溶出試験条件において「後発医薬品の生物学的同等性ガイドライン」の判定基準に適合した。


溶出挙動における類似性（アムロジピン OD 錠 2.5mg 「NS」 及び標準製剤の平均溶出率の比較）

試験条件	溶出時間 (分)	平均溶出率(%)			f2 関数	判定	判定基準 (アムロジピン OD 錠 2.5mg 「NS」 の溶出条件)
		アムロジピン OD 錠 2.5mg 「NS」	標準製剤 (錠剤、2.5mg)	差 (絶対値)			
50rpm	pH1.2	15	100.5	96.2	4.3	適	≥85%又は±15%
	pH5.0	15	97.5	95.0	2.5	適	
	pH6.8	15	92.5	88.2	4.3	適	
	水	5	71.7	49.1	22.6	44.3	適
45		92.5	86.2	6.3			
100rpm	pH6.8	15	92.9	88.2	4.7	適	≥85%又は±15%


(n=12)

(溶出曲線)


pH1.2/50rpm




pH5.0/50rpm



pH6.8/50rpm




水/50rpm



f2 関数の値 ≥ 42

pH6.8/100rpm



(2) アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」 の溶出挙動における類似性

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン：平成 9 年 12 月 22 日付医薬審第 487 号（一部改正：平成 13 年 5 月 31 日付医薬審第 786 号、平成 18 年 11 月 24 日付薬食審査発第 1124004 号）

試験方法：日局一般試験法「溶出試験法パドル法」による。

試験条件：

試験液量：900mL 温度：37±0.5℃

試験液：pH1.2 日本薬局方溶出試験第 1 液

pH5.0 薄めた McIlvaine の緩衝液

pH6.8 日本薬局方溶出試験第 2 液

水 日本薬局方精製水

回転数：50rpm (pH1.2、pH5.0、pH6.8、水)、100rpm (pH6.8)

判定基準：

ガイドラインの判定基準のうち、次の該当する項目に従って類似性を判定した。

【pH1.2、50rpm】、【pH5.0、50rpm】：

標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合

試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

【pH6.8、50rpm】、【pH6.8、100rpm】：

標準製剤が 15～30 分に平均 85%以上溶出する場合

標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近となる適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあるか、又は f2 関数の値が 42 以上である。

【水、50rpm】：

標準製剤が 30 分以内に平均 85%以上溶出しない場合

規定された試験時間において、標準製剤の平均溶出率が 85%以上となる時、標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあるか、又は f2 関数の値が 42 以上である。

試験結果：すべての溶出試験条件において「後発医薬品の生物学的同等性ガイドライン」の判定基準に適合した。


溶出挙動における類似性（アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」 及び標準製剤の平均溶出率の比較）

試験条件	溶出時間(分)	平均溶出率(%)			f2関数	判定	判定基準 (アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」 の溶出条件)
		アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」	標準製剤 (錠剤、5mg)	差 (絶対値)			
50rpm	pH1.2	15	96.1	93.1	3.0	適	≥85%又は±15%
	pH5.0	15	96.6	94.4	2.2	適	
	pH6.8	5	74.5	79.8	5.3	適	±15%又はf2関数≥42
		15	87.0	84.8	2.2		
	水	5	74.3	54.1	20.2	53.9	
120		88.2	85.4	2.8			
100rpm	pH6.8	5	80.8	82.7	1.9	適	
		30	89.9	85.1	4.8		


(n=12)

(溶出曲線)


pH1.2/50rpm




pH5.0/50rpm




pH6.8/50rpm



水 /50rpm

f2 関数の値 \geq 42

pH6.8/100rpm



8. 生物学的試験法

該当しない

9. 製剤中の有効成分の確認試験法

日本薬局方アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠の確認試験法による。

紫外可視吸光度測定法

10. 製剤中の有効成分の定量法

日本薬局方アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠の定量法による。

液体クロマトグラフィー

IV. 製剤に関する項目

11.力 価

該当しない

12.混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

13.治療上注意が必要な容器に関する情報

該当しない

14.その他

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

高血圧症、狭心症

<効能・効果に関連する使用上の注意>

本剤は効果発現が緩徐であるため、緊急な治療を要する不安定狭心症には効果が期待できない。

2. 用法及び用量

・高血圧症

通常、成人にはアムロジピンとして 2.5～5mg を 1 日 1 回経口投与する。

なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には 1 日 1 回 10mg まで増量することができる。

通常、6 歳以上の小児には、アムロジピンとして 2.5mg を 1 日 1 回経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

・狭心症

通常、成人にはアムロジピンとして 5mg を 1 日 1 回経口投与する。

なお、症状に応じ適宜増減する。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

1. 6 歳以上の小児への投与に際しては、1 日 5mg を超えないこと。
2. 本剤は口腔内で崩壊するが、口腔粘膜から吸収されることはないため、唾液又は水で飲み込むこと（「適用上の注意」の項参照）。

3. 臨床成績

(1)臨床データパッケージ（2009 年 4 月以降承認品目）

該当資料なし

(2)臨床効果

該当資料なし

(3)臨床薬理試験：忍容性試験

該当資料なし

(4)探索的試験：用量反応探索試験

該当資料なし

(5)検証的試験

1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

2) 比較試験

該当資料なし

3) 安全性試験

該当資料なし

4) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6)治療的使用

- 1) 使用成績調査・特定使用成績調査（特別調査）・製造販売後臨床試験（市販後臨床試験）

該当資料なし

- 2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当資料なし

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

1,4-ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗薬（ニフェジピン、ニカルジピン等）

2. 薬理作用

(1)作用部位・作用機序⁴⁾

本剤はジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬としての作用を示すが、作用の発現が緩徐で持続的であるという特徴を有する。

ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬は、膜電位依存性 L 型カルシウムチャンネルに特異的に結合し、細胞内へのカルシウムの流入を減少させることにより、冠血管や末梢血管の平滑筋を弛緩させる。非ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬（ベラパミルやジルチアゼム）と比較すると、血管選択性が高く、心収縮力や心拍数に対する抑制作用は弱い。

(2)薬効を裏付ける試験成績

該当資料なし

(3)作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1)治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2)最高血中濃度到達時間⁵⁾

健康成人男子 1錠投与時

アムロジピン OD錠 2.5mg「NS」 : 6.9時間 (水で服用した場合)、8.1時間 (水なしで服用した場合)

アムロジピン OD錠 5mg「NS」 : 7.3時間 (水で服用した場合)、7.4時間 (水なしで服用した場合)

(3)臨床試験で確認された血中濃度⁵⁾

生物学的同等性試験

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン：平成9年12月22日付医薬審第487号 (一部改正：平成13年5月31日付医薬審発第786号、平成18年11月24日付薬食審査発第112004号)


1) アムロジピン OD錠 2.5mg「NS」

アムロジピン OD錠 2.5mg「NS」と標準製剤を、2剤2期のクロスオーバー法によりそれぞれ1錠 (アムロジピンとして 2.5mg) 健康成人男子に絶食時単回経口投与 (水なしで服用及び水 150mLで服用) して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、 C_{max}) について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、両製剤の生物学的同等性が確認された。

i) 水なしで服用した場合

	AUC ₀₋₇₂ (ng・hr/mL)	C_{max} (ng/mL)	T_{max} (hr)	$t_{1/2}$ (hr)
アムロジピン OD錠 2.5mg「NS」	44.03 ± 8.42	1.18 ± 0.22	8.1 ± 1.8	41.5 ± 11.3
標準製剤 (錠剤、2.5mg)	44.30 ± 10.28	1.20 ± 0.25	8.0 ± 2.0	42.2 ± 8.9

(Mean ± S.D., n = 13)




血漿中アムロジピン濃度の推移

血漿中濃度並びに AUC、 C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

ii) 水で服用した場合

	AUC ₀₋₇₂ (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
アムロジピン OD 錠 2.5mg 「NS」	46.42±11.04	1.31±0.29	6.9±0.9	36.7±8.6
標準製剤 (錠剤、2.5mg)	44.57±11.05	1.27±0.26	7.8±1.7	38.6±8.1

(Mean±S.D., n=13)



血漿中アムロジピン濃度の推移

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。


2) アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」

アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」と標準製剤を、2 剤 2 期のクロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (アムロジピンとして 5mg) 健康成人男子に絶食時単回経口投与 (水なしで服用及び水 150mL で服用) して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、C_{max}) について 90% 信頼区間法にて統計解析を行った結果、両製剤の生物学的同等性が確認された。

i) 水なしで服用した場合

	AUC ₀₋₇₂ (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」	79.96±18.20	1.98±0.34	7.4±1.1	44.3± 9.7
標準製剤 (錠剤、5mg)	79.66±18.50	2.10±0.39	7.2±0.7	43.8±14.6

(Mean±S.D., n=14)




血漿中アムロジピン濃度の推移

血漿中濃度並びに AUC、 C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

ii) 水で服用した場合

	AUC ₀₋₇₂ (ng·hr/mL)	C_{max} (ng/mL)	T_{max} (hr)	$t_{1/2}$ (hr)
アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」	91.05 ± 23.95	2.74 ± 0.76	7.3 ± 0.6	40.5 ± 10.6
標準製剤 (錠剤、5mg)	89.79 ± 25.33	2.58 ± 0.67	7.3 ± 0.8	40.5 ± 8.3

(Mean ± S.D., n = 14)



血漿中アムロジピン濃度の推移

血漿中濃度並びに AUC、 C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4)中毒域

該当資料なし

(5)食事・併用薬の影響

「VIII.7.相互作用」の項を参照

(6)母集団（ポピュレーション）解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1)コンパートメントモデル

該当資料なし

(2)吸収速度定数

該当資料なし

(3)バイオアベイラビリティ

該当資料なし

(4)消失速度定数⁵⁾

健康成人男子単回投与（1錠）

		OD 錠 2.5mg 「NS」	OD 錠 5mg 「NS」
Kel (hr ⁻¹)	水あり条件下	0.01968±0.00379 (n=13)	0.01819±0.00452 (n=14)
	水なし条件下	0.01772±0.00422 (n=13)	0.01626±0.00313 (n=14)

(Mean±S.D.)

(5)クリアランス

該当資料なし

(6)分布容積

該当資料なし

(7)血漿蛋白結合率⁴⁾

97.1%

3. 吸 収

該当資料なし

4. 分 布

(1)血液－脳関門通過性

該当資料なし

(2)血液－胎盤関門通過性

該当資料なし

(3)乳汁への移行性

該当資料なし

<参考：動物>

「Ⅷ.10.妊婦、産婦、授乳婦等への投与(2)」の項を参照

(4)髄液への移行性

該当資料なし

(5)その他の組織への移行性

該当資料なし

5. 代謝

(1)代謝部位及び代謝経路

本剤は主として肝で代謝される。

(2)代謝に関与する酵素（CYP450 等）の分子種

本剤の代謝には主として薬物代謝酵素 CYP3A4 が関与していると考えられている。

(3)初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4)代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

(5)活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

6. 排泄

(1)排泄部位及び経路

該当資料なし

(2)排泄率⁴⁾

尿中未変化体排泄率は 8%

(3)排泄速度

該当資料なし

7. 透析等による除去率

本剤は蛋白結合率が高いため、透析による除去は有効ではない。

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

該当しない

2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

1. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）
2. ジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

<効能・効果に関連する使用上の注意>

本剤は効果発現が緩徐であるため、緊急な治療を要する不安定狭心症には効果が期待できない。

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

<用法・用量に関連する使用上の注意>

1. 6歳以上の小児への投与に際しては、1日5mgを超えないこと。
2. 本剤は口腔内で崩壊するが、口腔粘膜から吸収されることはないため、唾液又は水で飲み込むこと（「使用上の注意」の項参照）。

5. 慎重投与内容とその理由

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 過度に血圧の低い患者 [さらに血圧が低下するおそれがある。]
- (2) 肝機能障害のある患者 [本剤は主に肝で代謝されるため、肝機能障害患者では、血中濃度半減期の延長及び血中濃度-時間曲線下面積 (AUC) が増大することがある。高用量 (10mg) において副作用の発現率が高まる可能性があるため、増量時には慎重に投与すること。]
- (3) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
- (4) 重篤な腎機能障害のある患者 [一般的に腎機能障害のある患者では、降圧に伴い腎機能が低下することがある。]

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

2. 重要な基本的注意

- (1) 降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- (2) 本剤は血中濃度半減期が長く投与中止後も緩徐な降圧効果が認められるので、本剤投与中止後に他の降圧剤を使用するときは、用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

7. 相互作用

<p>3. 相互作用</p> <p>本剤の代謝には主として薬物代謝酵素 CYP3A4 が関与していると考えられている。</p>

(1)併用禁忌とその理由

該当しない

(2)併用注意とその理由

<p>3. 相互作用</p> <p>併用注意（併用に注意すること）</p>		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
降圧作用を有する薬剤	相互に作用を増強するおそれがある。慎重に観察を行うなど注意して使用すること。	相互に作用を増強するおそれがある。
CYP3A4 阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル イトラコナゾール等	エリスロマイシン及びジルチアゼムとの併用により、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。	本剤の代謝が競合的に阻害される可能性が考えられる。
CYP3A4 誘導剤 リファンピシン等	本剤の血中濃度が低下するおそれがある。	本剤の代謝が促進される可能性が考えられる。
グレープフルーツジュース	本剤の降圧作用が増強されるおそれがある。同時服用をしないように注意すること。	グレープフルーツに含まれる成分が本剤の代謝を阻害し、本剤の血中濃度が上昇する可能性が考えられる。
シンバスタチン	シンバスタチン 80mg（国内未承認の高用量）との併用により、シンバスタチンの AUC が 77%上昇したとの報告がある。	機序不明

8. 副作用

(1)副作用の概要

<p>4. 副作用</p> <p>本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p>
--

(2)重大な副作用と初期症状

<p>4. 副作用</p> <p>(1)重大な副作用（頻度不明）</p> <p>1) 肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>2) 血小板減少、白血球減少：血小板減少又は白血球減少があらわれることがあるので、検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>3) 房室ブロック：房室ブロック（初期症状：徐脈、めまい等）があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>
--

(3)その他の副作用

4. 副作用	
(2)その他の副作用	
次のような副作用が認められた場合には、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。	
	頻 度 不 明
肝 臓	ALT (GPT) 上昇、AST (GOT) 上昇、肝機能障害、ALP 上昇、LDH 上昇、 γ -GTP 上昇、黄疸、腹水
循環器	浮腫 ^{注1)} 、ほてり（熱感、顔面潮紅等）、動悸、血圧低下、胸痛、期外収縮、洞房又は房室ブロック、洞停止、心房細動、失神、徐脈
精神神経系	眩暈・ふらつき、頭痛・頭重、眠気、振戦、末梢神経障害、気分動揺、不眠
消化器	心窩部痛、便秘、嘔気・嘔吐、口渇、消化不良、下痢・軟便、排便回数増加、口内炎、腹部膨満、胃腸炎、痔炎
筋・骨格系	筋緊張亢進、筋痙攣、背痛、関節痛、筋肉痛
泌尿・生殖器	BUN 上昇、クレアチニン上昇、頻尿・夜間頻尿、尿管結石、尿潜血陽性、尿中蛋白陽性、勃起障害、排尿障害
代謝異常	血清コレステロール上昇、CK (CPK) 上昇、高血糖、糖尿病、尿中ブドウ糖陽性
血 液	赤血球減少、ヘモグロビン減少、白血球減少、白血球増加、紫斑、血小板減少
過敏症 ^{注2)}	発疹、そう痒、蕁麻疹、光線過敏症、多形紅斑、血管炎、血管浮腫
口 腔 ^{注2)}	(連用により) 歯肉肥厚
その他	全身倦怠感、しびれ、脱力感、耳鳴、鼻出血、味覚異常、疲労、咳、発熱、視力異常、呼吸困難、異常感覚、多汗、血中カリウム減少、女性化乳房、脱毛、鼻炎、体重増加、体重減少、疼痛、皮膚変色
注1) 10mg への増量により高頻度に認められたとの報告がある。	
注2) 発現した場合には投与を中止すること。	

(4)項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

(5)基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

(6)薬物アレルギーに対する注意及び試験法

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

2. ジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者

4. 副作用	
(2)その他の副作用	
次のような副作用が認められた場合には、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。	
	頻 度 不 明
過敏症 ^{注2)}	発疹、そう痒、蕁麻疹、光線過敏症、多形紅斑、血管炎、血管浮腫
注2) 発現した場合には投与を中止すること。	

9. 高齢者への投与

5. 高齢者への投与

高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされていること及び高齢者での体内動態試験で血中濃度が高く、血中濃度半減期が長くなる傾向が認められているので、低用量（2.5mg/日）から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。〔動物実験で妊娠末期に投与すると妊娠期間及び分娩時間が延長することが認められている。〕
- (2) 授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。〔動物実験で母乳中へ移行することが認められている。〕

11. 小児等への投与

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児又は6歳未満の幼児に対する安全性は確立していない（使用経験が少ない）。

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当資料なし

13. 過量投与

8. 過量投与

症状：過度の末梢血管拡張により、ショックを含む著しい血圧低下と反射性頻脈を起こすことがある。

処置：心・呼吸機能のモニターを行い、頻回に血圧を測定する。著しい血圧低下が認められた場合は、四肢の挙上、輸液の投与等、心血管系に対する処置を行う。症状が改善しない場合は、循環血液量及び排尿量に注意しながら昇圧剤の投与を考慮する。本剤は蛋白結合率が高いため、透析による除去は有効ではない。

また、本剤服用直後に活性炭を投与した場合、本剤のAUCは99%減少し、服用2時間後では49%減少したことから、本剤過量投与時の吸収抑制処置として活性炭投与が有効であると報告されている。

14. 適用上の注意

9. 適用上の注意

- (1) 分割後：分割後は早めに使用すること。分割後やむを得ず保存する場合には、湿気、光を避けて保存すること。
- (2) 薬剤交付時：
- 1) PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]
 - 2) 本剤をPTPシートから取り出して保存する場合は、湿気、光を避けて保存するよう指導すること。
- (3) 服用時：本剤は舌の上へのせ唾液を浸潤させ、唾液のみで服用可能である。また、水で服用することもできる。

15. その他の注意

10. その他の注意

因果関係は明らかでないが、本剤による治療中に心筋梗塞や不整脈（心室性頻拍を含む）がみられたとの報告がある。

16. その他

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1)薬効薬理試験（「VI.薬効薬理に関する項目」参照）

(2)副次的薬理試験

該当資料なし

(3)安全性薬理試験

該当資料なし

(4)その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1)単回投与毒性試験

該当資料なし

(2)反復投与毒性試験

該当資料なし

(3)生殖発生毒性試験

該当資料なし

<参考>

「VIII.10.妊婦、産婦、授乳婦への投与(1)」の項を参照

(4)その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤：劇薬、処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）

有効成分：毒薬（1錠中アムロジピンベシル酸塩として、13.87mg以下を含有するものを除く。）

2. 有効期間又は使用期限

使用期限：3年（安定性試験結果に基づく）

3. 貯法・保存条件

気密容器、室温保存

保管方法：(1) 使用期限内であっても、アルミピロー開封後はなるべく速やかに使用すること。

(2) 本剤は吸湿性が強いので、アルミピロー開封後は湿気を避けて保存し、服用直前まで PTP シートから取り出さないこと（一包化調剤は避けること）。なお、やむを得ず PTP シートから取り出して保存する場合は、湿気、光を避けて保存すること。

4. 薬剤取扱い上の注意点

(1) 薬局での取扱いについて

該当資料なし

(2) 薬剤交付時の注意（患者等に留意すべき必須事項等）

「Ⅷ.14.適用上の注意」の項を参照

5. 承認条件等

該当しない

6. 包 装

アムロジピン OD 錠 2.5mg 「NS」	：	(PTP)	100 錠
			140 錠 (14 錠×10)
			1000 錠
アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」	：	(PTP)	100 錠
			140 錠 (14 錠×10)
			1000 錠

7. 容器の材質

P T P 包装：ポリ塩化ビニル、アルミニウム

ピロー包装：ポリエチレンラミネートアルミニウム

化粧箱：紙

X. 管理的事項に関する項目

8. 同一成分・同効薬

同一成分薬：アムロジピン錠 2.5mg、アムロジピン錠 5mg、アムロジピン錠 10mg、アムロジピン OD 錠 2.5mg、アムロジピン OD 錠 5mg、アムロジピン OD 錠 10mg（大日本住友製薬株式会社）

ノルバスク錠 2.5mg、ノルバスク錠 5mg、ノルバスク錠 10mg、ノルバスク OD 錠 2.5mg、ノルバスク OD 錠 5mg、ノルバスク OD 錠 10mg（ファイザー株式会社）

同効薬：1,4-ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗薬（ニフェジピン、ニカルジピン等）

9. 国際誕生年月日⁶⁾

1989年3月

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

	製造販売承認年月日	承認番号
アムロジピン OD 錠 2.5mg 「NS」	2009年7月13日	22100AMX02035000
アムロジピン OD 錠 5mg 「NS」	2009年7月13日	22100AMX02034000

11. 薬価基準収載年月日

2009年11月13日

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

用法・用量追加年月日：2010年1月5日

追加内容：【用法・用量】

・高血圧症

通常、成人にはアムロジピンとして 2.5～5mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には 1 日 1 回 10mg まで増量することができる。

(____ : 追加部分)

用法・用量追加年月日：2012年8月23日

追加内容：【用法・用量】

・高血圧症

通常、成人にはアムロジピンとして 2.5～5mg を 1 日 1 回経口投与する。

なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には 1 日 1 回 10mg まで増量することができる。

通常、6歳以上の小児には、アムロジピンとして 2.5mg を 1 日 1 回経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

(____ : 追加部分)

13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

14. 再審査期間

該当しない

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報

本剤は厚生労働大臣の定める「投薬期間に上限が設けられている医薬品」に該当しない。

16. 各種コード

販売名	HOT（9桁）番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト電算コード
アムロジピン OD 錠 2.5mg「NS」	119373202	2171022F3080	621937301
アムロジピン OD 錠 5mg「NS」	119374902	2171022F4087	621937401

17. 保険給付上の注意

本剤は保険診療上の後発医薬品である。

XI. 文 献

1. 引用文献

- 1) (財)日本公定書協会編、医療用医薬品 品質情報集 2007;27:167, 薬事日報社
- 2) 社内資料 (安定性)
- 3) 社内資料 (溶出性)
- 4) 第十六改正日本薬局方解説書 2011;C-278, 廣川書店
- 5) 社内資料 (生物学的同等性)
- 6) 日本薬局方医薬品情報 2011 (日本薬剤師研修センター編) 2011:128

2. その他の参考文献

該当資料なし

XII. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

該当資料なし

2. 海外における臨床支援情報

該当資料なし

XIII. 備 考

その他の関連資料

該当資料なし

〔文献請求先・製品情報お問い合わせ先〕
第一三共エスファ株式会社 お客様相談室
〒103-8426 東京都中央区日本橋本町 3-5-1
TEL:0120-100-601