

アルツハイマー型認知症治療剤
劇薬、処方せん医薬品※
ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠

ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「YD」

ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「YD」

※注意-医師等の処方せんにより使用すること

効能・効果、用法・用量追加のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび上記製品の効能・効果、用法・用量の追加が承認されましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

● 承認内容

【効能・効果】

アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

【用法・用量】

通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により適宜減量する。

【お願い】

- ・今般の「効能・効果」および「用法・用量」の追加に伴い「使用上の注意」も改訂されております。「効能・効果／用法・用量／使用上の注意改訂のお知らせ」ならびに「改訂添付文書」をご参照賜りますようお願い申し上げます。
- ・流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数が必要ですので、ご使用に際しましては、「お知らせ」ならびに「改訂添付文書」をご参照賜りますようお願い申し上げます。

以上

