

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2008に準拠して作成

入眠剤

向精神薬、習慣性医薬品、処方せん医薬品

日本薬局方ゾルピデム酒石酸塩錠

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」

ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」

ZOLPIDEM TARTRATE TABLETS「DSEP」

剤	形	錠剤（フィルムコーティング錠）
製剤の規制区分		向精神薬、習慣性医薬品（注意－習慣性あり）、 処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）
規格・含量		ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」： 1錠中ゾルピデム酒石酸塩 5mg（日局）を含有 ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」： 1錠中ゾルピデム酒石酸塩 10mg（日局）を含有
一般名		和名：ゾルピデム酒石酸塩（JAN） 洋名：Zolpidem Tartrate（JAN）
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日		製造販売承認年月日：2012年2月15日 薬価基準収載年月日：2012年6月22日 発売年月日：2012年6月22日
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名		製造販売元：第一三共エスファ株式会社 販売提携：第一三共株式会社
医薬情報担当者の連絡先		
問い合わせ窓口		第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 TEL：0120-100-601 医療関係者向けホームページ： http://www.daiichisankyo-ep.co.jp/

本IFは2013年11月改訂（第2版）の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/>にてご確認ください。

IF利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和63年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、IFと略す）の位置付け並びにIF記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成10年9月に日病薬学術第3小委員会においてIF記載要領の改訂が行われた。

更に10年が経過した現在、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成20年9月に日病薬医薬情報委員会において新たなIF記載要領が策定された。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

【IFの様式】

- ①規格はA4版、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁にまとめる。

【IFの作成】

- ①IFは原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ②IFに記載する項目及び配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠する。
- ③添付文書の内容を補完するとIFの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。

- ⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領2008」（以下、「IF記載要領2008」と略す）により作成されたIFは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[IFの発行]

- ①「IF記載要領2008」は、平成21年4月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ②上記以外の医薬品については、「IF記載要領2008」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはIFが改訂される。

3. IFの利用にあたって

「IF記載要領2008」においては、従来の主にMRによる紙媒体での提供に替え、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則で、医療機関でのIT環境によっては必要に応じてMRに印刷物での提供を依頼してもよいこととした。

電子媒体のIFについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IFを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IFは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、IFがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、今後インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2008年9月)

目 次

I. 概要に関する項目	1	9. 製剤中の有効成分の確認試験法	10
1. 開発の経緯	1	10. 製剤中の有効成分の定量法	10
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	11. 力 価	10
II. 名称に関する項目	2	12. 混入する可能性のある夾雑物	10
1. 販売名	2	13. 治療上注意が必要な容器に関する情報	10
(1) 和 名	2	14. その他	10
(2) 洋 名	2	V. 治療に関する項目	11
(3) 名称の由来	2	1. 効能又は効果	11
2. 一般名	2	2. 用法及び用量	11
(1) 和 名 (命名法)	2	3. 臨床成績	11
(2) 洋 名 (命名法)	2	(1) 臨床データパッケージ	11
(3) システム	2	(2) 臨床効果	11
3. 構造式又は示性式	2	(3) 臨床薬理試験：忍容性試験	11
4. 分子式及び分子量	2	(4) 探索的試験：用量反応探索試験	11
5. 化学名 (命名法)	2	(5) 検証的試験	11
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2	1) 無作為化並行用量反応試験	11
7. CAS登録番号	3	2) 比較試験	11
III. 有効成分に関する項目	4	3) 安全性試験	11
1. 物理化学的性質	4	4) 患者・病態別試験	11
(1) 外観・性状	4	(6) 治療的使用	12
(2) 溶解性	4	1) 使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・	
(3) 吸湿性	4	製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)	12
(4) 融点(分解点)、沸点、凝固点	4	2) 承認条件として実施予定の内容	
(5) 酸塩基解離定数	4	又は実施した試験の概要	12
(6) 分配係数	4	VI. 薬効薬理に関する項目	13
(7) その他の主な示性値	4	1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	13
2. 有効成分の各種条件下における安定性	4	2. 薬理作用	13
3. 有効成分の確認試験法	4	(1) 作用部位・作用機序	13
4. 有効成分の定量法	4	(2) 薬効を裏付ける試験成績	13
IV. 製剤に関する項目	5	(3) 作用発現時間・持続時間	13
1. 剤 形	5	VII. 薬物動態に関する項目	14
(1) 剤形の区別、規格及び性状	5	1. 血中濃度の推移・測定法	14
(2) 製剤の物性	5	(1) 治療上有効な血中濃度	14
(3) 識別コード	5	(2) 最高血中濃度到達時間	14
(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、		(3) 臨床試験で確認された血中濃度	14
無菌の旨及び安定なpH域等	5	(4) 中毒域	15
2. 製剤の組成	5	(5) 食事・併用薬の影響	15
(1) 有効成分(活性成分)の含量	5	(6) 母集団(ポピュレーション)解析により	
(2) 添加物	5	判明した薬物体内動態変動要因	15
(3) その他	5	2. 薬物速度論的パラメータ	15
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	5	(1) コンパートメントモデル	15
4. 製剤の各種条件下における安定性	5	(2) 吸収速度定数	15
5. 調製法及び溶解後の安定性	6	(3) バイオアベイラビリティ	15
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	6	(4) 消失速度定数	16
7. 溶出性	7	(5) クリアランス	16
8. 生物学的試験法	10	(6) 分布容積	16

(7) 血漿蛋白結合率	16	13. 過量投与	22
3. 吸 収	16	14. 適用上の注意	22
4. 分 布	16	15. その他の注意	22
(1) 血液－脳関門通過性	16	16. その他	22
(2) 血液－胎盤関門通過性	16		
(3) 乳汁への移行性	16	IX. 非臨床試験に関する項目	23
(4) 髄液への移行性	16	1. 薬理試験	23
(5) その他の組織への移行性	16	(1) 薬効薬理試験	23
5. 代 謝	16	(2) 副次的薬理試験	23
(1) 代謝部位及び代謝経路	16	(3) 安全性薬理試験	23
(2) 代謝に関与する酵素（CYP450等） の分子種	16	(4) その他の薬理試験	23
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	16	2. 毒性試験	23
(4) 代謝物の活性の有無及び比率	16	(1) 単回投与毒性試験	23
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	16	(2) 反復投与毒性試験	23
6. 排 泄	17	(3) 生殖発生毒性試験	23
(1) 排泄部位及び経路	17	(4) その他の特殊毒性	23
(2) 排泄率	17	X. 管理的事項に関する項目	24
(3) 排泄速度	17	1. 規制区分	24
7. 透析等による除去率	17	2. 有効期間又は使用期限	24
VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	18	3. 貯法・保存条件	24
1. 警告内容とその理由	18	4. 薬剤取扱い上の注意点	24
2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）	18	5. 承認条件等	24
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意 とその理由	18	6. 包 装	24
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意 とその理由	18	7. 容器の材質	24
5. 慎重投与内容とその理由	19	8. 同一成分・同効薬	25
6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	19	9. 国際誕生年月日	25
7. 相互作用	19	10. 製造販売承認年月日及び承認番号	25
(1) 併用禁忌とその理由	19	11. 薬価基準収載年月日	25
(2) 併用注意とその理由	19	12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の 年月日及びその内容	25
8. 副作用	20	13. 再審査結果、再評価結果公表年月日 及びその内容	25
(1) 副作用の概要	20	14. 再審査期間	25
(2) 重大な副作用と初期症状	20	15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	25
(3) その他の副作用	20	16. 各種コード	25
(4) 項目別副作用発現頻度及び 臨床検査値異常一覧	21	17. 保険給付上の注意	25
(5) 基礎疾患、合併症、重症度 及び手術の有無等背景別の 副作用発現頻度	21	XI. 文 献	26
(6) 薬物アレルギーに対する注意 及び試験法	21	1. 引用文献	26
9. 高齢者への投与	21	2. その他の参考文献	26
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	21	XII. 参考資料	27
11. 小児等への投与	21	1. 主な外国での発売状況	27
12. 臨床検査結果に及ぼす影響	21	2. 海外における臨床支援情報	27
		XIII. 備 考	28
		その他の関連資料	28

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

ゾルピデム酒石酸塩は、ベンゾジアゼピン系睡眠薬のデメリットの解消を目的として開発された、 ω_1 受容体の特異性が高く、選択的な催眠鎮静作用を示す入眠剤であり、本邦では2000年12月に上市されている。

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」及びゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」は、第一三共エスファ株式会社が後発医薬品として開発を企画し、平成9年12月22日付医薬審第487号、平成17年3月31日付薬食発第0331015号及び平成18年11月24日付薬食審査発第1124004号に基づき、規格及び試験方法を設定して加速試験、生物学的同等性試験を実施し、2012年2月に承認を取得し、2012年6月より発売を開始した。

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

(1) ベンゾジアゼピン系化合物ではないが、ベンゾジアゼピン結合部位に選択的に結合し、同様の作用を示す。

ベンゾジアゼピン結合部位は抑制性神経伝達物質 $GABA_A$ 受容体のサブユニットに存在し、ここに結合することにより $GABA_A$ 受容体への $GABA$ の親和性を高め、 $GABA_A$ 系の神経抑制機構を増強して催眠鎮静作用を示す。

(2) 重大な副作用として、依存性、離脱症状、精神症状、意識障害、一過性前向性健忘、もうろう状態、呼吸抑制、肝機能障害、黄疸が報告されている。

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1)和名

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「DSEP」

ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「DSEP」

(2)洋名

ZOLPIDEM TARTRATE TABLETS 5mg 「DSEP」

ZOLPIDEM TARTRATE TABLETS 10mg 「DSEP」

(3)名称の由来

通知「薬食審査発第 0922001 号」に基づき設定した。

2. 一般名

(1)和名(命名法)

ゾルピデム酒石酸塩 (JAN)

(2)洋名(命名法)


ZOLPIDEM TARTRATE (JAN)

ZOLPIDEM (INN)

(3)ステム

ゾルピデム誘導体、催眠鎮静剤：-pidem

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式：(C₁₉H₂₁N₃O)₂·C₄H₆O₆

分子量：764.87

5. 化学名(命名法)

N, N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1, 2-*a*]pyridine-3-acetamide hemi-(2*R*,3*R*)-tartrate (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

開発番号：NAS-ZPO5mg (ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「DSEP」)

開発番号：NAS-ZPO10mg (ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「DSEP」)

7. CAS 登録番号

99294-93-6 (Zolpidem Tartrate)

82626-48-0 (Zolpidem)

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色の結晶性の粉末である。光によって徐々に黄色となる。

(2) 溶解性

酢酸（100）に溶けやすく、*N,N*-ジメチルホルムアミド又はメタノールにやや溶けやすく、水にやや溶けにくく、エタノール（99.5）又は無水酢酸に溶けにくい。0.1mol/L 塩酸試液に溶ける。

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

該当資料なし

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

旋光度 $[\alpha]_D^{20}$: 約 +1.8° (1g、*N,N*-ジメチルホルムアミド、20mL、100mm)

比吸光度 : $E_{1\text{cm}}^{1\%}(237\text{nm})=676$ 、 $E_{1\text{cm}}^{1\%}(294\text{nm})=375$

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法

日本薬局方ゾルピデム酒石酸塩の確認試験法による。

(1) ドラージェンドルフ試液による呈色反応

(2) 紫外可視吸光度測定法

(3) 赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）

(4) 酒石酸塩の定性反応（3）

4. 有効成分の定量法






日本薬局方ゾルピデム酒石酸塩の定量法による。

電位差滴定法

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別、規格及び性状

販売名	有効成分	剤形	色	外形			識別コード
				直径 (mm)	厚さ (mm)	重さ (mg)	
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」	1錠中ゾルピデム酒石酸塩 (日局) 5mg	フィルム コーティング錠 (割線入)	淡い だいたい色				EP 110
				6.6	2.7	93	
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」	1錠中ゾルピデム酒石酸塩 (日局) 10mg	フィルム コーティング錠 (割線入)	淡い だいたい色				EP 111
				8.6	3.3	185	

(2) 製剤の物性

該当資料なし

(3) 識別コード

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」 : EP110 (錠剤、PTPシート表面)

ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」 : EP111 (錠剤、PTPシート表面)

(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等

該当しない

2. 製剤の組成

(1) 有効成分 (活性成分) の含量

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」 : 1錠中に日本薬局方ゾルピデム酒石酸塩 5mg を含有

ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」 : 1錠中に日本薬局方ゾルピデム酒石酸塩 10mg を含有

(2) 添加物

乳糖水和物、結晶セルロース、ヒプロメロース、デンプングリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、マクロゴール 6000、酸化チタン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ

(3) その他

該当しない

3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

4. 製剤の各種条件下における安定性

(1) 加速条件下での安定性試験¹⁾

最終包装製品を用いた加速試験 (40℃、75%RH、6ヵ月) の結果、ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」及びゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」は通常市場流通下において3年間は安定であると推測された。

IV. 製剤に関する項目

PTP 包装

試験項目〔規格値〕		40±1℃、75±5%RH			
		開始時	1ヵ月後	3ヵ月後	6ヵ月後
性状〔淡いだいだい色の割線入りフィルムコーティング錠〕		適	適	適	適
確認試験(1)：紫外可視吸収スペクトル〔※1〕		適	適	適	適
製剤均一性試験〔判定値 15%以内〕		適	適	適	適
溶出試験〔水、50rpm、15分、80%以上〕		適	適	適	適
定量〔95.0～105.0%〕※2 (平均含有率(%)±C.V.)	錠 5mg	99.8±0.5	99.6±0.7	99.6±0.4	100.2±0.5
	錠 10mg	100.3±0.4	99.9±0.6	99.6±0.4	100.2±0.3

※1：波長 235～239nm 及び 292～296nm に吸収の極大を示す。

※2：3Lot の平均値

バラ包装

試験項目〔規格値〕		40±1℃、75±5%RH			
		開始時	1ヵ月後	3ヵ月後	6ヵ月後
性状〔淡いだいだい色の割線入りフィルムコーティング錠〕		適	適	適	適
確認試験(1)：紫外可視吸収スペクトル〔※1〕		適	適	適	適
製剤均一性試験〔判定値 15%以内〕		適	適	適	適
溶出試験〔水、50rpm、15分、80%以上〕		適	適	適	適
定量〔95.0～105.0%〕※2 (平均含有率(%)±C.V.)	錠 5mg	99.8±0.5	99.3±0.5	99.2±0.3	100.2±0.3
	錠 10mg	100.3±0.4	99.6±0.6	99.4±0.2	100.4±0.4

※1：波長 235～239nm 及び 292～296nm に吸収の極大を示す。

※2：3Lot の平均値

(2)無包装状態での安定性試験¹⁾

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」及びゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」の無包装の製剤について、各種条件下で保存し、安定性試験〔性状、溶出性、定量、硬度、類縁物質〕を行った。

	試験条件	結 果	
		錠 5mg「DSEP」	錠 10mg「DSEP」
温度	40℃、褐色ガラス瓶、密栓、3ヵ月	変化なし	変化なし
湿度	25℃、75%RH、褐色ガラス瓶、開栓、3ヵ月	変化なし	変化なし
光	総照射量 120 万 Lux・hr、無色ガラス瓶、密栓	変化なし	変化なし

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化（物理化学的变化）

該当資料なし

7. 溶出性

(1) 公的溶出試験²⁾

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「DSEP」及びゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「DSEP」は、日本薬局方医薬品各条に定められたゾルピデム酒石酸塩錠の溶出規格に適合していることが確認された。

溶出規格					試験結果 (%)
表示量	試験液	回転数	規定時間	溶出率	
5mg	水	50rpm	15分	80%以上	97~104
10mg	水	50rpm	15分	80%以上	93~101

(2) 後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに基づく溶出試験²⁾

1) ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「DSEP」

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について（平成 18 年 11 月 24 日 薬食審査発第 1124004 号）」に基づき、試験を実施した。

試験方法：日局一般試験法「溶出試験法パドル法」による。

試験条件：

試験液量：900mL 温度：37±0.5℃

試験液：pH1.2 日本薬局方溶出試験第 1 液

pH3.0 薄めた McIlvaine の緩衝液

pH6.8 日本薬局方溶出試験第 2 液

水 日本薬局方精製水

回転数：50rpm (pH1.2、pH3.0、pH6.8、水)、100rpm (pH1.2)

判定基準：

ガイドラインの判定基準のうち、次の該当する項目に従って類似性を判定した。

【pH1.2、50rpm】、【pH3.0、50rpm】、【pH6.8、50rpm】、【水、50rpm】、【pH1.2、100rpm】：

標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合

試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。


試験結果：

すべての溶出試験条件において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

溶出挙動における類似性（ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「DSEP」及び標準製剤の平均溶出率の比較）

試験条件	溶出時間 (分)	平均溶出率(%)			判定	判定基準 (ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「DSEP」の溶出条件)
		ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「DSEP」	標準製剤 (錠剤、5mg)	差 (絶対値)		
50rpm	pH1.2	15	102.9	102.5	0.4	≥85%又は±15%
	pH3.0	15	102.5	103.4	0.9	
	pH6.8	15	102.5	98.4	4.1	
	水	15	100.7	101.6	0.9	
100rpm	pH1.2	15	102.2	101.8	0.4	

(溶出曲線)



2) ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「DSEP」

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について（平成 18 年 11 月 24 日 薬食審査発第 1124004 号）」に基づき、試験を実施した。

試験方法：日局一般試験法「溶出試験法パドル法」による。

試験条件：

試験液量：900mL 温度：37±0.5℃

試験液：pH1.2 日本薬局方溶出試験第 1 液

pH5.0 薄めた McIlvaine の緩衝液

pH6.8 日本薬局方溶出試験第 2 液

水 日本薬局方精製水

回転数：50rpm (pH1.2、pH5.0、pH6.8、水)、100rpm (pH6.8)

判定基準：

ガイドラインの判定基準のうち、次の該当する項目に従って類似性を判定した。

【pH1.2、50rpm】、【pH5.0、50rpm】、【pH6.8、50rpm】、【水、50rpm】、【pH6.8、100rpm】：
標準製剤が15分以内に平均85%以上溶出する場合
試験製剤が15分以内に平均85%以上溶出するか、又は15分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

試験結果：


すべての溶出試験条件において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

溶出挙動における類似性（ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「DSEP」及び標準製剤の平均溶出率の比較）


試験条件	溶出時間(分)	平均溶出率(%)			判定	判定基準 (ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」の溶出条件)
		ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」	標準製剤(錠剤、10mg)	差(絶対値)		
50rpm	pH1.2	15	102.1	100.6	1.5	≥85%又は±15%
	pH5.0	15	103.0	101.1	1.9	
	pH6.8	15	101.6	96.5	5.1	
	水	15	101.4	96.9	4.5	
100rpm	pH6.8	15	102.1	101.7	0.4	

(溶出曲線)


pH1.2/50rpm




pH5.0/50rpm




pH6.8/50rpm



水/50rpm





8. 生物学的試験法

該当しない

9. 製剤中の有効成分の確認試験法

日本薬局方ゾルピデム酒石酸塩錠の確認試験法による。
紫外可視吸光度測定法

10. 製剤中の有効成分の定量法

日本薬局方ゾルピデム酒石酸塩錠の定量法による。
液体クロマトグラフィー

11. 力 価

該当しない

12. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

13. 治療上注意が必要な容器に関する情報

該当資料なし

14. その他

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

不眠症（統合失調症及び躁うつ病に伴う不眠症は除く）

<効能・効果に関連する使用上の注意>

本剤の投与は、不眠症の原疾患を確定してから行うこと。なお、統合失調症あるいは躁うつ病に伴う不眠症には本剤の有効性は期待できない。

2. 用法及び用量

通常、成人にはゾルピデム酒石酸塩として1回5～10mgを就寝直前に経口投与する。なお、高齢者には1回5mgから投与を開始する。年齢、症状、疾患により適宜増減するが、1日10mgを超えないこととする。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

1. 本剤に対する反応には個人差があり、また、もうろう状態、睡眠随伴症状（夢遊症状等）は用量依存的にあらわれるので、本剤を投与する場合には少量（1回5mg）から投与を開始すること。やむを得ず増量する場合は観察を十分に行いながら慎重に投与すること。ただし、10mgを超えないこととし、症状の改善に伴って減量に努めること。
2. 本剤を投与する場合、就寝の直前に服用させること。また、服用して就寝した後、患者が起床して活動を開始するまでに十分な睡眠時間がとれなかった場合、又は睡眠途中において一時的に起床して仕事等を行った場合などにおいて健忘があらわれたとの報告があるので、薬効が消失する前に活動を開始する可能性があるときは服用させないこと。

3. 臨床成績

(1)臨床データパッケージ（2009年4月以降承認品目）

該当資料なし

(2)臨床効果

該当資料なし

(3)臨床薬理試験：忍容性試験

該当資料なし

(4)探索的試験：用量反応探索試験

該当資料なし

(5)検証的試験

1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

2) 比較試験

該当資料なし

3) 安全性試験

該当資料なし

4) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6)治療的使用

- 1) 使用成績調査・特定使用成績調査（特別調査）・製造販売後臨床試験（市販後臨床試験）

該当資料なし

- 2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当資料なし

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

イミダゾピリジン構造を有する非ベンゾジアゼピン系睡眠薬

2. 薬理作用

(1)作用部位・作用機序³⁾

ベンゾジアゼピン系化合物ではないが、ベンゾジアゼピン結合部位に選択的に結合し、同様の作用を示す。ベンゾジアゼピン結合部位は抑制性神経伝達物質 GABA_A 受容体のサブユニットに存在し、ここに結合することにより GABA_A 受容体への GABA の親和性を高め、GABA_A 系の神経抑制機構を増強して催眠鎮静作用を示す。

(2)薬効を裏付ける試験成績

該当資料なし

(3)作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1)治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2)最高血中濃度到達時間⁴⁾

健康成人男子 1錠投与時

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」 : 0.7 時間

ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」 : 1.2 時間

(3)臨床試験で確認された血中濃度⁴⁾

生物学的同等性試験


ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」及びゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」と各標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（ゾルピデム酒石酸塩として、それぞれ5mg、10mg）を健康成人男子に絶食後単回経口投与して血漿中ゾルピデム濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ（AUC、 C_{max} ）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80)\sim\log(1.25)$ の範囲であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

1) ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」

薬物動態パラメータ

	AUC ₀₋₂₄ (ng・hr/mL)	C_{max} (ng/mL)	T_{max} (hr)	$t_{1/2}$ (hr)
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」	310±137	85.1±31.6	0.69±0.31	2.00±0.39
標準製剤（錠剤、5mg）	290±132	77.8±29.4	0.98±0.44	2.10±0.36

(Mean±S.D.,n=20)



血漿中ゾルピデム濃度推移


血漿中濃度並びに AUC、 C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、血液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2) ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「DSEP」

薬物動態パラメータ

	AUC ₀₋₂₄ (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」	530±265	141.6±44.2	1.23±1.08	1.86±0.56
標準製剤（錠剤、10mg）	577±309	158.4±75.2	1.09±0.85	1.92±0.66

(Mean±S.D.,n=20)



血漿中ゾルピデム濃度推移

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、血液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4)中毒域

該当資料なし

(5)食事・併用薬の影響

「Ⅷ.7.相互作用」の項を参照

(6)母集団（ポピュレーション）解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1)コンパートメントモデル

該当資料なし

(2)吸収速度定数

該当資料なし

(3)バイオアベイラビリティ

該当資料なし

(4)消失速度定数⁴⁾

健康成人男子単回投与（1錠）

	錠 5mg 「DSEP」 (n=20)	錠 10mg 「DSEP」 (n=20)
Kel (hr ⁻¹)	0.360±0.079	0.393±0.080

(Mean±S.D.)

(5)クリアランス

該当資料なし

(6)分布容積

該当資料なし

(7)血漿蛋白結合率³⁾

約 96%

3. 吸 収

該当資料なし

4. 分 布

(1)血液－脳関門通過性

該当資料なし

(2)血液－胎盤関門通過性

該当資料なし

(3)乳汁への移行性

「VIII.10.妊婦、産婦、授乳婦等への投与(2)」の項を参照

(4)髄液への移行性

該当資料なし

(5)その他の組織への移行性

該当資料なし

5. 代 謝

(1)代謝部位及び代謝経路³⁾

大部分は肝で代謝され、その主なものは芳香環のメチル基が酸化されてカルボン酸となった薬理活性のない代謝物であり、CYP3A4、CYP2C9、CYP1A2 など複数の分子種により代謝される。

(2)代謝に関与する酵素（CYP450 等）の分子種

主として肝薬物代謝酵素 CYP3A4 及び一部 CYP2C9、CYP1A2 で代謝される。

(3)初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4)代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

(5)活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

6. 排 泄

(1)排泄部位及び経路

該当資料なし

(2)排泄率³⁾

24時間までの尿中排泄率は0.5%以下である。

(3)排泄速度

該当資料なし

7. 透析等による除去率

血液透析では除去されない。

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

【警告】

本剤の服用後に、もうろう状態、睡眠随伴症状（無遊症状等）があらわれることがある。また、入眠までの、あるいは中途覚醒時の出来事を記憶していないことがあるので注意すること。

2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 重篤な肝障害のある患者〔代謝機能の低下により血中濃度が上昇し、作用が強くあらわれるおそれがある。〕
3. 重症筋無力症の患者〔筋弛緩作用により症状を悪化させるおそれがある。〕
4. 急性狭隅角緑内障の患者〔眼圧が上昇し、症状を悪化させるおそれがある。〕

【原則禁忌】（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）
肺性心、肺気腫、気管支喘息及び脳血管障害の急性期などで呼吸機能が高度に低下している場合〔呼吸抑制により炭酸ガスナルコーシスを起こしやすい。〕

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞

本剤の投与は、不眠症の原疾患を確定してから行うこと。なお、統合失調症あるいは躁うつ病に伴う不眠症には本剤の有効性は期待できない。

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞

1. 本剤に対する反応には個人差があり、また、もうろう状態、睡眠随伴症状（無遊症状等）は用量依存的にあらわれるので、本剤を投与する場合には少量（1回 5mg）から投与を開始すること。やむを得ず増量する場合は観察を十分に行いながら慎重に投与すること。ただし、10mg を超えないこととし、症状の改善に伴って減量に努めること。
2. 本剤を投与する場合、就寝の直前に服用させること。また、服用して就寝した後、患者が起床して活動を開始するまでに十分な睡眠時間がとれなかった場合、又は睡眠途中において一時的に起床して仕事等を行った場合などにおいて健忘があらわれたとの報告があるので、薬効が消失する前に活動を開始する可能性があるときは服用させないこと。

5. 慎重投与内容とその理由

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 衰弱患者 [薬物の作用が強くあらわれ、副作用が発現しやすい。]
 (2) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
 (3) 心障害のある患者 [血圧低下があらわれるおそれがあり、心障害のある患者では症状の悪化につながるおそれがある。]
 (4) 肝障害のある患者（「禁忌」の項参照）
 (5) 腎障害のある患者 [排泄が遅延し、作用が強くあらわれるおそれがある。]
 (6) 脳に器質的障害のある患者 [作用が強くあらわれるおそれがある。]

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

2. 重要な基本的注意

- (1) 本剤の投与は継続投与を避け、短期間にとどめること。やむを得ず継続投与を行う場合には、定期的に患者の状態、症状などの異常の有無を十分確認のうえ慎重に行うこと。
 (2) 本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

7. 相互作用

3. 相互作用

本剤は、主として肝薬物代謝酵素 CYP3A4 及び一部 CYP2C9、CYP1A2 で代謝される。

(1) 併用禁忌とその理由

該当しない

(2) 併用注意とその理由

3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
麻酔剤	呼吸抑制があらわれることがあるので、慎重に投与すること。	相加的に呼吸が抑制される可能性がある。
中枢神経抑制剤 フェノチアジン誘導体、 バルビツール酸誘導体 等	相互に中枢神経抑制作用が増強することがあるので、慎重に投与すること。	本剤及びこれらの薬剤は中枢神経抑制作用を有する。
アルコール（飲酒）	精神機能・知覚・運動機能等の低下が増強することがあるので、できるだけ飲酒を控えさせること。	アルコールは GABA _A 受容体に作用すること等により中枢神経抑制作用を示すため、併用により相互に中枢神経抑制作用を増強することがある。
リファンピシン	本剤の血中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。	薬物代謝酵素 CYP3A4 が誘導され、本剤の代謝が促進される。

8. 副作用

(1)副作用の概要

<p>4. 副作用</p> <p>本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p>
--

(2)重大な副作用と初期症状

<p>4. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用（頻度不明）</p> <p>1) 依存性、離脱症状：連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、慎重に投与すること。また、連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、反跳性不眠、いらいら感等の離脱症状があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。</p> <p>2) 精神症状、意識障害：せん妄、錯乱、夢遊症状、幻覚、興奮、脱抑制、意識レベルの低下等の精神症状及び意識障害があらわれることがあるので、患者の状態を十分観察し、異常が認められた場合には投与を中止すること。</p> <p>3) 一過性前向性健忘、もうろう状態：一過性前向性健忘（服薬後入眠までの出来事を覚えていない、途中覚醒時の出来事を覚えていない）、もうろう状態があらわれることがあるので、服薬後は直ぐ就寝させ、睡眠中に起こさないように注意すること。なお、十分に覚醒しないまま、車の運転、食事等を行い、その出来事を記憶していないとの報告がある。異常が認められた場合には投与を中止すること。</p> <p>4) 呼吸抑制：呼吸抑制があらわれることがある。また、呼吸機能が高度に低下している患者に投与した場合、炭酸ガスナルコーシスを起こすことがあるので、このような場合には気道を確保し、換気をはかるなど適切な処置を行うこと。</p> <p>5) 肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP、ALPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>
--

(3)その他の副作用

<p>4. 副作用</p> <p>(2) その他の副作用</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>頻 度 不 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>精神神経系</td> <td>ふらつき、眠気、頭痛、残眠感、頭重感、めまい、不安、悪夢、気分高揚、錯視、しびれ感</td> </tr> <tr> <td>血液</td> <td>白血球増多、白血球減少</td> </tr> <tr> <td>肝臓</td> <td>ALT（GPT）上昇、γ-GTP 上昇、AST（GOT）上昇、LDH上昇</td> </tr> <tr> <td>腎臓</td> <td>蛋白尿</td> </tr> <tr> <td>消化器</td> <td>悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、下痢、口の錯感覚</td> </tr> <tr> <td>循環器</td> <td>動悸</td> </tr> <tr> <td>過敏症^{注1)}</td> <td>発疹、そう痒感</td> </tr> <tr> <td>骨格筋</td> <td>倦怠感、疲労、下肢脱力感</td> </tr> <tr> <td>眼</td> <td>複視、視力障害、霧視</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>口渇、不快感、味覚異常、転倒^{注2)}</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1) 発現した場合には、投与を中止すること。</p> <p>注2) 転倒により高齢者が骨折する例が報告されている。</p>		頻 度 不 明	精神神経系	ふらつき、眠気、頭痛、残眠感、頭重感、めまい、不安、悪夢、気分高揚、錯視、しびれ感	血液	白血球増多、白血球減少	肝臓	ALT（GPT）上昇、 γ -GTP 上昇、AST（GOT）上昇、LDH上昇	腎臓	蛋白尿	消化器	悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、下痢、口の錯感覚	循環器	動悸	過敏症 ^{注1)}	発疹、そう痒感	骨格筋	倦怠感、疲労、下肢脱力感	眼	複視、視力障害、霧視	その他	口渇、不快感、味覚異常、転倒 ^{注2)}
	頻 度 不 明																					
精神神経系	ふらつき、眠気、頭痛、残眠感、頭重感、めまい、不安、悪夢、気分高揚、錯視、しびれ感																					
血液	白血球増多、白血球減少																					
肝臓	ALT（GPT）上昇、 γ -GTP 上昇、AST（GOT）上昇、LDH上昇																					
腎臓	蛋白尿																					
消化器	悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、下痢、口の錯感覚																					
循環器	動悸																					
過敏症 ^{注1)}	発疹、そう痒感																					
骨格筋	倦怠感、疲労、下肢脱力感																					
眼	複視、視力障害、霧視																					
その他	口渇、不快感、味覚異常、転倒 ^{注2)}																					

(4)項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

(5)基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

(6)薬物アレルギーに対する注意及び試験法

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

4. 副作用

(2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、そう痒感

注1) 発現した場合には、投与を中止すること。

9. 高齢者への投与

5. 高齢者への投与

運動失調が起こりやすい。また、副作用が発現しやすいので、少量（1回 5mg）から投与を開始し、1回 10mg を超えないこと。

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。妊娠後期に本剤を投与された患者より出生した児に呼吸抑制、痙攣、振戦、易刺激性、哺乳困難等の離脱症状があらわれることがある。なお、これらの症状は、新生児仮死として報告される場合もある。〕
- (2) 授乳婦：授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。〔母乳中へ移行することが報告されており、新生児に嗜眠を起こすおそれがある。〕

11. 小児等への投与

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当資料なし

13. 過量投与

8. 過量投与

症状：本剤単独の過量投与では、傾眠から昏睡までの意識障害が報告されているが、さらに中枢神経抑制症状、血圧低下、呼吸抑制、無呼吸等の重度な症状があらわれるおそれがある。

処置：呼吸、脈拍、血圧の監視を行うとともに、催吐、胃洗浄、吸着剤・下剤の投与、輸液、気道の確保等の適切な処置を行うこと。また、本剤の過量投与が明白又は疑われた場合の処置としてフルマゼニル（ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤）を投与する場合には、使用前にフルマゼニルの使用上の注意（禁忌、慎重投与、相互作用等）を必ず読むこと。なお、本剤は血液透析では除去されない。

14. 適用上の注意

9. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

15. その他の注意

10. その他の注意

投与した薬剤が特定されないままにフルマゼニル（ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤）を投与された患者で、新たに本剤を投与する場合、本剤の鎮静、抗痙攣作用が変化、遅延するおそれがある。

16. その他

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1)薬効薬理試験（「VI.薬効薬理に関する項目」参照）

(2)副次的薬理試験

該当資料なし

(3)安全性薬理試験

該当資料なし

(4)その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1)単回投与毒性試験

該当資料なし

(2)反復投与毒性試験

該当資料なし

(3)生殖発生毒性試験

該当資料なし

(4)その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤：向精神薬、習慣性医薬品（注意－習慣性あり）、
処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）
有効成分：向精神薬、習慣性医薬品（注意－習慣性あり）

2. 有効期間又は使用期限

使用期限：3年（安定性試験結果に基づく）

3. 貯法・保存条件

室温保存

保管方法

錠剤分割後は遮光して保存すること。

4. 薬剤取扱い上の注意点

(1)薬局での取扱いについて

該当資料なし

(2)薬剤交付時の注意（患者等に留意すべき必須事項等）

「Ⅷ.14.適用上の注意」の項を参照

5. 承認条件等

該当しない

6. 包 装

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 「DSEP」 : (PTP) 100錠
140錠 (14錠×10)
500錠
(バラ) 500錠
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 「DSEP」 : (PTP) 100錠
140錠 (14錠×10)
500錠
(バラ) 500錠

7. 容器の材質

PTP包装：ポリプロピレン、アルミ箔

バラ包装：ポリエチレン（ボトル）、ポリプロピレン（キャップ）

化粧箱：紙

8. 同一成分・同効薬

同一成分薬：マイスリー錠 5mg、マイスリー錠 10mg（アステラス製薬株式会社）

同効薬：ゾピクロン、トリアゾラム、ニトラゼパム、ラメルテオン等

9. 国際誕生年月日⁵⁾

1987年6月

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

製品名	製造販売承認年月日	承認番号
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」	2012年2月15日	22400AMX00328000
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」	2012年2月15日	22400AMX00329000

11. 薬価基準収載年月日

2012年6月22日

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

14. 再審査期間

該当しない

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報

厚生労働大臣告示第97号（平成20年3月19日付、平成18年厚生労働省告示第107号一部改正）に基づき、1回30日分を超える投薬は認められていない。また、使用上の注意には以下の記載がある。

重要な基本的注意

本剤の投与は継続投与を避け、短期間にとどめること。やむを得ず継続投与を行う場合には、定期的に患者の状態、症状などの異常の有無を十分確認のうえ慎重に行うこと。

16. 各種コード

販売名	HOT（9桁）番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト電算コード
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」	121703201	1129009F1068	622170301
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「DSEP」	121704901	1129009F2064	622170401

17. 保険給付上の注意

本剤は保険診療上の後発医薬品である。

XI. 文 献

1. 引用文献

- 1) 社内資料（安定性）
- 2) 社内資料（溶出性）
- 3) 第十六改正日本薬局方解説書 2011:C-2602, 廣川書店
- 4) 社内資料（生物学的同等性）
- 5) 日本薬局方医薬品情報 2011（日本薬剤師研修センター編） 2011:1005, じほう

2. その他の参考文献

該当資料なし

XII. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

該当資料なし

2. 海外における臨床支援情報

該当資料なし

XIII. 備 考

その他の関連資料

該当資料なし

〔文献請求先・製品情報お問い合わせ先〕
第一三共エスファ株式会社 お客様相談室
〒103-8426 東京都中央区日本橋本町 3-5-1
TEL:0120-100-601