

適正使用のお願い

深在性真菌症治療剤

日本薬局方 ポリコナゾール錠

**ポリコナゾール錠 50mg「DSEP」**  
**ポリコナゾール錠 200mg「DSEP」**

劇薬、処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2016年10月

製造販売元 **第一三共エスファ株式会社**  
販売提携 **第一三共株式会社**

本剤のご使用に際しては、以下の事項について十分に確認し、適正にご使用くださいますようお願い申し上げます。

1. 本剤投与開始にあたっては、あらかじめワルファリン服用の有無を確認すること。
2. ワルファリン投与中に本剤を投与する場合には、著しいINR上昇例が報告されているので、より頻回にPTを測定するなど、注意すること。

本剤の【使用上の注意】にも、以下の記載がありますのでご確認ください。

【使用上の注意】(抜粋)

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

(4) ワルファリンを投与中の患者

2. 重要な基本的注意

(6) 本剤とワルファリンとの併用において、ワルファリンの作用が増強し、著しいINR上昇を来した症例が報告されている。本剤投与開始にあたっては、あらかじめワルファリン服用の有無を確認し、ワルファリンと併用する場合は、プロトロンビン時間測定及びトロンボテストの回数を増やすなど慎重に投与すること。

3. 相互作用

(2) 併用注意(併用に注意すること)


| 薬剤名等                    | 臨床症状・措置方法   | 機序・危険因子                      |
|-------------------------|---|------------------------------|
| クマリン系抗凝血薬<br>ワルファリンカリウム | 本剤との併用により、プロトロンビン時間が1.9倍延長した。また、著しいINR上昇を来した症例が報告されている。 | 本剤はワルファリンの代謝酵素(CYP2C9)を阻害する。 |

☆最新の添付文書情報は、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) もしくは弊社ホームページ (<http://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>) に掲載しておりますので、併せてご参照いただきますようお願い申し上げます。

**【資料請求先】**

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室  
〒103-8426 東京都中央区日本橋本町3-5-1  
Tel: 0120-100-601

製造販売元  
**第一三共エスファ株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携  
 **第一三共株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-5-1