

使用上の注意改訂のお知らせ

アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤

レトゾール錠2.5mg「DSEP」

レトゾール錠

劇薬、処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2017年7月

製造販売元 第一三共エスファ株式会社
販売提携 第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。
つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社MRに速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂の概要

「その他の副作用」の項に「神経系障害：回転性めまい」、「全身障害：胸痛」を追記しました
《自主改訂》。

2. 改訂内容〔() 自主改訂〕

改 訂 後		改 訂 前	
【使用上の注意】		【使用上の注意】	
4. 副作用		4. 副作用	
(1) 現行通り		(1) 略	
(2) その他の副作用		(2) その他の副作用	
	頻度不明		頻度不明
	現行通り		略
神経系障害	頭痛、浮動性めまい、注意力障害、傾眠、しびれ感、味覚障害、回転性めまい、記憶障害、異常感覚	神経系障害	頭痛、浮動性めまい、注意力障害、傾眠、しびれ感、味覚障害、記憶障害、異常感覚
	現行通り		略
全身障害	疲労、けん怠感、口渇、熱感、脱力、上肢浮腫、全身浮腫、胸痛、発熱、粘膜乾燥、腫瘍疼痛	全身障害	疲労、けん怠感、口渇、熱感、脱力、上肢浮腫、全身浮腫、発熱、粘膜乾燥、腫瘍疼痛

☆最新の添付文書情報は、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) もしくは弊社ホームページ (<http://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>) に掲載しておりますので、併せてご参照いただきますようお願い申し上げます。

なお、PMDA による医薬品医療機器情報配信サービス「PMDA メディナビ」にご登録いただきますと、医薬品の重要な安全性情報がタイムリーにメール配信されます。
(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html>)



流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数が必要ですので、ご使用に際しましては、ここにご案内申し上げました改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

【資料請求先】

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室
〒103-8426 東京都中央区日本橋本町3-5-1
Tel: 0120-100-601

製造販売元

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1



Daiichi-Sankyo

販売提携

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1