Daiichi-Sankyo

使用上の注意改訂のお知らせ

選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
リバーロキサバン錠

リバーロキサバン錠10mg「バイエル」
リバーロキサバン錠15mg「バイエル」

リバーロキサバン口腔内崩壊錠

リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」

処方箋医薬品：注意ー医師等の処方箋により使用すること

2026年10月

製造販売元　バイエル ライフサイエンス株式会社
販売元　第一三共エスファ株式会社
販売提携　第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。

つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社MRに速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂の概要

「**その他の副作用**」の項の「血管浮腫」を「血管性浮腫」に記載整備しました≪自主改訂≫。

2. 改訂内容〔(＿＿)自主改訂〕

改　訂　後

11. 副作用
現行通り
11.1 現行通り
11.2 その他の副作用

	1～10%未満	0.1～1%未満	0.1%未満	頻度不明
現行通り				
過敏症		発疹、そう痒、アレルギー性皮膚炎	じん麻疹(全身性そう痒症等)、アレルギー反応、血管性浮腫	
現行通り				

改　訂　前

11. 副作用
略
11.1 略
11.2 その他の副作用

	1～10%未満	0.1～1%未満	0.1%未満	頻度不明
略				
過敏症		発疹、そう痒、アレルギー性皮膚炎	じん麻疹(全身性そう痒症等)、アレルギー反応、血管浮腫	
略				

3. 改訂理由

今回の改訂は自主改訂によるものです。

●「11.2 その他の副作用」の項

「血管浮腫」の用語を、関連学会のガイドライン等で使用されている「血管性浮腫」に記載整備しました。

☆詳細は電子化された添付文書（電子添文）をご参照いただきますようお願い申し上げます。

最新の電子添文は以下のホームページに掲載しております。

・PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」：
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html

・弊社ホームページ：
https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/

また、専用アプリ「添文ナビ」より、GS1 データバーを読み取ることでも電子添文等をご参照いただけます。

リバーロキサバン錠「バイエル」
(01)14987081186980

リバーロキサバン OD 錠「バイエル」
(01)14987081186874

［お問い合わせ先］
第一三共エスファ株式会社　お客様相談室　0120-100-601　受付時間：平日9：00～17：30（土・日・祝日・弊社休日を除く）

製造販売元
バイエル ライフサイエンス株式会社
大阪市北区梅田2-4-9

販売元
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPRIA1N01501-1
2026年10月作成