

## 使用上の注意改訂のお知らせ

高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗薬

# ベニジピン塩酸塩錠 2mg「YD」 ベニジピン塩酸塩錠 4mg「YD」 ベニジピン塩酸塩錠 8mg「YD」

日本薬局方 ベニジピン塩酸塩錠

劇薬  
処方せん医薬品：注意—医師等の処方せんにより使用すること

2011年2月

製造販売元 株式会社陽進堂  
販売元 第一三共エスファ株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。  
つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社MRに速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂の概要

「その他の副作用」の項に、「霧視」を追記しました。《自主改訂》

### 2. 改訂内容〔( ) 自主改訂〕

改 訂 後	改 訂 前																								
<p><b>4. 副作用</b> 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 (協和発酵キリン株式会社製造販売のコニール錠 2・4・8 の添付文書内容に基づき記載)</p> <p>(1) <b>重大な副作用</b> (頻度不明) 現行通り</p> <p>(2) <b>その他の副作用</b> 下記のような副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には減量・休薬等の適切な処置を行うこと。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">0.1～5%未満</th> <th style="width: 20%;">0.1%未満</th> <th style="width: 50%;">頻度不明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">現行通り</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他</td> <td>浮腫(顔・下腿・手)、CK(CPK)上昇</td> <td>耳鳴、手指の発赤・熱感、肩こり、咳嗽、頻尿、倦怠感、カリウム上昇</td> <td>女性化乳房<sup>注)</sup>、結膜充血、霧視、発汗</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">注) 投与を中止すること。</p>		0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明	現行通り				その他	浮腫(顔・下腿・手)、CK(CPK)上昇	耳鳴、手指の発赤・熱感、肩こり、咳嗽、頻尿、倦怠感、カリウム上昇	女性化乳房 <sup>注)</sup> 、結膜充血、霧視、発汗	<p><b>4. 副作用</b> 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 (協和発酵キリン株式会社製造販売のコニール錠 2・4・8 の添付文書内容に基づき記載)</p> <p>(1) <b>重大な副作用</b> (頻度不明) 略</p> <p>(2) <b>その他の副作用</b> 下記のような副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には減量・休薬等の適切な処置を行うこと。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">0.1～5%未満</th> <th style="width: 20%;">0.1%未満</th> <th style="width: 50%;">頻度不明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">略</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他</td> <td>浮腫(顔・下腿・手)、CK(CPK)上昇</td> <td>耳鳴、手指の発赤・熱感、肩こり、咳嗽、頻尿、倦怠感、カリウム上昇</td> <td>女性化乳房<sup>注)</sup>、結膜充血、発汗</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">注) 投与を中止すること。</p>		0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明	略				その他	浮腫(顔・下腿・手)、CK(CPK)上昇	耳鳴、手指の発赤・熱感、肩こり、咳嗽、頻尿、倦怠感、カリウム上昇	女性化乳房 <sup>注)</sup> 、結膜充血、発汗
	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明																						
現行通り																									
その他	浮腫(顔・下腿・手)、CK(CPK)上昇	耳鳴、手指の発赤・熱感、肩こり、咳嗽、頻尿、倦怠感、カリウム上昇	女性化乳房 <sup>注)</sup> 、結膜充血、霧視、発汗																						
	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明																						
略																									
その他	浮腫(顔・下腿・手)、CK(CPK)上昇	耳鳴、手指の発赤・熱感、肩こり、咳嗽、頻尿、倦怠感、カリウム上昇	女性化乳房 <sup>注)</sup> 、結膜充血、発汗																						

### 3. 改訂理由

国内外での副作用症例が集積されたことから「その他の副作用」の項に追記《自主改訂》して注意喚起することとなりました。

☆添付文書全文については弊社ホームページに掲載しておりますので、併せてご参照いただきますようお願い申し上げます。(http://www.daiichisankyo-ep.co.jp/)

流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数が必要ですので、ご使用に際しましては、ここにご案内申し上げました改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

**【禁忌】(次の患者には投与しないこと)**

1. 心原性ショックの患者〔症状が悪化するおそれがある。〕
2. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人(「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照)

**【使用上の注意】**

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
  - (1) 過度に血圧の低い患者
  - (2) 重篤な肝機能障害のある患者〔肝機能障害が悪化するおそれがある。〕
  - (3) 高齢者(「高齢者への投与」の項参照)
2. 重要な基本的注意
  - (1) カルシウム拮抗剤の投与を急に中止したとき、**症状が悪化した症例が報告されているので、本剤の休薬を要する場合は徐々に減量し、観察を十分に行うこと。**また、患者に医師の指示なしに服薬を中止しないように注意すること。
  - (2) 本剤の投与により、**過度の血圧低下を起し、一過性の意識消失等**があらわれるおそれがあるため、そのような場合には減量又は休薬するなど適切な処置を行うこと。
  - (3) 降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

**3. 相互作用**

本剤は、主としてCYP3A4で代謝される。

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
降圧作用を有する薬剤	血圧が過度に低下することがある。	降圧作用が増強される。
ジゴキシン	ジギタリス中毒があらわれるおそれがある。ジゴキシンの血中濃度と心臓の状態をモニターし、異常が認められた場合には、ジゴキシンの用量の調節又は本剤の投与を中止する。	カルシウム拮抗剤が、ジゴキシンの尿細管分泌を阻害し、血中ジゴキシン濃度を上昇させるとの報告がある。
シメチジン	血圧が過度に低下するおそれがある。	シメチジンが肝ミクロソームにおけるカルシウム拮抗剤の代謝酵素を阻害する一方で胃酸を低下させ薬物の吸収を増加させるとの報告がある。
リファンピシン	降圧作用が減弱されるおそれがある。	リファンピシンが肝の薬物代謝酵素を誘導し、カルシウム拮抗剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させるとの報告がある。
イトラコナゾール	血圧が過度に低下することがある。	イトラコナゾールが、肝臓における本剤の代謝を阻害し、本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。
グレープフルーツジュース	血圧が過度に低下することがある。	グレープフルーツジュースが、肝臓における本剤の代謝を阻害し、本剤の血中濃度が上昇する。

**4. 副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。  
(協和発酵キリン株式会社製造販売のコニール錠2・4・8の添付文書内容に基づき記載)

**(1) 重大な副作用(頻度不明)**

肝機能障害、黄疸：AST(GOT)、ALT(GPT)、 $\gamma$ -GTPの上昇等を

伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

**(2) その他の副作用**

下記のような副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には減量・休薬等の適切な処置を行うこと。

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
肝臓	肝機能異常 〔AST(GOT)、ALT(GPT)、 $\gamma$ -GTP、ビリルビン、ALP、LDH上昇等〕		
腎臓	BUN上昇、 クレアチニン上昇		
血液	白血球減少、 好酸球増加		血小板減少
循環器	動悸、顔面紅潮、 ほてり、血圧低下	胸部重圧感、徐脈、 頻脈	期外収縮
精神神経系	頭痛、頭重、めまい、 ふらつき、立ちくらみ	眠気、しびれ感	
消化器	便秘	腹部不快感、嘔気、 胸やけ、口渇	下痢、嘔吐
過敏症 <sup>※</sup>	発疹	そう痒感	光線過敏症
口腔			歯肉肥厚
※その他	浮腫(顔・下腿・手)、 CK(CPK)上昇	耳鳴、手指の発赤・ 熱感、肩こり、咳嗽、 頻尿、倦怠感、 カリウム上昇	女性化乳房 <sup>①)</sup> 、 結膜充血、 <b>霧視</b> 、 発汗

注) 投与を中止すること。

**5. 高齢者への投与**

一般的に高齢者では、過度の降圧は好ましくないとされていることから、高血圧症の高齢者に使用する場合は、低用量(2mg/日)から投与を開始するなど経過を十分に観察しながら慎重に投与することが望ましい。

**6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与**

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与を避けること。〔動物実験(ラット、ウサギ)で胎児毒性が、また妊娠末期に投与すると妊娠期間及び分娩時間が延長することが報告されている。〕
- (2) 授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。〔動物実験(ラット)で母乳中へ移行することが報告されている。〕

**7. 小児等への投与**

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

**8. 過量投与**

過量投与により過度の血圧低下を起すおそれがある。著しい血圧低下が認められた場合には下肢の挙上、輸液投与、昇圧剤投与等の適切な処置を行う。なお、本剤は蛋白結合率が高いため、透析による除去は有用ではない。

**9. 適用上の注意**

**薬剤交付時**：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

**10. その他の注意**

CAPD(持続的外来腹膜透析)施行中の患者の透析排液が白濁することが報告されているので、腹膜炎等との鑑別に留意すること。

注) ( ) 自主改訂

**【資料請求先】**

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室  
〒103-8426 東京都中央区日本橋本町3-5-1  
Tel: 0120-100-601

