

# ベンゾジアゼピン受容体作動薬 — 適正使用のお願い —

2017年3月  
更新 2024年5月

ベンゾジアゼピン受容体作動薬（以下、「本剤」という。）は、**用量のみならず使用期間にも注意して適正に使用いただくことで、期待される有効性と安全性が確保される薬剤**です。

これまで、大量連用による依存性及び離脱症状については電子添文にて注意喚起がされており、承認用量の範囲内においても、本剤の連用により依存性関連の副作用が発現した症例が報告されたことについても周知してきたところですが、引き続きベンゾジアゼピン受容体作動薬での依存性が疑われる症例が報告されています。

上記の状況に鑑み、本剤の薬物依存等についての以下の注意喚起を行いますので、**最新の電子添文等を十分確認の上、患者の適切な服薬管理、服薬指導をお願いします。**

- 承認用量の範囲内においても、連用により薬物依存が生じることがあるため、
  - ①用量及び使用期間に注意し、慎重に投与してください。
  - ②催眠鎮静薬又は抗不安薬として使用する場合には、漫然とした継続投与による長期使用を避けてください。投与を継続する場合には、治療上の必要性を検討してください。
- 承認用量の範囲内においても、連用中における投与量の急激な減少又は投与の中止により、原疾患の悪化や離脱症状があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行ってください。
- 統合失調症患者や高齢者に限らず、刺激興奮、錯乱等があらわれることがあるので、観察を十分に行ってください。

## <該当品目>

### 【不眠症治療薬】

・エスゾピクロン錠1mg、錠2mg、錠3mg [DSEP]

### 【入眠剤】

・ゾルピデム酒石酸塩錠5mg、錠10mg [DSEP]

### 【睡眠導入剤】

・プロチゾラム錠0.25mg [日新]

☆最新の電子化された添付文書（電子添文）及び「適正使用のお願い」は以下のホームページをご参照いただきますようお願い申し上げます。

・弊社ホームページ：

<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>

・PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」：

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

PMDA からの医薬品適正使用のお願い「ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について」が下記に公表されておりますので併せてご参照いただきますようお願い申し上げます。

・PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」：PMDA からの医薬品適正使用のお願い

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/properly-use-alert/0002.html>

また、専用アプリ「添文ナビ」より、GS1 データバーを読み取ることでも電子添文等をご参照いただけます。

エスゾピクロン錠「DSEP」



(01)14987081185150

ゾルピデム酒石酸塩錠「DSEP」



(01)14987081182418

プロチゾラム錠「日新」



(01)14987081183484

### <製品に関する問い合わせ先>

企 業 名：第一三共エスファ株式会社

問い合わせ先：お客様相談室 ☎0120-100-601