

## アリルアミン系経口抗真菌剤

日本標準商品分類番号 87629

処方箋医薬品<sup>®</sup> ※注意-医師等の処方箋により使用すること

薬価基準収載

日本薬局方 テルビナフィン塩酸塩錠

# テルビナフィン錠 125mg「サンド」

TERBINAFINE TABLETS「SANDOZ」

先発医薬品名: ラミシール<sup>®</sup>錠125mg[サンファーマ]



●個装箱・PTPシートは40%縮小です。

●錠125mg「サンド」



錠125mg(PTP:10錠シート)L:94mm×W:35mm

●錠剤・PTPシートは実物大です。

最新の電子化された添付文書(電子添文)は専用アプリ「添文ナビ」よりGS1データバーを読み取りの上、ご参照下さい。



### 【警告】

重篤な肝障害(肝不全、肝炎、胆汁うっ滞、黄疸等)及び汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている。本剤を使用する場合には、投与前に肝機能検査及び血液検査を行い、本剤の投与中は随伴症状に注意し、定期的に肝機能検査及び血液検査を行うなど観察を十分に行うこと(「禁忌」、「重要な基本的注意」、「副作用」の項参照)。本剤の投与開始にあたっては、添付文書を熟読すること。

### 【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

1. 重篤な肝障害のある患者[肝障害が増悪するおそれがある(「副作用」の項参照)。]
2. 汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少等の血液障害のある患者[血液障害が増悪するおそれがある(「副作用」の項参照)。]
3. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者



第一三共エスファ株式会社

URL <https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>

【お問い合わせ先】

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-100-601 受付時間: 平日9:00~17:30(土・日・祝日・弊社休日を除く)

【夜間・休日 緊急時のお問い合わせ先】

日本中毒情報センター第一三共エスファ受付 ☎ 0120-856-838 受付時間: 平日17:30~翌9:00及び土・日・祝日・弊社休日

# テルビナフィン錠125mg「サンド」 Drug Information

（一般名／テルビナフィン塩酸塩）

規制区分	処方箋医薬品* ※注意—医師等の処方箋により使用すること
貯法	室温保存、気密容器（「取扱い上の注意」の項参照）
使用期限	包装に表示の使用期限内に使用すること。

承認番号	薬価収載	販売開始
21800AMY10008	2006年7月	2006年7月

**警告** 【警告】  
 重篤な肝障害（肝不全、肝炎、胆汁うっ滞、黄疸等）及び汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている。本剤を使用する場合には、投与前に肝機能検査及び血液検査を行い、本剤の投与中は随伴症状に注意し、定期的に肝機能検査及び血液検査を行うなど観察を十分に行うこと（「禁忌」、「重要な基本的注意」、「副作用」の項参照）。  
 本剤の投与開始にあたっては、添付文書を熟読すること。

**禁忌** 【禁忌】（次の患者には投与しないこと）  
 1. 重篤な肝障害のある患者〔肝障害が増悪するおそれがある（「副作用」の項参照）。〕  
 2. 汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少等の血液障害のある患者〔血液障害が増悪するおそれがある（「副作用」の項参照）。〕  
 3. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

組成・性状	1. 組成 1錠中に次の成分を含有		2. 製剤の性状									
	販売名	有効成分	添加物	剤形	色	外形	識別コード (PTP)					
	テルビナフィン錠125mg「サンド」	テルビナフィン塩酸塩（日局）140.625mg （テルビナフィンとして125mg）	バレイショデンプン、デンプングリコール酸ナトリウム、ヒプロメロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム	素錠（割線入）	白色～淡黄白色	<table border="1"> <tr> <th>直径 (mm)</th> <th>厚さ (mm)</th> <th>重さ (mg)</th> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>3.4</td> <td>200</td> </tr> </table>		直径 (mm)	厚さ (mm)	重さ (mg)	9.0	3.4
直径 (mm)	厚さ (mm)	重さ (mg)										
9.0	3.4	200										

**効能・効果**  
 皮膚糸状菌（トリコフィトン属、ミクロスポルム属、エピデルモフィトン属）、カンジダ属、スポロトリックス属、ホンセカア属による下記感染症。  
 但し、外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る。  
 1. 深在性皮膚真菌症  
 白癬性肉芽腫、スポロトリコーシス、クロモミコーシス  
 2. 表在性皮膚真菌症  
 白癬：爪白癬、手・足白癬、生毛部白癬、頭部白癬、ケルスス禿瘡、白癬性毛癢、生毛部急性深在性白癬、硬毛部急性深在性白癬  
 ※手・足白癬は角質増殖型の患者及び趾間型で角化・浸軟の強い患者、生毛部白癬は感染の部位及び範囲より外用抗真菌剤を適用できない患者に限る。  
 カンジダ症：爪カンジダ症  
 （効能・効果に関連する使用上の注意）  
 本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲より本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと。

**用法**  
 通常、成人にはテルビナフィンとして125mgを1日1回食後に経口投与する。  
 なお、年齢、症状により適宜増減する。  
 （用法・用量に関連する使用上の注意）  
 本剤の投与中は随伴症状に注意し、定期的に肝機能検査及び血液検査（血球数算定、白血球分画等）を行うなど観察を十分に行うこと（「副作用」の項参照）。

**使用上の注意**  
 1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）  
 (1) 肝障害のある患者〔慢性もしくは活動性等の肝疾患を有する患者は肝障害が増悪するおそれがあるため、本剤の投与中は頻回に肝機能検査を行うこと、観察を十分に行うこと（「副作用」の項参照）。〕  
 (2) 腎障害のある患者〔高い血中濃度が持続するおそれがある。〕  
 (3) 高齢者（高齢者への投与）の項参照  
 2. 重要な基本的注意  
 (1) 重篤な肝障害（肝不全、肝炎、胆汁うっ滞、黄疸等）があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている。重篤な肝障害は主に投与開始後2ヵ月以内にあらわれるので、投与開始後2ヵ月間は1回の肝機能検査を行うこと。また、その後も定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行うこと（「副作用」の項参照）。  
 (2) 汎血球減少、無顆粒球症及び血小板減少があらわれることがあるので、定期的に血液検査（血球数算定、白血球分画等）を行うなど観察を十分に行うこと（「副作用」の項参照）。  
 (3) 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性全身性発疹性膿疱症、紅皮症（剥脱性皮膚炎）があらわれることがあるので、本剤の投与中は観察を十分に行うこと（「副作用」の項参照）。  
 (4) 本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者にのみ投与すること。  
 (5) 本剤の投与にあたっては、添付文書を熟読し、本剤の副作用について患者に十分説明するとともに、異常が認められた場合には速やかに主治医に連絡するよう指示するなど注意喚起すること。  
 (6) 眠気、めまい・ふらつき等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。  
 3. 相互作用  
 本剤は、主として肝代謝酵素チトクロームP450の分子種CYP2C9、CYP1A2、CYP3A4、CYP2C8、CYP2C19によって代謝され、また、CYP2D6を阻害する。  
 併用注意（併用に注意すること）

黄体・卵巣ホルモン混合製剤 経口避妊薬等	月経異常があらわれたとの報告があること。	機序不明
シクロスポリン	シクロスポリンの血中濃度が低下したとの報告があるため、併用する場合にはシクロスポリンの血中濃度を参考にシクロスポリンの投与量を調節すること。特に、移植患者では拒絶反応の発現に注意すること。	機序不明

4. 副作用  
 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。  
 (1) 重大な副作用（頻度不明）  
 1) 重篤な肝障害（肝不全、肝炎、胆汁うっ滞、黄疸等）：発疹、皮膚そう痒感、発熱、悪心・嘔吐、食欲不振、倦怠感等の随伴症状に注意するとともに、投与開始後2ヵ月間は1回の肝機能検査を行うこと。また、その後も定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。  
 2) 汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少：咽頭炎、発熱、リンパ節腫脹、紫斑、皮下出血等の随伴症状に注意し、定期的に血液検査（血球数算定、白血球分画等）を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。  
 3) 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性全身性発疹性膿疱症、紅皮症（剥脱性皮膚炎）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。  
 4) 横紋筋融解症：横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。  
 5) ショック、アナフィラキシー：ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等の症状が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。  
 6) 薬剤性過敏症候群：初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う重症の重篤な過敏症候群があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遅延化することがあるので注意すること。  
 7) 亜急性皮膚エリテマトーデス：亜急性皮膚エリテマトーデスがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用  

副作用	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹、蕁麻疹、そう痒感、紅腫、光線過敏性反応、顔面浮腫、リンパ節腫脹、多形紅斑、水疱性皮膚炎、乾癬様発疹、血清病様反応
筋・骨格筋	筋肉痛、関節痛
肝臓	γ-GTP、AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、ALPの上昇
血液	白血球減少、貧血
消化器	胃部不快感、腹痛、悪心、下痢、胃部膨満感、食欲不振、嘔吐、嘔吐、舌炎、肺炎
精神神経系	めまい、ふらつき、頭痛、眠気、注意力低下、不眠、しびれ、錯覚、感覚鈍麻、不安、抑うつ
泌尿器	BUN上昇、頻尿
感覚器	味覚異常、味覚消失、耳鳴、嗅覚異常、聴覚障害、聴力低下、露視、視力低下
その他	トリグリセリド上昇、総コレステロール上昇、疲労・倦怠感、動悸、浮腫、月経異常、脱毛、発熱、CK(CPK)上昇、乾癬、血管炎、インフルエンザ様疾患、体重減少

 注) 投与を中止し、適切な処置を行うこと。  
 5. 高齢者への投与  
 本剤は主として肝臓で代謝され、胆汁中及び尿中に排泄されるが、高齢者には一般に肝・腎機能が低下していることが多いため高い血中濃度が持続するおそれがあるため、副作用の発現に注意し、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。  
 6. 妊婦・産婦、授乳婦等への投与  
 (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。ウサギの器官形成期の大量投与（200mg/kg）により母体の摂食量の減少、体重増加の抑制が観察されている。〕  
 (2) 授乳中の婦人には投与しないこと。やむを得ず投与する場合には、授乳を中止させること。〔動物実験（ラット）で乳汁中へ移行することが報告されている。〕  
 7. 小児等への投与  
 低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。  
 8. 過量投与  
 徴候、症状：悪心、腹痛、めまいが報告されている。  
 処置：薬物除去には活性炭投与、症状により対症療法を行う。  
 9. 適用上の注意  
 薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕  
 10. その他の注意  
 サルベの長期用量（150mg/kg以上）経口投与により網膜上に黄白色点が発現したとの報告があるため、本剤を6ヵ月以上の長期にわたり投与する場合には眼科学的検査を実施することが望ましい。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
メチジン フルコナゾール	本剤の血中濃度が上昇するとの報告があるため、併用する場合には用量に注意すること。	これらの薬剤によるチトクロームP450の抑制により本剤の代謝が遅延すること。
リファンピシン	本剤の血中濃度が低下するとの報告があるため、併用する場合には用量に注意すること。	リファンピシンによる肝代謝酵素の誘導により、本剤の代謝が促進される。
三環系抗うつ剤 イミプラミン、 ノルトリプチリン、 アミトリプチリン マプロチリン デキストロメトラン	これらの薬剤又はその活性代謝物の血中濃度が上昇する可能性があるため、併用する場合には用量に注意すること。	本剤のCYP2D6の阻害により、これらの薬剤又はその活性代謝物の代謝が遅延すること。

**取扱い上の注意**  
 1. 保管方法  
 開封後は光を避けて保存すること。  
 2. 安定性試験  
 最終包装製品を用いた長期保存試験（室温、3年）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、テルビナフィン錠125mg「サンド」は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

**包装**  
 テルビナフィン錠125mg「サンド」 (PTP) 100錠

●詳細は電子化された添付文書（電子添文）をご参照ください。電子添文の改訂に十分留意してください。 \*\*2020年3月改訂（第13版） \*2016年9月改訂