

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「日新」

一般名： アンブロキシソール塩酸塩 (Ambroxol Hydrochloride)	販売名	アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「日新」
	形状（製剤写真等）	

1. どんな薬

- この薬は、気管支などの気道にたまった痰^{たん}を出しやすくする薬です。また、鼻の奥にたまった膿^{うみ}も出しやすくします。気管支炎や気管支喘息^{きかんしぜんそく}、慢性副鼻腔炎^{まんせいふくびくうえん}などの治療に使われます。[気道潤滑去痰剤]

2. この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ⊗ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。
 - ・ 過去にアンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「日新」に含まれる成分で過敏症^{かびんしょう}のあった人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
 - ・ 妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・ 授乳中^{じゅにゅうちゅう}の人
- 他の医療機関にかかる場合や、薬局などで他の薬を買う場合は、必ずこの薬を使用していることを医師や薬剤師に伝えてください。

3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

—

4. ほかに知られている副作用

比較的良好とみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用
お腹の上のほうが気持ち悪い感じがする	胃不快感
皮ふにできたできものや傷	発疹
疲れやすい、体が重くて動きたくない感じがする、力が入らない、吐き気、食欲がない	肝機能障害

5. 保管方法

光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。
この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：日新製薬株式会社 安全管理部

販売会社：第一三共エスファ株式会社 (<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>)

電話：お客様相談室 0120-100-601、受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日、当社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>