

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2013 に準拠して作成

気道潤滑去痰剤

アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「日新」

AMBROXOL HYDROCHLORIDE TABLETS「NISSIN」

アンブロキソール塩酸塩錠

剤形	錠剤（割線入り素錠）
製剤の規制区分	該当しない
規格・含量	1錠中アンブロキソール塩酸塩 15.0mg を含有
一般名	和名：アンブロキソール塩酸塩（JAN） 洋名：Ambroxol Hydrochloride（JAN）
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2009年7月1日 2013年2月15日（販売名変更） 薬価基準収載年月日：2009年9月25日 2013年6月21日（販売名変更） 発売年月日：2009年9月
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	製造販売元：日新製薬株式会社 販売元：第一三共エスファ株式会社 販売提携：第一三共株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 TEL：0120-100-601 医療関係者向けホームページ： https://med.daiichisankyo-ep.co.jp/index.php

本 IF は 2024 年 1 月改訂（第 1 版）の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>にてご確認ください。

IF 利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、IF と略す）の位置付け並びに IF 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において IF 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において IF 記載要領 2008 が策定された。

IF 記載要領 2008 では、IF を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること（e-IF）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-IF が提供されることとなった。

最新版の e-IF は、(独) 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページ

(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IF を掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-IF の情報を検討する組織を設置して、個々の IF が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF 記載要領の一部改訂を行い IF 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

2. IF とは

IF は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は IF の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された IF は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

[IF の様式]

- ① 規格は A4 版、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。
ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。

- ② IF 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③ 表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF 利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2 頁にまとめる。

[IF の作成]

- ① IF は原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ② IF に記載する項目及び配列は日病薬が策定した IF 記載要領に準拠する。
- ③ 添付文書の内容を補完するとの IF の主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「IF 記載要領 2013」と略す）により作成された IF は、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[IF の発行]

- ① 「IF 記載要領 2013」は、平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ② 上記以外の医薬品については、「IF 記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合には IF が改訂される。

3. IF の利用にあたって

「IF 記載要領 2013」においては、PDF ファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体の IF については、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IF の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や IF 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の MR 等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IF の利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IF が改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IF の使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IF を薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IF は日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、IF があくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013 年 4 月改訂)

目 次

I. 概要に関する項目	1	9. 製剤中の有効成分の確認試験法	7
1. 開発の経緯	1	10. 製剤中の有効成分の定量法	7
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	11. 力 価	7
II. 名称に関する項目	2	12. 混入する可能性のある夾雑物	7
1. 販売名	2	13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器 に関する情報	7
(1) 和 名	2	14. その他	7
(2) 洋 名	2	V. 治療に関する項目	8
(3) 名称の由来	2	1. 効能又は効果	8
2. 一般名	2	2. 用法及び用量	8
(1) 和 名 (命名法)	2	3. 臨床成績	8
(2) 洋 名 (命名法)	2	(1) 臨床データパッケージ	8
(3) ステム	2	(2) 臨床効果	8
3. 構造式又は示性式	2	(3) 臨床薬理試験	8
4. 分子式及び分子量	2	(4) 探索的試験	8
5. 化学名 (命名法)	2	(5) 検証的試験	8
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2	1) 無作為化並行用量反応試験	8
7. CAS登録番号	2	2) 比較試験	8
III. 有効成分に関する項目	3	3) 安全性試験	8
1. 物理化学的性質	3	4) 患者・病態別試験	8
(1) 外観・性状	3	(6) 治療的使用	8
(2) 溶解性	3	1) 使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・ 製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)	8
(3) 吸湿性	3	2) 承認条件として実施予定の内容 又は実施した試験の概要	8
(4) 融点(分解点)、沸点、凝固点	3	VI. 薬効薬理に関する項目	9
(5) 酸塩基解離定数	3	1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	9
(6) 分配係数	3	2. 薬理作用	9
(7) その他の主な示性値	3	(1) 作用部位・作用機序	9
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3	(2) 薬効を裏付ける試験成績	9
3. 有効成分の確認試験法	3	(3) 作用発現時間・持続時間	9
4. 有効成分の定量法	3	VII. 薬物動態に関する項目	10
IV. 製剤に関する項目	4	1. 血中濃度の推移・測定法	10
1. 剤 形	4	(1) 治療上有効な血中濃度	10
(1) 剤形の区別、外観及び性状	4	(2) 最高血中濃度到達時間	10
(2) 製剤の物性	4	(3) 臨床試験で確認された血中濃度	10
(3) 識別コード	4	(4) 中毒域	11
(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、 無菌の旨及び安定なpH域等	4	(5) 食事・併用薬の影響	11
2. 製剤の組成	4	(6) 母集団(ポピュレーション)解析により 判明した薬物体内動態変動要因	11
(1) 有効成分(活性成分)の含量	4	2. 薬物速度論的パラメータ	11
(2) 添加物	4	(1) 解析方法	11
(3) その他	4	(2) 吸収速度定数	11
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	4	(3) バイオアベイラビリティ	11
4. 製剤の各種条件下における安定性	4	(4) 消失速度定数	11
5. 調製法及び溶解後の安定性	5	(5) クリアランス	11
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	5		
7. 溶出性	5		
8. 生物学的試験法	7		

(6) 分布容積.....	11	16. その他.....	15
(7) 血漿蛋白結合率.....	11		
3. 吸 収.....	11	IX. 非臨床試験に関する項目	16
4. 分 布.....	11	1. 薬理試験.....	16
(1) 血液－脳関門通過性.....	11	(1) 薬効薬理試験.....	16
(2) 血液－胎盤関門通過性.....	11	(2) 副次的薬理試験.....	16
(3) 乳汁への移行性.....	11	(3) 安全性薬理試験.....	16
(4) 髄液への移行性.....	11	(4) その他の薬理試験.....	16
(5) その他の組織への移行性.....	11	2. 毒性試験.....	16
5. 代 謝.....	12	(1) 単回投与毒性試験.....	16
(1) 代謝部位及び代謝経路.....	12	(2) 反復投与毒性試験.....	16
(2) 代謝に関与する酵素（CYP450等）の分子種.....	12	(3) 生殖発生毒性試験.....	16
(3) 初回通過効果の有無及びその割合.....	12	(4) その他の特殊毒性.....	16
(4) 代謝物の活性の有無及び比率.....	12	X. 管理的事項に関する項目	17
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ.....	12	1. 規制区分.....	17
6. 排 泄.....	12	2. 有効期間又は使用期限.....	17
(1) 排泄部位及び経路.....	12	3. 貯法・保存条件.....	17
(2) 排泄率.....	12	4. 薬剤取扱い上の注意点.....	17
(3) 排泄速度.....	12	(1) 薬局での取扱い上の留意点について.....	17
7. トランスポーターに関する情報.....	12	(2) 薬剤交付時の取扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）.....	17
8. 透析等による除去率.....	12	(3) 調剤時の留意点について.....	17
VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	13	5. 承認条件等.....	17
1. 警告内容とその理由.....	13	6. 包 装.....	17
2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）.....	13	7. 容器の材質.....	17
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由.....	13	8. 同一成分・同効薬.....	17
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由.....	13	9. 国際誕生年月日.....	18
5. 慎重投与内容とその理由.....	13	10. 製造販売承認年月日及び承認番号.....	18
6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法.....	13	11. 薬価基準収載年月日.....	18
7. 相互作用.....	13	12. 効能・効果追加、用法・用量変更追加等の年月日及びその内容.....	18
(1) 併用禁忌とその理由.....	13	13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容.....	18
(2) 併用注意とその理由.....	13	14. 再審査期間.....	18
8. 副作用.....	13	15. 投薬期間制限医薬品に関する情報.....	18
(1) 副作用の概要.....	13	16. 各種コード.....	18
(2) 重大な副作用と初期症状.....	14	17. 保険給付上の注意.....	19
(3) その他の副作用.....	14	XI. 文 献	20
(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧.....	14	1. 引用文献.....	20
(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度.....	14	2. その他の参考文献.....	20
(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法.....	14	XII. 参考資料	21
9. 高齢者への投与.....	14	1. 主な外国での発売状況.....	21
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与.....	15	2. 海外における臨床支援情報.....	21
11. 小児等への投与.....	15	XIII. 備 考	22
12. 臨床検査結果に及ぼす影響.....	15	その他の関連資料.....	22
13. 過量投与.....	15		
14. 適用上の注意.....	15		
15. その他の注意.....	15		

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

アンブロキシール塩酸塩は、ドイツでブロムヘキシシン塩酸塩の代謝研究の過程において発見された去痰剤であり、本邦では 1984 年 3 月に上市されている。

日新製薬株式会社は、セルマキール錠を後発医薬品として企画・開発し、昭和 55 年 5 月 30 日付 薬発第 698 号に基づき、規格及び試験方法を設定し、加速試験、生物学的同等性試験を実施し、1992 年 6 月に承認を取得し、1994 年 7 月より製造・販売を行っている。

なお、医療事故防止対策に基づき、2009 年 7 月に販売名をセルマキール錠からセルマキール錠 15mg に変更し、2009 年 9 月に薬価収載された。

また、「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」（平成 17 年 9 月 22 日付 薬食審査発第 0922001 号）に基づき、販売名をセルマキール錠 15mg からアンブロキシール塩酸塩錠 15mg「日新」に変更し、2013 年 2 月に承認され、2013 年 6 月に薬価収載された。

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- (1) アンブロキシール塩酸塩は、荒れている肺胞から中心気道に至る気道表面を潤滑にさせ、痰と気道壁との粘着性を減少させることにより、喀出促進作用を示す。
- (2) 重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）が報告されている。

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1)和名

アンブロキソール塩酸塩錠 15mg 「日新」

(2)洋名

AMBROXOL HYDROCHLORIDE TABLETS 15mg 「NISSIN」

(3)名称の由来

通知「平成 17 年 9 月 22 日 薬食審査発第 0922001 号」に基づき設定した。

2. 一般名

(1)和名(命名法)

アンブロキソール塩酸塩 (JAN)

(2)洋名(命名法)


Ambroxol Hydrochloride (JAN)

Ambroxol (INN)

(3)ステム

不明

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式：C₁₃H₁₈Br₂N₂O · HCl

分子量：414.56

5. 化学名(命名法)

trans-4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol hydrochloride (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

別名：塩酸アンブロキソール

7. CAS 登録番号

23828-92-4 (Ambroxol Hydrochloride)

18683-91-5 (Ambroxol)

III. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色の結晶性の粉末で、においはなく、わずかに特異な味がある。

(2) 溶解性

メタノールにやや溶けやすく、水又はエタノール（99.5）にやや溶けにくく、酢酸（100）に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

融点：235℃（分解）

(5) 酸塩基解離定数¹⁾

pKa₁：-0.69（芳香族アミノ基、吸光度法）

pKa₂：8.03（第二アミノ基、滴定法）、8.17（吸光度法）

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

水溶液の pH：本品 0.10g を水 10mL に溶かした液の pH は 4.0～6.0 である。

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法

日本薬局方外医薬品規格アンブロキシソール塩酸塩の確認試験法による。

(1) 4-ジメチルアミノベンズアルデヒド試液による呈色反応

(2) 紫外可視吸光度測定法

(3) 赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）

(4) 塩化物の定性反応

(5) 臭化物の定性反応

4. 有効成分の定量法


日本薬局方外医薬品規格アンブロキシソール塩酸塩の定量法による。

電位差滴定法

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別、外観及び性状

販売名	有効成分	剤形	色	外形			識別コード
				直径 (mm)	厚さ (mm)	重さ (mg)	
アンブロキシソール 塩酸塩錠 15mg 「日新」	1錠中 アンブロキシソール塩酸塩 15.0mg 含有	素錠 (割線入)	白色				NS283
				7.0	2.4	120	

(2) 製剤の物性

該当資料なし

(3) 識別コード

NS283 (錠剤、PTP シート表面)

(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等

該当しない

2. 製剤の組成

(1) 有効成分 (活性成分) の含量

1錠中にアンブロキシソール塩酸塩 15.0mg を含有

(2) 添加物

結晶セルロース、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファー化デンプン、カルメロース
カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク

(3) その他

該当しない

3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

4. 製剤の各種条件下における安定性²⁾

アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「日新」は、最終包装製品を用いた加速試験 (40℃、相対湿度 75%、6 ヶ月) の結果、遮光保存において 3 年間安定であることが推測された。また、最終包装製品を用いた長期保存試験 (遮光保存、3 年) の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、遮光保存における 3 年間の安定性が確認された。

(1)加速試験

PTP 包装

試験項目〔規格値〕	40±1℃、75±5%RH			
	開始時	1ヵ月後	3ヵ月後	6ヵ月後
性状〔白色の片面割線入り素錠〕	適	適	適	適
確認試験	適	適	適	適
崩壊試験〔水、30分以内〕	適	適	適	適
定量(%)〔93.0～107.0%〕	101.0	99.6	99.0	98.1

(2)長期保存試験

PTP 包装

試験項目〔規格値〕	遮光保存			
	開始時	1年後	2年後	3年後
性状〔白色の片面割線入り素錠〕	適	適	適	適
確認試験	適			適
硬度試験(kgf) (参考値)	9～12	6～8	6～8	5～6
摩損度試験〔4分後：0.8%以下、10分後：1.0%以下〕	適			適
溶出試験〔水、50rpm、20分間、80%以上〕	適	適	適	適
定量(%)〔93.0～107.0%〕	98.6	97.7	98.0	98.7

(3)無包装状態での安定性試験

アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「日新」の無包装の製剤について、各種条件下で保存し、安定性試験〔性状、定量、溶出試験、硬度〕を行った。

試験条件		結果
温度	40℃、3ヵ月	変化なし
湿度	30℃、75%RH、3ヵ月	硬度：9.7kgf→5.0kgf
光	1000Lux、総照射量 60 万 Lux・hr	性状：白色→わずかに淡黄色（規格内）

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化（物理化学的变化）

該当資料なし

7. 溶出性³⁾

(1) 溶出規格

アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「日新」は、日本薬局方外医薬品規格第三部に定められた塩酸アンブロキソール錠の溶出規格に適合していることが確認された。

溶出規格					試験結果 (%)
表示量	試験液	回転数	規定時間	溶出率	
15mg	水	50rpm	20分	80%以上	85～94

(2) 後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに基づく溶出試験

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（平成9年12月22日付 医薬審第487号）」に基づき、試験を実施した。

試験方法：日局一般試験法「溶出試験法パドル法」による。

試験条件：

試験液量：900mL 温度：37±0.5℃

試験液：pH1.2 日本薬局方崩壊試験第1液

pH4.0 薄めた McIlvaine の緩衝液

pH6.8 日本薬局方崩壊試験第2液

水 日本薬局方精製水

回転数：50rpm (pH1.2、pH4.0、pH6.8、水)

判定基準：ガイドラインの判定基準のうち、次の該当する項目に従って同等性を判定した。

【pH1.2、50rpm】、【pH4.0、50rpm】、【pH6.8、50rpm】、【水、50rpm】：

標準製剤が15分以内に平均85%以上溶出する場合

試験製剤は15分以内に平均85%以上溶出する。又は、標準製剤の平均溶出率が85%付近の適当な時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。


試験結果：すべての溶出試験条件において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

溶出挙動における同等性（アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日新」及び標準製剤の平均溶出率の比較）


試験条件	溶出時間 (分)	平均溶出率 (%)			判定	判定基準 (アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日新」の溶出条件)
		アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日新」	標準製剤 (錠剤、15mg)	差 (絶対値)		
50rpm	pH1.2	15	99.6	87.2	12.4	≥85%又は±15%
	pH4.0	15	100.4	89.8	10.6	
	pH6.8	15	95.3	93.6	1.7	
	水	15	91.1	88.7	2.4	


(溶出曲線)

pH1.2/50rpm



pH4.0/50rpm





8. 生物学的試験法

該当しない

9. 製剤中の有効成分の確認試験法

- (1) 4-ジメチルアミノベンズアルデヒド試液による呈色反応
- (2) 塩化物の定性反応(2)
- (3) 臭化物の定性反応(1)
- (4) 紫外可視吸光度測定法

10. 製剤中の有効成分の定量法

紫外可視吸光度測定法

11. 力 価

該当しない

12. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報

該当資料なし

14. その他

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

○下記疾患の去痰

急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、塵肺症、手術後の喀痰喀出困難

○慢性副鼻腔炎の排膿

2. 用法及び用量

通常、成人には、1回1錠（アムプロキシソール塩酸塩として15.0mg）を1日3回経口投与する。

なお、年齢・症状により適宜増減する。

3. 臨床成績

(1)臨床データパッケージ

該当資料なし

(2)臨床効果

該当資料なし

(3)臨床薬理試験

該当資料なし

(4)探索的試験

該当資料なし

(5)検証的試験

1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

2) 比較試験

該当資料なし

3) 安全性試験

該当資料なし

4) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6)治療的使用

1) 使用成績調査・特定使用成績調査（特別調査）・製造販売後臨床試験（市販後臨床試験）

該当資料なし

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当資料なし

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

L-カルボシステイン、L-エチルシステイン塩酸塩、L-メチルシステイン塩酸塩、ブロムヘキシン塩酸塩 等

2. 薬理作用

(1)作用部位・作用機序

消化管より吸収され、気道及び肺に作用する。気道の分泌亢進と線毛運動亢進、さらに気道粘膜組織機能の修復化、肺表面活性物質（サーファクタント）の分泌促進により、気道壁を潤滑にして粘液の移動、痰の喀出を促す。

(2)薬効を裏付ける試験成績

該当資料なし

(3)作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1)治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2)最高血中濃度到達時間⁴⁾

健康成人男子 1錠投与時

2.79時間

(3)臨床試験で確認された血中濃度⁴⁾


生物学的同等性試験

アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「日新」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（アンブロキシソール塩酸塩として15mg）健康成人男子に絶食時単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、 C_{max} ）について統計解析を行った結果、両製剤の生物学的同等性が確認された。

薬物動態パラメータ

	AUC ₀₋₂₄ (ng·hr/mL)	C_{max} (ng/mL)	T_{max} (hr)	$t_{1/2}$ (hr)
アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「日新」	146.96±33.61	21.71±8.38	2.79±0.43	6.17±2.05
標準製剤（錠剤、15mg）	158.88±48.66	23.18±5.96	2.79±0.58	6.31±1.63

(Mean±S.D., n=14)



血漿中未変化体濃度推移

血漿中濃度並びに AUC、 C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4)中毒域

該当資料なし

(5)食事・併用薬の影響

該当資料なし

(6)母集団（ポピュレーション）解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1)解析方法

該当資料なし

(2)吸収速度定数

該当資料なし

(3)バイオアベイラビリティ

該当資料なし

(4)消失速度定数⁴⁾

健康成人男子単回投与（1錠）

0.12 ± 0.04 (hr⁻¹) (n=14)

(5)クリアランス

該当資料なし

(6)分布容積

該当資料なし

(7)血漿蛋白結合率

該当資料なし

3. 吸 収

吸収部位：消化管

4. 分 布

(1)血液—脳関門通過性

該当資料なし

(2)血液—胎盤関門通過性

該当資料なし

(3)乳汁への移行性

該当資料なし

<参考：動物>

「VIII.10.妊婦、産婦、授乳婦等への投与(2)」の項を参照

(4)髄液への移行性

該当資料なし

(5)その他の組織への移行性

該当資料なし

5. 代 謝

(1)代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

(2)代謝に関与する酵素（CYP450 等）の分子種

該当資料なし

(3)初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4)代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

(5)活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

6. 排 泄

(1)排泄部位及び経路

該当資料なし

(2)排泄率

該当資料なし

(3)排泄速度

該当資料なし

7. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

8. 透析等による除去率

該当資料なし

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

該当しない

2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

5. 慎重投与内容とその理由

該当しない

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

該当しない

7. 相互作用

(1)併用禁忌とその理由

該当しない

(2)併用注意とその理由

該当しない

8. 副作用

(1)副作用の概要

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(2)重大な副作用と初期症状

1. 副作用

(1)重大な副作用（頻度不明）

- 1) ショック、アナフィラキシー：ショック、アナフィラキシー（発疹、顔面浮腫、呼吸困難、血圧低下等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）：皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(3)その他の副作用

1. 副作用

(2) その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	頻 度 不 明
消 化 器	胃不快感、胃痛、腹部膨満感、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐、便秘、食思不振、消化不良（胃部膨満感、胸やけ等）
過 敏 症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、蕁麻疹様紅斑、そう痒、血管浮腫（顔面浮腫、眼瞼浮腫、口唇浮腫等）
肝 臓	肝機能障害（AST（GOT）上昇、ALT（GPT）上昇等）
そ の 他	口内しびれ感、上肢のしびれ感、めまい

注) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。

(4)項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

(5)基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

(6)薬物アレルギーに対する注意及び試験法

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

1. 副作用

(2) その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	頻 度 不 明
過 敏 症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、蕁麻疹様紅斑、そう痒、血管浮腫（顔面浮腫、眼瞼浮腫、口唇浮腫等）

注) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。

9. 高齢者への投与

2. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。〕
- (2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。〔動物実験（ラット）で母乳中へ移行することが報告されている。〕

11. 小児等への投与

該当資料なし

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当資料なし

13. 過量投与

該当資料なし

14. 適用上の注意

4. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

15. その他の注意

該当資料なし

16. その他

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1)薬効薬理試験（「VI.薬効薬理に関する項目」参照）

(2)副次的薬理試験

該当資料なし

(3)安全性薬理試験

該当資料なし

(4)その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1)単回投与毒性試験

該当資料なし

(2)反復投与毒性試験

該当資料なし

(3)生殖発生毒性試験

該当資料なし

(4)その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤：該当しない

有効成分：該当しない

2. 有効期間又は使用期限

使用期限：3年（安定性試験結果に基づく）

3. 貯法・保存条件

室温保存

4. 薬剤取扱い上の注意点

(1) 薬局での取扱い上の留意点について

外箱開封後は、遮光して保存すること。

(2) 薬剤交付時の取扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）

患者向医薬品ガイド：なし、くすりのしおり：あり

「Ⅷ.14.適用上の注意」の項を参照

(3) 調剤時の留意点について

該当資料なし

5. 承認条件等

該当しない

6. 包 装

アンブロキシロール塩酸塩錠 15mg「日新」 : (PTP) 100錠
1000錠

7. 容器の材質

PTP包装：ポリ塩化ビニル、アルミニウム

個 装 箱：紙

8. 同一成分・同効薬

同一成分：ムコソルバン錠 15mg、ムコソルバン内用液 0.75%、ムコソルバン DS3%、小児用ムコソルバン DS1.5%、小児用ムコソルバンシロップ 0.3%、ムコソルバン L カプセル 45mg（帝人ファーマ株式会社）

同 効 薬：L-カルボシステイン、L-エチルシステイン塩酸塩、L-メチルシステイン塩酸塩、ブロムヘキシシン塩酸塩 等

X. 管理的事項に関する項目

9. 国際誕生年月日

不明

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

製品名	製造販売承認年月日	承認番号
アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「日新」	2013年2月15日（販売名変更による）	22500AMX00603000

注：旧販売名承認年月日 セルマキール錠 15mg：2009年7月1日

11. 薬価基準収載年月日

アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「日新」：2013年6月21日

注：旧販売名薬価収載日 セルマキール錠 15mg：2009年9月25日（経過措置期間終了：2014年3月31日）

12. 効能・効果追加、用法・用量変更追加等の年月日及びその内容

追加年月日：1994年12月26日

追加内容：

	改訂前	改訂後
【効能・効果】	○下記疾患の去痰 急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、塵肺症、手術後の喀痰喀出困難	○下記疾患の去痰 急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、塵肺症、手術後の喀痰喀出困難 ○慢性副鼻腔炎の排膿

（ ____：追加部分）

13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

14. 再審査期間

該当しない

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報

本剤は厚生労働大臣の定める「投薬期間に上限が設けられている医薬品」に該当しない。

16. 各種コード

販売名	厚生労働省 薬価基準収載 医薬品コード	個別 医薬品コード (YJコード)	HOT（13桁）番号		レセプト電算処理 システム用コード
アンブロキシール 塩酸塩錠 15mg 「日新」	2239001F1017	2239001F1742	1038941530103 1038941530104	PTP100錠 PTP1000錠	620389404

販売名	包装	GS1 コード		
		調剤包装コード	販売包装単位コード	元梱包装コード
アンブロキシソール 塩酸塩錠 15mg 「日新」	PTP100 錠	04987447283912	14987081181732	24987081181739
	PTP1000 錠	04987447283912	14987081181749	24987081181746

17. 保険給付上の注意

本剤は保険診療上の後発医薬品である。

XI. 文 献

1. 引用文献

- 1) (財)日本公定書協会編、医療用医薬品 品質情報集 2001;No.10:144
- 2) 社内資料 (安定性)
- 3) 社内資料 (溶出性)
- 4) 社内資料 (生物学的同等性)

2. その他の参考文献

該当資料なし

XII. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

該当資料なし

2. 海外における臨床支援情報

該当資料なし

XIII. 備 考

その他の関連資料

該当資料なし

〔文献請求先・製品情報お問い合わせ先〕
第一三共エスファ株式会社 お客様相談室
〒103-8426 東京都中央区日本橋本町 3-5-1
TEL:0120-100-601