

持続性ARB／利尿薬配合剤

処方箋医薬品※ ※注意—医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 872149

薬価基準収載

日本薬局方 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠

# ロサルヒド<sup>®</sup>配合錠LD「EP」

# ロサルヒド<sup>®</sup>配合錠HD「EP」

LOSARHYD<sup>®</sup> COMBINATION TABLETS「EP」

先発医薬品名: プレミネント<sup>®</sup>配合錠LD/配合錠HD[オルガノン]

## 医療事故防止への取り組み

表示を「より見やすく」「より判りやすく」工夫しました。

### 1 PTPシートの工夫

#### 識別用オリジナルシンボル

“血圧を下げる矢印(Low)のイメージ”をオリジナルシンボルとし、2錠毎PTPシート両面に表示いたしました。

#### 1錠毎のGS1 データバー

薬剤取り違い防止の負担を軽減する目的でPTPシートの裏面にGS1データバーを表示しています。(PTPシートの印刷色は先発製品の配色を踏襲)


#### ピッチコントロール(定位置印刷)

ピッチコントロールを行うことにより、「製品名」[EP]の表示を識別しやすくしています。

### 2 錠剤の工夫

#### 両面レーザー印刷

「製品名」[EP]を両面レーザー印刷し、判別しやすくしています。



配合錠LD (PTP: 10錠シート) L: 83mm × W: 31mm

配合錠HD (PTP: 10錠シート) L: 98mm × W: 49mm



配合錠LD

配合錠HD

●錠剤は実物大、PTPシートは90%縮小です。

最新の電子化された添付文書(電子添文)は専用アプリ「添文ナビ」よりGS1データバーを読み取りの上、ご参照ください。  
 (01) 14987081183422

## 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 チアジド系薬剤又はその類似化合物(例えばクロルタリドン等のスルホンアミド誘導体)に対する過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参照]
- 2.4 重篤な肝機能障害のある患者[9.3.1 参照]
- 2.5 無尿の患者又は透析患者[9.2.1 参照]
- 2.6 急性腎障害の患者[9.2.2 参照]
- 2.7 体液中のナトリウム・カリウムが明らかに減少している患者[低ナトリウム血症、低カリウム血症等の電解質失調を悪化させるおそれがある。][9.1.2、11.1.7、11.1.15 参照]
- 2.8 アリスキレンを投与中の糖尿病患者(ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く)[10.1 参照]
- 2.9 デスモプレシン酢酸塩水和物(男性における夜間多尿による夜間頻尿)を投与中の患者[10.1 参照]

[お問い合わせ先]

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 ☎ **0120-100-601** 受付時間: 平日9:00~17:30(土・日・祝日・弊社休日を除く)

[夜間・休日 緊急時のお問い合わせ先]

日本中毒情報センター第一三共エスファ受付 ☎ **0120-856-838** 受付時間: 平日17:30~翌9:00及び土・日・祝日・弊社休日

# ロサルヒド®<sup>®</sup>配合錠LD「EP」/配合錠HD「EP」 Drug Information

(一般名/ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド)

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 規制区分 | 処方箋医薬品* ※注意—医師等の処方箋により使用すること |
| 貯法   | 室温保存                         |
| 有効期間 | 3年                           |

|       |               |         |         |
|-------|---------------|---------|---------|
|       | 承認番号          | 薬価収載    | 販売開始    |
| 配合錠LD | 22600AMX00390 | 2014年6月 | 2014年6月 |
| 配合錠HD | 22800AMX00227 | 2016年6月 | 2016年6月 |

## 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 チアジド系薬剤又はその類似化合物(例えばクロルタリドン等のスルフォンアミド誘導体)に対する過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 [9.5 参照]
- 2.4 重篤な肝機能障害のある患者 [9.3.1 参照]
- 2.5 無尿の患者又は透析患者 [9.2.1 参照]
- 2.6 急性腎障害の患者 [9.2.2 参照]






- 2.7 体液中のナトリウム・カリウムが明らかに減少している患者 [低ナトリウム血症、低カリウム血症等の電解質失調を悪化させるおそれがある。] [9.1.2、11.1.7、11.1.15 参照]
- 2.8 アリスキレンを投与中の糖尿病患者(ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く) [10.1 参照]
- 2.9 デスマプレシン酢酸塩水和物(男性における夜間多尿による夜間頻尿)を投与中の患者 [10.1 参照]

## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

| 販売名            | 有効成分  | 添加剤  |
|----------------|---|--|
| ロサルヒド配合錠LD「EP」 | 1錠中<br>ロサルタンカリウム(日局)<br>50mg<br>ヒドロクロロチアジド(日局)<br>12.5mg  | 結晶セルロース、D-マンニトール、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、カルナウバロウ |
| ロサルヒド配合錠HD「EP」 | 1錠中<br>ロサルタンカリウム(日局)<br>100mg<br>ヒドロクロロチアジド(日局)<br>12.5mg |  |

### 3.2 製剤の性状

| 販売名            | 剤形          | 色  | 外形  |   |   |
|----------------|-------------|----|---|---|---|
|                |             |    | 大きさ(mm)   | 厚さ(mm)  | 重さ(mg)  |
| ロサルヒド配合錠LD「EP」 | フィルムコーティング錠 | 白色 |  |  |  |
|                |             |    | 8.6(直径)   | 3.9   | 226   |
| ロサルヒド配合錠HD「EP」 | フィルムコーティング錠 | 白色 |  |  |  |
|                |             |    | 13.1(長径)<br>7.6(短径)   | 4.7   | 371   |

## 4. 効能又は効果

高血圧症

## 5. 効能又は効果に関連する注意

過度な血圧低下のおそれ等があり、本剤を高血圧治療の第一選択薬としないこと。

## 6. 用法及び用量

成人には1日1回1錠(ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジドとして50mg/12.5mg又は100mg/12.5mg)を経口投与する。  
本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。

## 7. 用法及び用量に関連する注意

原則として、ロサルタンカリウム50mgで効果不十分な場合にロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジドとして50mg/12.5mgの投与を、ロサルタンカリウム100mg又はロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジドとして50mg/12.5mgで効果不十分な場合にロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジドとして100mg/12.5mgの投与を検討すること。[8.1 参照]

## 8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤はロサルタンカリウム50mgあるいは100mgとヒドロクロロチアジド12.5mgの配合剤であり、ロサルタンカリウムとヒドロクロロチアジド双方の副作用が発現するおそれがあり、適切に本剤の使用を検討すること。[7. 参照]
- 8.2 一過性の血圧低下(ショック症状、意識消失、呼吸困難等を伴う)を起こすおそれがあるので、本剤投与中は定期的(投与開始時:2週間ごと、安定後:月1回程度)に血圧のモニタリングを実施すること。
- 8.3 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは低カリウム血症を起こすことが知られている。ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジドとして

50mg/12.5mgが投与された国内臨床試験において、血清カリウム値は低下傾向を示し、また低カリウム血症の発現頻度は高カリウム血症よりも高かった。したがって、低カリウム血症の発現がより懸念されるので、血清カリウム値のモニタリングを定期的の実施し、観察を十分に行うこと。[9.1.2、11.1.7 参照]

- 8.4 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは高尿酸血症を発現させるおそれがあるので、本剤投与中は定期的に血清尿酸値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。[9.1.8 参照]
- 8.5 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは血糖値上昇若しくは糖尿病顕性化のおそれがあるので、観察を十分に行うこと。[9.1.8 参照]
- 8.6 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは重篤な血液障害を発現させるおそれがあるので、定期的に検査を実施するなど観察を十分に行うこと。[11.1.10 参照]
- 8.7 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- 8.8 手術前24時間は投与しないことが望ましい。アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中の患者は、麻酔及び手術中にレニン・アンジオテンシン系の抑制作用による高度な血圧低下を起こすおそれがある。
- 8.9 本剤の成分を含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中にまれに肝炎等の重篤な肝障害があらわれたとの報告がある。肝機能検査を実施するなど、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 8.10 本剤の投与により利尿効果が急激にあらわれることがあるので、電解質失調、脱水に十分注意すること。
- 8.11 夜間の休息が特に必要な患者には、夜間の排尿を避けるため、午前中に投与することが望ましい。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
  - 9.1.1 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者  
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがある。
  - 9.1.2 血清カリウム値異常の患者  
低カリウム血症又は高カリウム血症を起こすおそれがある。[2.7、8.3、9.1.3、11.1.7 参照]
  - 9.1.3 高カリウム血症の患者  
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。本剤の成分であるロサルタンカリウムは、高カリウム血症を増悪させるおそれがある。  
また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現するおそれがあるので、血清カリウム値のモニタリングを定期的の実施し、観察を十分に行うこと。[9.1.2、11.1.7 参照]
  - 9.1.4 脳血管障害のある患者  
過度の降圧が脳血流不全を惹起し、病態を悪化させるおそれがある。
  - 9.1.5 体液量が減少している患者(水分摂取の不十分な患者、過度の発汗をしている患者)  
一過性の血圧低下を起こすおそれがある。[11.1.5 参照]
  - 9.1.6 減塩療法中の患者  
低ナトリウム血症を起こすおそれがある。特に、厳重な減塩療法中の患者では、一過性の血圧低下を起こすおそれがある。[11.1.5、11.1.15 参照]
  - 9.1.7 重篤な冠動脈硬化症又は脳動脈硬化症のある患者  
急激な利尿があらわれた場合、急速な血漿量減少、血液濃縮を来し、血栓塞栓症を誘発するおそれがある。
  - 9.1.8 本人又は両親、兄弟に痛風、糖尿病のある患者、及び高尿酸血症のある患者  
高尿酸血症、高血糖症を来し、痛風、糖尿病の悪化や顕性化のおそれがある。[8.4、8.5 参照]
  - 9.1.9 下痢、嘔吐のある患者  
電解質失調があらわれるおそれがある。
  - 9.1.10 高カルシウム血症、副甲状腺機能亢進症のある患者  
血清カルシウムを上昇させるおそれがある。
  - 9.1.11 交感神経切除後の患者  
本剤の降圧作用が増強されるおそれがある。

## 9.2 腎機能障害患者

### 9.2.1 無尿の患者又は透析患者

投与しないこと。[2.5 参照]

### 9.2.2 急性腎障害の患者

投与しないこと。腎機能を更に悪化させるおそれがある。[2.6 参照]

### 9.2.3 腎機能障害患者(血清クレアチニン値 2.0mg/dL超)

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。ヒドロクロロチアジドにより腎血流量が低下し、ロサルタンカリウムにより腎機能障害が悪化するおそれがある。

### 9.2.4 腎機能低下患者(血清クレアチニン値 1.5~2.0mg/dL)

本剤投与中は定期的に血清クレアチニン値及び血清尿酸値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。血清クレアチニン値上昇及び血清尿酸値上昇のおそれがある。

## 9.3 肝機能障害患者

### 9.3.1 重篤な肝機能障害のある患者

投与しないこと。[2.4, 9.3.2 参照]

### 9.3.2 肝機能障害又はその既往のある患者(ただし、重篤な肝機能障害のある患者を除く)

外国において、軽・中等度のアルコール性肝硬変患者にロサルタンカリウム50mgを単回経口投与すると、健康成人と比較してロサルタンの消失速度が遅延し、ロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度がそれぞれ約5倍及び約2倍に上昇することが報告されている。また、ヒドロクロロチアジドは肝性昏睡を誘発するおそれがある。[9.3.1 参照]

## 9.4 生殖能を有する者

### 9.4.1 妊娠する可能性のある女性

妊娠していることが把握されずアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンII受容体拮抗剤を使用し、胎児・新生児への影響(腎不全、頭蓋・肺・腎の形成不全、死亡等)が認められた例が報告されている。本剤の投与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して本剤投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。また、投与が必要な場合には次の注意事項に留意すること。[9.5 参照]

- (1) 本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。本剤投与中も、妊娠していないことを定期的に確認すること。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。
- (2) 次の事項について、本剤投与開始時に患者に説明すること。また、投与中にも必要に応じ説明すること。
  - ・妊娠中に本剤を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。
  - ・妊娠が判明した又は疑われる場合は、速やかに担当医に相談すること。
  - ・妊娠を計画する場合は、担当医に相談すること。

### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。妊娠中期及び末期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンII受容体拮抗剤を投与された患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、多臓器不全、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、頭蓋顔面の奇形、肺の低形成等があらわれたとの報告がある。なお、チアジド系薬剤では新生児又は乳児に高ビリルビン血症、血小板減少症等を起こすことがある。また、利尿効果に基づく血漿量減少、血液濃縮、子宮・胎盤血流量減少があらわれることがある。[2.3, 9.4.1 参照]

### 9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。ラットの周期期及び授乳期にロサルタンカリウム1mg/kg/day/ヒドロクロロチアジド0.25mg/kg/day~ロサルタンカリウム50mg/kg/day/ヒドロクロロチアジド12.5mg/kg/dayを投与した試験において、ロサルタンカリウム50mg/kg/day/ヒドロクロロチアジド12.5mg/kg/day群で産児体重の減少及び腎の病理組織学的変化がみられた。また、ロサルタン、カルボン酸体及びヒドロクロロチアジドの乳汁移行性も確認された。本試験の産児に対する無毒性量はロサルタンカリウム10mg/kg/day/ヒドロクロロチアジド2.5mg/kg/dayであった。ヒドロクロロチアジドは、ヒト母乳中への移行が報告されている。

### 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。乳児は電解質バランスがくずれやすい。

## 9.8 高齢者

### 9.8.1 一般に生理機能が低下している。

### 9.8.2 一般に過度の降圧は好ましくないとされている。脳梗塞等が起こるおそれがある。

### 9.8.3 高齢者でのロサルタンカリウム単独投与における薬物動態試験で、ロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度が非高齢者に比べて高かった(非高齢者に比較してロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度がそれぞれ約2倍及び約1.3倍に上昇)

### 9.8.4 急激な利尿は血漿量の減少を来し、脱水、低血圧等による立ちくらみ、めまい、失神等を起こすことがある。

### 9.8.5 特に心疾患等で浮腫のある高齢者では急激な利尿は急激な血漿量の減少と血液濃縮を来し、脳梗塞等の血栓塞栓症を誘発するおそれがある。

### 9.8.6 低ナトリウム血症、低カリウム血症があらわれやすい。

## 10. 相互作用

本剤の成分であるロサルタンカリウムは、薬物代謝酵素チトクロームP450 2C9(CYP2C9)及び3A4(CYP3A4)により活性代謝物であるカルボン酸体に代謝される。なお、本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは、ほとんど代謝されることなく尿中に排泄される。[16.4 参照]

## 10.1 併用禁忌(併用しないこと)

| 薬剤名等   | 臨床症状・措置方法                                 | 機序・危険因子                        |
|--|---|--------------------------------|
| アリスキレン<br>ラジレス<br>(糖尿病患者に使用する場合。ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く。)<br>[2.8 参照] | 非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。 | レニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。 |
| デスマレジン酢酸塩水和物<br>ミニリンメルト<br>(男性における夜間多尿による夜間頻尿)<br>[2.9 参照]                           | 低ナトリウム血症が発現するおそれがある。                      | いずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。       |

## 10.2 併用注意(併用に注意すること)

| 薬剤名等   | 臨床症状・措置方法   | 機序・危険因子   |
|--|---|---|
| カリウム保持性利尿剤:<br>スピロノラクトン<br>トリウムテレン等<br>カリウム補給剤:<br>塩化カリウム<br>トリメトプリム含有製剤:<br>スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 血清カリウム値が上昇するおそれがある。   | 本剤の成分であるロサルタンカリウムとの併用によりカリウム貯留作用が増強するおそれがある。腎機能障害のある患者には特に注意すること。                               |
| 利尿降圧剤:<br>フロセミド<br>トリクロルメチアジド等<br>[11.1.5 参照]  | 一過性の血圧低下を起こすおそれがある。   | 利尿降圧剤で治療を受けている患者にはレニン活性が亢進している患者が多く、本剤が奏効しやすい。  |
| アリスキレン   | 腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある。eGFRが60mL/min/1.73m <sup>2</sup> 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンとの併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。 | レニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。  |
| アンジオテンシン変換酵素阻害剤  | 腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある。   |   |
| バルビツール酸誘導体   | 起立性低血圧が増強されることがある。  | これらの薬剤の中枢抑制作用と本剤の成分であるヒドロクロロチアジドの降圧作用による。   |
| あへんアルカロイド系麻薬   |   | 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドとあへんアルカロイドの大量投与で血圧下降があらわれることが報告されている。   |
| アルコール  |   | 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドと血管拡張作用を有するアルコールとの併用により降圧作用が増強される可能性がある。                                      |
| 昇圧アミン:<br>ノルアドレナリン<br>アドレナリン   | 昇圧アミンの作用を減弱することがある。手術前の患者に使用する場合、本剤の一時休薬等の処置を講ずること。   | 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは昇圧アミンに対する血管壁の反応性を低下させることが報告されている。  |
| ツボクラリン及びその類似作用物質:<br>ツボクラリン塩化物塩酸塩水和物   | ツボクラリン及びその類似作用物質の麻痺作用を増強することがある。手術前の患者に使用する場合、本剤の一時休薬等の処置を講ずること。  | 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドによる血清カリウム値の低下により、これらの薬剤の神経・筋遮断作用を増強すると考えられている。                                |
| 降圧作用を有する他の薬剤:<br>β-遮断剤<br>ニトログリセリン等  | 降圧作用を増強するおそれがある。降圧剤の用量調節等に注意すること。   | 作用機序の異なる降圧作用により互いに協力的に作用する。   |
| ジギタリス剤:<br>ジゴキシン   | ジギタリスの心臓に対する作用を増強し、不整脈等を起こすことがある。血清カリウム値に十分注意すること。  | 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドによる血清カリウム値の低下により多量のジギタリスが心筋Na-K ATPaseに結合し、心収縮力増強と不整脈が起こる。マグネシウム低下も同様の作用を示す。  |
| 乳酸ナトリウム  | チアジド系薬剤による代謝性アルカローシス、低カリウム血症を増強することがある。   | 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドのカリウム排泄作用により低カリウム血症や代謝性アルカローシスが引き起こされることがある。アルカリ化剤である乳酸ナトリウムの併用はこの状態を更に増強させる。 |

| 薬剤名等  | 臨床症状・措置方法                                      | 機序・危険因子  |
|---|--|--|
| リチウム:<br>炭酸リチウム                             | リチウム中毒が報告されている。血中リチウム濃度に注意すること。                | 本剤の成分であるロサルタンカリウムのナトリウム排泄作用により、リチウムの蓄積が起こればと考えられている。   |
|   | 振戦、消化器愁訴等、リチウム中毒を増強することがある。血中リチウム濃度に注意すること。    | 本剤の成分であるヒドロクロロチアジドは腎におけるリチウムの再吸収を促進し、リチウムの血中濃度を上昇させる。  |
| 副腎皮質ホルモン剤ACTH                               | 低カリウム血症が発現することがある。                             | 本剤の成分であるヒドロクロロチアジド及び副腎皮質ホルモン剤、ACTHともカリウム排泄作用を持つ。   |
| グリチルリチン製剤                                   | 血清カリウム値の低下があらわれやすくなる。                          | グリチルリチン製剤は低カリウム血症を主徴とした偽アルドステロン症を引き起こすことがある。したがって本剤の成分であるヒドロクロロチアジドとグリチルリチン製剤の併用により低カリウム血症を増強する可能性がある。 |
| 糖尿病用剤:<br>SU剤<br>インスリン<br>速効型インスリン<br>分泌促進薬 | 糖尿病用剤の作用を著しく減弱することがある。                         | 機序は明確ではないが、本剤の成分であるヒドロクロロチアジドによるカリウム喪失により膵臓のβ細胞のインスリン放出が低下すると考えられている。                                  |
| コレステラミン                                     | チアジド系薬剤の作用が減弱することがある。                          | コレステラミンの吸着作用により本剤の成分であるヒドロクロロチアジドの吸収が阻害されることがある。   |
| 非ステロイド性消炎鎮痛剤:<br>インドメタシン等                   | 降圧作用が減弱されるおそれがある。                              | プロスタグランジンの合成阻害作用により、本剤の降圧作用を減弱させる可能性がある。   |
|   | 腎機能が悪化している患者では、さらに腎機能が悪化するおそれがある。              | プロスタグランジンの合成阻害作用により、腎血流量が低下するためと考えられる。   |
|   | チアジド系薬剤の作用が減弱することがある。                          | 非ステロイド性消炎鎮痛剤のプロスタグランジン合成酵素阻害作用により、腎内プロスタグランジンが減少し、水・ナトリウムの体内貯留が生じて本剤の成分であるヒドロクロロチアジドの作用と拮抗する。          |
| グレープフルーツジュース                                | 降圧作用が減弱されるおそれがある。本剤の投与中はグレープフルーツジュースの摂取は避けること。 | グレープフルーツジュースに含まれる成分のCYP3A4阻害作用により本剤の有効成分であるロサルタンカリウムの活性代謝物の血中濃度が低下するため、本剤の降圧作用が減弱されるおそれがある。            |

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 アナフィラキシー(頻度不明)  
不快感、口内異常感、発汗、蕁麻疹、呼吸困難、全身潮紅、浮腫等があらわれることがある。

11.1.2 血管浮腫(頻度不明)  
顔面、口唇、咽頭、舌等の腫脹があらわれることがある。

11.1.3 急性肝炎又は劇症肝炎(いずれも頻度不明)

11.1.4 急性腎障害(頻度不明)

11.1.5 ショック、失神、意識消失(いずれも頻度不明)  
冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。[9.1.5、9.1.6、10.2 参照]

11.1.6 横紋筋融解症(頻度不明)  
筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。

11.1.7 低カリウム血症、高カリウム血症(いずれも頻度不明)  
血清カリウム値の異常変動に伴い、倦怠感、脱力感、不整脈等があらわれることがある。[2.7、8.3、9.1.2、9.1.3 参照]

11.1.8 不整脈(頻度不明)  
心室性期外収縮、心房細動等の不整脈があらわれることがある。

11.1.9 汎血球減少、白血球減少、血小板減少(いずれも頻度不明)

11.1.10 再生不良性貧血、溶血性貧血(いずれも頻度不明)  
[8.6 参照]

11.1.11 壊死性血管炎(頻度不明)

11.1.12 間質性肺炎、肺水腫、急性呼吸窮迫症候群(いずれも頻度不明)  
間質性肺炎、肺水腫があらわれることがある。また、ヒドロクロロチアジド服用後、数分から数時間以内に急性呼吸窮迫症候群が発現したとの報告がある。

11.1.13 全身性エリテマトーデスの悪化(頻度不明)

11.1.14 低血糖(頻度不明)  
脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。糖尿病治療中の患者であらわれやすい。

11.1.15 低ナトリウム血症(頻度不明)  
倦怠感、食欲不振、嘔吐、痙攣、意識障害等を伴う低ナトリウム血症があらわれることがある。[2.7、9.1.6 参照]

11.1.16 急性近視、閉塞隅角緑内障(いずれも頻度不明)  
急性近視(霧視、視力低下等を含む)、閉塞隅角緑内障があらわれることがあるので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には投与を中止し、速やかに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。

11.2 その他の副作用

|       | 0.1~5%未満 <sup>注)</sup>  | 頻度不明  |
|-------|---|---|
| 精神神経系 | めまい、浮遊感、眠気、頭痛   | 耳鳴、不眠、知覚異常  |
| 循環器系  | 低血圧、起立性低血圧、動悸   | 調律障害(頻脈等)、胸痛  |
| 消化器   | 嘔吐・嘔気   | 口内炎、下痢、口角炎、胃不快感、胃潰瘍、腹部仙痛、肺炎、唾液腺炎、便秘、食欲不振、腹部不快感、口渇   |
| 肝臓    | 黄疸、肝機能障害(AST上昇、ALT上昇、LDH上昇等)  |   |
| 腎臓    | BUN上昇、クレアチニン上昇  |   |
| 皮膚    | 発疹、蕁麻疹  | 多形紅斑、光線過敏、紅皮症、紅斑、そう痒、顔面潮紅、皮膚エリテマトーデス  |
| 血液    | 貧血、赤血球数増加、赤血球数減少、ヘマトクリット低下、ヘマトクリット上昇、ヘモグロビン増加、白血球数増加、リンパ球数増加                | 好酸球数増加、好中球百分率増加、リンパ球数減少   |
| その他   | 倦怠感、CK上昇、高尿酸血症、高血糖症、頸部異和感、多汗、頻尿、CRP増加、尿中ブドウ糖陽性、尿中赤血球陽性、尿中白血球陽性、尿中蛋白陽性、BNP増加 | 発熱、味覚障害、しびれ感、眼症状(かすみ、異和感等)、黄視症、ほてり、浮腫、筋肉痛、咳嗽、低マグネシウム血症、低クロール性アルカローシス、血清カルシウム増加、インポテンシ、高カルシウム血症を伴う副甲状腺障害、筋痙攣、関節痛、鼻閉、紫斑、呼吸困難、血清脂質増加、女性化乳房 |

注)ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジドとして100mg/12.5mg、50mg/12.5mg、50mg/6.25mg、25mg/6.25mgを投与した臨床試験を含む。

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

甲状腺障害のない患者の血清PBIを低下させることがある。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意  
PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報  
海外で実施された疫学研究において、ヒドロクロロチアジドを投与された患者で、基底細胞癌及び有棘細胞癌のリスクが増加することが報告されている。

22. 包装

〈ロサルヒド配合錠LD[EP]〉  
(PTP) 100錠(10錠×10) 500錠(10錠×50)

〈ロサルヒド配合錠HD[EP]〉  
(PTP) 100錠(10錠×10)

●詳細は電子化された添付文書(電子添文)をご参照ください。電子添文の改訂に十分留意してください。

2023年9月改訂(第1版)