

イマチニブ錠 100mg「DSEP」の 溶出性に関する資料

第一三共エスファ株式会社

【概要】

イマチニブ錠 100mg「DSEP」（イマチニブメシル酸塩製剤）について「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」^{※1)}の溶出試験の項に従って試験を行った結果、イマチニブ錠 100mg「DSEP」は規定されたすべての溶出試験条件^{※2)}において判定基準に適合し、イマチニブ錠 100mg「DSEP」とグリベック錠 100mg の溶出挙動は類似していることが検証された。

※1)：後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発 0229 第 10 号)

※2)：pH1.2（日本薬局方溶出試験第 1 液）/50rpm

pH5.0（薄めた McIlvaine の緩衝液）/50rpm

pH6.8（日本薬局方溶出試験第 2 液）/50rpm 及び水/50rpm

1. 後発医薬品の生物学的同等性ガイドラインに基づく溶出試験

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について(平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発 0229 第 10 号)」に基づき、試験を実施した。

試験方法：日局一般試験法「溶出試験法パドル法」による。

試験条件：

試験液量：900mL 温度：37±0.5℃

試験液：pH1.2 日本薬局方溶出試験第 1 液

pH5.0 薄めた McIlvaine の緩衝液

pH6.8 日本薬局方溶出試験第 2 液

水 日本薬局方精製水

回転数：50rpm (pH1.2、pH5.0、pH6.8、水)

試験時間：

pH1.2 では 2 時間、その他の試験液では 6 時間とする。ただし、標準製剤の平均溶出率が 85%を越えた時点で終了とすることができる。

判定基準：

ガイドラインの判定基準のうち、次の該当する項目に従って類似性を判定した。

【pH1.2、50rpm】、【pH5.0、50rpm】、【pH6.8、50rpm】、【水、50rpm】

標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合

試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。


試験結果：すべての溶出試験条件において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

溶出挙動における類似性（イマチニブ錠 100mg「DSEP」及びグリベック錠 100mg の平均溶出率の比較）


試験条件		溶出時間 (分)	平均溶出率 (%)			判定	判定基準 (イマチニブ錠 100mg「DSEP」の溶出条件)
			イマチニブ錠 100mg「DSEP」	グリベック錠 100mg	差 (絶対値)		
50rpm	pH1.2	15	92.8	97.3	4.5	適	≥85%又は±15%
	pH5.0	15	91.1	96.5	5.4	適	
	pH6.8	15	90.0	93.0	3.0	適	
	水	15	92.9	95.3	2.4	適	

(溶出曲線)


pH1.2/50rpm



pH5.0/50rpm



pH6.8/50rpm



水 /50rpm

