

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。

薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

カンデサルタン錠 2mg 「DSEP」、カンデサルタン錠 4mg 「DSEP」、
カンデサルタン錠 8mg 「DSEP」、カンデサルタン錠 12mg 「DSEP」

一般名： カンデサルタン シレキセチル (Candesartan Cilexetil)	販売名	カンデサルタン錠 2mg 「DSEP」	カンデサルタン錠 4mg 「DSEP」	カンデサルタン錠 8mg 「DSEP」
	形状（製剤 写真等）			

※カンデサルタン錠 12mg 「DSEP」の写真は省略しています

1.どんな薬

- この薬は、血管を収縮する作用のあるアンジオテンシンⅡと呼ばれる物質の働きを ^{おさ}抑えることで、血圧を下げたり、心不全 ^{しょうじょう} 症状 を改善したりします。

2.この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ⊗ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。
 - ・過去にカンデサルタン錠「DSEP」に ^{ふく}含まれる成分で ^{かびんしょう}過敏症 のあった人
 - ・妊婦 または 妊娠 している可能性のある人
 - ・アリスキレンフマル酸塩を使用中の ^{とうりょうびょう}糖尿病 の人（ただし、他の血圧を下げる治 ^{りょう}療 を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の人を除く）
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
 - 〈高血圧 ^{しょう}症、慢性心不全 ^{まんせいしんふぜん} に共通〉
 - ・腎臓 ^{じんぞう} の動脈に ^{きょうさく}狭窄 のある人
 - ・高カリウム血 ^{けっしょう}症 の人
 - ・嚴重な減塩 ^{りょう}療 法中の人
 - ・低ナトリウム血 ^{けっしょう}症 の人
 - ・過去に薬の使用で ^{かびんしょう}過敏症 のあった人
 - ・腎臓 ^{じんぞう} に障害のある人
 - ・血液 ^{とうせき} 透析 中の人
 - ・肝臓 ^{かんぞう} に障害のある人
 - ・授乳中の人
 - 〈高血圧 ^{しょう}症 に使用する場合〉
 - ・心不全の人
 - 〈慢性心不全 ^{まんせいしんふぜん} に使用する場合〉
 - ・大動脈 ^{だいたうみゃく} 弁 ^{べん} 狭窄症 ^{きょうさくしやう} 又は 閉塞性肥大型 ^{へいそくせい ひ だいがたしんきんしやう} 心筋症 のある人
 - ・低血圧の人
 - ・比較 ^{かく} 的 ^{てき} 重い ^{おもい} 慢性心不全 ^{まんせいしんふぜん} の人
- この薬には一緒に使用してはいけない薬や、一緒に使用する場合に注意が必要な薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

- この薬の使用により、以下のような症状があらわれることがあります。これらの症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

〈高血圧^{しやう} 症、慢^{まん}性^{せい}心^{しん}不全^{ふぜん}に共通〉

主な症状	考えられる副作用など
体がふわふわと浮いているような感じがする、頭がグルグルと回っている感じがする	めまい、ふらつき
尿 ^{によう} の量が減る、むくみ、体が重くて動きたくない感じがする	腎 ^{じん} 機能の低下
体のしびれ、体に力が入らない、吐 ^は き ^け 気 ^は 、吐 ^げ く、下痢 ^{げり} 、お腹がパンパンになる感じがする	高カリウム血 ^{けっしやう} 症
力が 抜 ^ぬ けてだるく感じる、めまい、ふらつき、立ったときにめまいやふらつきを感じる、気を失う	急激な血圧低下

〈慢^{まん}性^{せい}心^{しん}不全^{ふぜん}に使用する場合〉

主な症状	考えられる副作用など
体が重くて動きたくない感じがする、めまい、頭が痛い、耳の中で「キーン」という高い音や「ザー」という低い音が聞こえる、ドキドキする、息がハアハアして苦しくなる	貧血

- 高所作業、自動車運転等：血圧が下がることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転など危険を 伴^{ともな}う機械の操作には注意してください。
- 手術前 24 時間はこの薬を使用しないことが望ましいので、手術を受ける場合、必ずこの薬を飲んでい^ることを医師に伝え、医師の指示に従ってください。
- この薬を使用中に 妊^{にん}娠^{しん}が判明した場合や 妊^{にん}娠^{しん}が疑われる場合は、速やかに医師に相談してください。
- 妊^{にん}娠^{しん}する可能性がある人は、医師や薬 剤^{ざい}師に、この薬が 妊^{にん}婦^ぶや 胎^{たい}児^じ・新生児に 影^{えい}響^{きやう}を及ぼす可能性があることについて説明を受け、十分に理解してください。特に、妊^{にん}娠^{しん}の希望や予定のある人は、医師に相談してください。
- この薬の使用前および使用中も定期的に医師や薬 剤^{ざい}師が 妊^{にん}娠^{しん}していないことを確認します。

4. ほかに知られている副作用

「3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと」に記載されている副作用のほか、比較的好くみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

〈高血圧^{しやう} 症に使用する場合〉

主な症状	考えられる副作用
皮ふにできたできものや傷	発 ^{はっ} 疹 ^{しん}
ドキドキする	動 ^{どう} 悸 ^き
頭が痛い	頭痛

〈慢^{まん}性^{せい}心^{しん}不全^{ふぜん}に使用する場合〉

主な症状	考えられる副作用
体が重くて動きたくない感じがする	倦 ^{けん} 怠 ^{たい} 感 ^{かん}
頭が痛い	頭痛
吐 ^は き ^き 気、胃のあたりで焼け付くような感じがする、胃がムカムカして気持ち悪い	悪心

5. 保管方法

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：第一三共エスファ株式会社（<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>）

電話：お客様相談室 0120-100-601、受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日、当社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>