

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。

薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

オキサリプラチン点滴静注液 50mg「DSEP」、オキサリプラチン点滴静注液 100mg「DSEP」、オキサリプラチン点滴静注液 200mg「DSEP」

一般名 : オキサリプラチン
(Oxaliplatin)

1.どんな薬

- この薬は、がん細胞の遺伝子（DNA）合成を阻害して、がん細胞の増殖を抑えます。

2.この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ⊗ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。
 - ・機能障害があって重い感覚異常または知覚不全のある人
 - ・過去にオキサリプラチン点滴静注液「DSEP」に含まれる成分または他の白金を含む薬剤で過敏症のあった人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
 - ・こつずいきのうよくせい 骨髄機能抑制のある人
 - ・感覚異常または知覚不全のある人
 - ・心臓に障害のある人
 - ・感染症にかかっている人
 - ・すいとう 水痘にかかっている人
 - ・腎臓に重い障害のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には一緒に使用する場合に注意が必要な薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

3.この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

- この薬の使用により、以下のような症状があらわれることがあります。これらの症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用など
冷汗が出る、めまい、顔色が青白くなる、手足が冷たくなる、意識がなくなる	ショック
体じゅうがかゆい、皮ふにブツブツができる、のどがかゆい、ふらつき、ドキドキする、息がしにくいと感じる	アナフィラキシー
手足のしびれ、手足の痛み、手足の感覚がなくなる、手足の力が入らない、物がつかみづらい、歩くときにつまずいてしまう、食べ物やつばが飲み込みにくい、のどのあたりが何か変な感じがする、のどに何かが詰まっているような感じがする	<small>まつしょうしんけいしょうじょう いんとうこうとう</small> 末梢神経症状、咽頭喉頭 <small>かんかくいじょう</small> 感覚異常
熱が出る、体がゾクゾクして寒く感じる、のどの痛み、鼻血、歯ぐきからの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい、頭が重い感じがする、ドキドキする、息がハァハァして苦しくなる	<small>こつずいきのうよくせい</small> 骨髄機能抑制

熱が出る、体がゾクゾクして寒く感じる、体が重くて動きたくない感じがする	かんせんしやう 感染症
鼻血、歯ぐきからの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい	しゅつけつけいこう 出血傾向
体がゾクゾクして寒く感じる、ふらつき、汗をかく、熱が出る、ぼんやりしてまわりのことがよく分からなくなる、唇のまわりがはれる、息がしにくいと感じる、かゆみ、皮ふにブツブツができる	かびんしやうじやう 過敏症状
吐き気、胃がムカムカして気持ち悪い、胃のあたりで焼け付くような感じがする、吐く、食欲がない	しよくしやう 悪心、嘔吐、食欲不振等の 消化器症状
鼻血、つばや痰（たん）に血が混じる、血を吐く、歯ぐきからの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい	やくざいゆうはつせいけつしやうばんげんしやうしやう 薬剤誘発性血小板減少症
体が重くて動きたくない感じがする、めまい、息がハアハアして苦しくなる、目の白い部分が黄色っぽくなる、皮ふが黄色くなる、尿の色が濃くなる	ようけつせいひんけつ 溶血性貧血

- 患者さんや家族の方は、使用前に、この治療法の必要性や注意すべき点などについて十分に理解できるまで説明を受けてください。説明に同意した場合に使用が開始されます。
- 妊娠する可能性のある人又はパートナーが妊娠する可能性のある人は、この薬を使用している間および使用終了後一定期間の避妊の必要性について説明を受けてください。

4. ほかに知られている副作用

「3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと」に記載されている副作用のほか、比較的よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用
疲れやすい	ひるう 疲労
お腹が痛い、水のような便が出る、泥のようなゆるい便が出る	げり 下痢
疲れやすい、体が重くて動きたくない感じがする、力が入らない、吐き気、食欲がない	かんきのうしやうがい 肝機能障害

5. 保管方法

—

6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：第一三共エスファ株式会社 (<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>)

電話：お客様相談室 0120-100-601、受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日、当社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>