

筋緊張改善剤

処方箋医薬品[※] ※注意—医師等の処方箋により使用すること

エペリゾン塩酸塩錠

日本標準商品分類番号 871249

薬価基準収載

エペリゾン塩酸塩錠 50mg「日新」

EPERISONE HYDROCHLORIDE TABLETS 「NISSIN」

先発医薬品名:ミオナール[®]錠50mg[エーザイ]



●個装箱・PTPシートは40%縮小です。

●錠50mg



錠50mg(PTP:10錠シート)L:94mm×W:37mm

●錠剤・PTPシートは実物大です。

最新の電子化された添付文書(電子添文)は専用アプリ「添文ナビ」→  よりGS1データバーを読み取りの上、ご参照ください。
(01)14987081184047

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者



第一三共エスファ株式会社

URL <https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>

[お問い合わせ先]

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室

 0120-100-601 受付時間:平日9:00~17:30 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

[夜間・休日 緊急時のお問い合わせ先]

日本中毒情報センター第一三共エスファ受付  0120-856-838 受付時間:平日17:30~翌9:00及び土・日・祝日・弊社休日

エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 Drug Information

(一般的名称／エペリゾン塩酸塩)

規制区分	処方箋医薬品*
貯法	室温保存
有効期間	3年

承認番号	薬価収載	販売開始
22600AMX00811000	2014年12月	1992年7月

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」
有効成分	1錠中 日本薬局方エペリゾン塩酸塩50mg
添加剤	結晶セルロース、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、沈降炭酸カルシウム、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、カルナウバロウ

3.2 製剤の性状

販売名	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」
性状	白色の糖衣錠
外形	
大きさ	錠径: 7.3mm、錠厚: 3.9mm、重量: 140mg
識別コード	NS 11

4. 効能又は効果

- 下記疾患による筋緊張状態の改善
頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、腰痛症
- 下記疾患による痙攣性麻痺
脳血管障害、痙攣性脊髄麻痺、頸部脊椎症、術後後遺症(脳・脊髄腫瘍を含む)、外傷後後遺症(脊髄損傷、頭部外傷)、筋萎縮性側索硬化症、脳性小児麻痺、脊髄小脳変性症、脊髄血管障害、スモン(SMON)、その他の脳脊髄疾患

6. 用法及び用量

通常成人には1日量として3錠(エペリゾン塩酸塩として150mg)を3回に分けて食後に経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

本剤投与中に脱力感、ふらつき、眠気等が発現することがあるので、その場合には減量又は休業すること。なお、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.3 肝機能障害患者
- 9.3.1 肝障害のある患者
肝機能を悪化させることがある。
- 9.5 妊婦
妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
- 9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験(ラット)で乳汁中へ移行することが報告されている。
- 9.7 小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
- 9.8 高齢者
生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

10. 相互作用

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
メトカルバモール	類似薬のトルペリゾン塩酸塩で、眼の調節障害があらわれたとの報告がある。	機序は不明である。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

- 11.1.1 ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
発赤、瘙痒感、蕁麻疹、顔面等の浮腫、呼吸困難等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- 11.1.2 中毒性表皮壊死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(いずれも頻度不明)

発熱、紅斑、水疱、瘙痒感、眼充血、口内炎等の症状が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	0.1~5%未満	0.1%未満	頻度不明
肝臓	AST, ALT, AI-Pの上昇等		
腎臓	蛋白尿、BUNの上昇等		
血液	貧血		
過敏性	発疹	瘙痒	多形滲出性紅斑
精神神経系	眠気、不眠、頭痛、四肢のしびれ	体のこわばり、四肢のふるえ	
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢、便秘、口渴	口内炎、腹部膨満感	
泌尿器		尿閉、尿失禁、残尿感	
全身症状	脱力感、ふらつき、全身倦怠感	筋緊張低下、めまい	
その他	ほてり	発汗、浮腫、動悸	しゃっくり

注)発現頻度は製造販売後調査を含む。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

22. 包装

100錠[10錠(PTP)×10]
1000錠[10錠(PTP)×100]

*詳細は電子化された添付文書(電子添文)をご参照ください。電子添文の改訂に十分留意してください。

2024年1月改訂(第1版)

製造販売元

日新製薬株式会社
山形県天童市清池東二丁目3番1号

販売元(文献請求先及び問い合わせ先)

第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携

第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPEPE1L00801-1

2024年1月作成