

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。

薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

カムシア配合錠 LD「サンド」、カムシア配合錠 HD「サンド」

一般名： カンデサルタン シレキセチル (Candesartan Cilexetil) アムロジピンベシル 酸塩 (Amlodipine Besilate)	販売名	カムシア配合錠 LD 「サンド」	カムシア配合錠 HD 「サンド」
	形状（製剤写真等）		

1.どんな薬

- この薬は、血管を収縮する作用のあるアンジオテンシンⅡと呼ばれる物質の働きを^{おさ}抑える成分と、^{まつしょう}末梢の血管を広げる作用をもつ成分により、血圧を下げます。

2.この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ⊗ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。
 - ・過去にユニシア配合錠に含み込まれる成分、あるいは他のジヒドロピリジン系の薬で^{かびんしょう}過敏症のあった人
 - ・^{にんぶ}妊婦 または ^{にんしん}妊娠している可能性のある人
 - ・アリスキレンフマル酸塩を使用中の^{とうりょうびょう}糖尿病の人（ただし、他の血圧を下げる治^{りょう}療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の人を除く）
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
 - ・^{じんぞう}腎臓の動脈に^{きょうさく}狭窄のある人
 - ・高カリウム^{けっしょう}血症の人
 - ・^{りょう}嚴重な減塩療^{りょう}法中の人
 - ・低ナトリウム^{けっしょう}血症の人
 - ・心不全の人
 - ・過去に薬の使用で^{かびんしょう}過敏症のあった人
 - ・^{じんぞう}腎臓に障害のある人
 - ・^{とうせき}血液透析中の人
 - ・^{かんぞう}肝臓に障害のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には一緒に使用してはいけない薬や、一緒に使用する場合に注意が必要な薬、飲み物があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

3.この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

- この薬の使用により、以下のような症状があらわれることがあります。これらの症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用など
体がふわふわと浮いているような感じがする、ふらつき、頭がグルグルと回っている感じがする	めまい、ふらつき

尿 ^{にょう} の量が減る、むくみ、体が重くて動きたくない感じがする	腎 ^{じん} 機能の低下
体のしびれ、体に力が入らない、吐 ^は き気、吐 ^は く、下痢 ^{げり} 、お腹がパンパンになる感じがする	高カリウム ^{けっしょう} 血症
力が抜 ^ぬ けてだるく感じる、めまい、ふらつき、立ったときにめまいやふらつきを感じる、気を失う	急激な血圧低下

- 高所作業、自動車運転等：血圧が下がることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転など危険を伴^{ともな}う機械の操作には注意してください
- 手術前 24 時間はこの薬を使用しないことが望ましいので、手術を受ける場合、必ずこの薬を飲んでいことを医師に伝え、医師の指示に従ってください。
- この薬を使用中に妊娠^{にんしん}が判明した場合や妊娠^{にんしん}が疑われる場合は、速やかに医師に相談してください。
- 妊娠^{にんしん}する可能性がある人は、医師や薬剤師に、この薬が妊婦^{にんぶ}や胎児^{たいじ}・新生児に影響^{えいきょう}を及ぼす可能性があることについて説明を受け、十分に理解してください。特に、妊娠^{にんしん}の希望や予定のある人は、医師に相談してください。
- この薬の使用前および使用中も定期的に医師や薬剤師^{ざい}が妊娠^{にんしん}していないことを確認します。

4. ほかに知られている副作用

「3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと」に記載されている副作用のほか、比較적으로よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用
お腹が痛い、水のような便が出る、泥 ^{どろ} のようなゆるい便が出る	下痢 ^{げり}
頭の中にキーン、ジーというような音を感じる	耳鳴
顔や体が熱い感じがする	ほてり

5. 保管方法

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：サンド株式会社 (<https://www.sandoz.jp/>)

販売会社：第一三共エスファ株式会社 (<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>)

電話：お客様相談室 0120-100-601、受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日、当社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>