

適正使用のお願い

抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤

オランザピン製剤

オランザピン錠 2.5mg「DSEP」

オランザピン錠 5mg「DSEP」

オランザピン錠 10mg「DSEP」

オランザピンOD錠 2.5mg「DSEP」

オランザピンOD錠 5mg「DSEP」

オランザピンOD錠 10mg「DSEP」

オランザピン細粒

オランザピン細粒1%「DSEP」

劇薬、処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2023年9月

製造販売元 第一三共エスファ株式会社
販売提携 第一三共株式会社

抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(恶心、嘔吐)に 使用する場合の留意事項について

オランザピン製剤については、著しい血糖値の上昇、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡等の重大な副作用が認められることから、電子添文の「警告」等の項で注意喚起を行っています。本剤の使用にあたっては、下記の事項にご留意の上、適正にご使用くださいようお願い申し上げます。

1. 警告

1.1 著しい血糖値の上昇から、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡等の重大な副作用が発現し、死亡に至る場合があるので、本剤投与中は、血糖値の測定等の観察を十分に行うこと。[2.5、11.1.1 参照]

1.2 投与にあたっては、あらかじめ上記副作用が発現する場合があることを、患者及びその家族に十分に説明し、口渴、多飲、多尿、頻尿等の異常に注意し、このような症状があらわれた場合には、直ちに投与を中断し、医師の診察を受けるよう、指導すること。[8.1、8.3、9.1.1、11.1.1 参照]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

2.1 昏睡状態の患者[昏睡状態を悪化させるおそれがある。]

2.2 バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者[中枢神経抑制作用が増強される。]

2.3 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

2.4 アドレナリンを投与中の患者(アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療、又は歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く)[10.1、13.2 参照]

2.5 糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者[1.1、11.1.1 参照]

5. 効能又は効果に関する注意

〈抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(恶心、嘔吐)〉

本剤は強い恶心、嘔吐が生じる抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)の投与の場合に限り使用すること。

7. 用法及び用量に関する注意

〈抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(恶心、嘔吐)〉

7.1 本剤は、原則としてコルチコステロイド、5-HT₃受容体拮抗薬、NK₁受容体拮抗薬等と併用して使用する。なお、併用するコルチコステロイド、5-HT₃受容体拮抗薬、NK₁受容体拮抗薬等の用法及び用量については、各々の薬剤の電子添文等、最新の情報を参考にすること。

7.2 原則として抗悪性腫瘍剤の投与前に本剤を投与し、がん化学療法の各サイクルにおける本剤の投与期間は6日間までを目安とすること。

☆詳細は電子化された添付文書（電子添文）をご参照いただきますようお願い申し上げます。

最新の電子添文は以下のホームページに掲載しております。

- ・PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」：

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

- ・弊社ホームページ：

<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>

また、専用アプリ「添文ナビ」より、GS1 データバーを読み取ることでも電子添文等をご参照いただけます。

オランザピン錠「DSEP」



(01)14987081185341

オランザピン OD錠「DSEP」



(01)14987081185495

オランザピン細粒「DSEP」



(01)14987081185655

〔お問い合わせ先〕

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 **0120-100-601** 受付時間：平日9:00～17:30（土・日・祝日・弊社休日を除く）

製造販売元

第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPOLA1P00701-1

2026年2月作成