

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」、ロスバスタチン錠 5mg 「DSEP」、ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「DSEP」、ロスバスタチン OD 錠 5mg 「DSEP」

一般名： ロスバスタチンカルシウム (Rosuvastatin Calcium)	販売名	ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」	ロスバスタチン錠 5mg 「DSEP」	ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「DSEP」
	形状(製剤写真等)			

※ロスバスタチン OD 錠 5mg 「DSEP」の写真は省略しています

1.どんな薬

- この薬は肝臓のコレステロール合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを低下させます。[脂質異常症治療薬]

2.この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ⊗ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。
 - ・ 過去にロスバスタチン錠「DSEP」またはロスバスタチン OD 錠「DSEP」に含まれる成分で過敏症のあった人
 - ・ 肝臓の障害のある人（急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝がん、黄疸等）
 - ・ 妊婦または妊娠している可能性のある人、授乳中の人
 - ・ シクロスポリンを使用している人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
 - ・ おうもんきんゆうかいしやう横紋筋融解症こうじょうせんきのうていかいしやうがあらわれやすい人（アルコール中毒の人、甲状腺機能低下症のある人、血縁に遺伝性の筋疾患（筋ジストロフィーなど）の人がいる人、過去に薬剤性の筋障害があった人）
 - ・ じゅうしやうきんむりよくしやう重症筋無力症じゅうしやうきんむりよくしやうがある人、過去に重症筋無力症があった人
 - ・ 腎障害がある人、過去に腎障害のあった人
 - ・ 肝障害がある人、過去に肝障害があった人
- この薬には一緒に使用してはいけない薬や、一緒に使用する場合に注意が必要な薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

3.この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

- この薬の使用により、以下のような症状があらわれることがあります。これらの症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用など
鼻血、つばや痰（たん）に血が混じる、血を吐く、歯ぐきからの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい	血小板減少
手足のこわばり、手足のしびれ、力が抜けてだるく感じる、筋肉の痛み、尿が赤っぽい茶色になる	<small>おうもんきんゆうかいしやう</small> 横紋筋融解症
まぶたが重たく感じて目をあけにくくなる、まぶたが下がる、物が二重に見える、筋肉が疲れて、だるく感じる、食べ物が飲み込みにくい	<small>じゅうしやうきんむりよくしやう</small> 重症筋無力症 [特に <small>じゅうしやうきんむりよくしやう</small> 重症筋無力症 がある人、過

	去に <small>じゅうしやうきんむりよくしやう</small> 重症筋無力症 があった人]
尿の量が減る、むくみ、体が重くて動きたくない感じがする	腎障害 [特に腎障害がある人、過去に腎障害のあった人]
疲れやすい、体が重くて動きたくない感じがする、力が入らない、吐き気、食欲がない	肝障害 [特に肝障害がある人、過去に肝障害があった人]

4. ほかに知られている副作用

「3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと」に記載されている副作用のほか、比較的よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用
皮膚にできたできものや傷	<small>ほっしん</small> 発疹
尿が泡立つ、むくみ	<small>たんぱくによう</small> 蛋白尿
お腹が痛い	腹痛

5. 保管方法

[ロスバスタチン錠 2.5mg、5mg 「DSEP」]

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

[ロスバスタチン OD 錠 2.5mg、5mg 「DSEP」]

光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：第一三共エスファ株式会社 (<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>)

電話：お客様相談室 0120-100-601、受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日、当社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>