

# 患者向医薬品ガイド

2026年2月更新

## シロドシン錠 2mg 「DSEP」 シロドシン錠 4mg 「DSEP」 シロドシンOD錠 2mg 「DSEP」 シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」

### 【この薬は？】

販売名	シロドシン錠 2mg「DSEP」 SILODOSIN TABLETS 2mg「DSEP」	シロドシン錠 4mg「DSEP」 SILODOSIN TABLETS 4mg「DSEP」
	シロドシン OD錠 2mg「DSEP」 SILODOSIN OD TABLETS 2mg「DSEP」	シロドシン OD錠 4mg「DSEP」 SILODOSIN OD TABLETS 4mg「DSEP」
一般名	シロドシン Silodosin	
含有量 (1錠中)	2mg	4mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、前立腺肥大症の排尿障害改善剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、前立腺、尿道及び膀胱平滑筋の緊張を和らげ、前立腺肥大症に伴う排尿障害を改善します。

- ・次の病気の人に処方されます。

### **前立腺肥大症に伴う排尿障害**

- ・この薬は、体調がよくなつたと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## **【この薬を使う前に、確認すべきことは？】**

- 次の人には、この薬を使用することはできません。

- ・過去にシロドシン錠「DSEP」、シロドシン OD 錠「DSEP」に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

- 次の人には、特に注意が必要です。飲み始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・起立性低血圧(立ちくらみ)のある人
- ・腎臓に障害がある人
- ・肝臓に障害がある人

- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使う場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

- 降圧剤を飲んでいる人は必ず医師に告げてください。

## **【この薬の使い方は？】**

### **●使用量および回数**

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	シロドシン錠 2mg「DSEP」 シロドシン OD 錠 2mg 「DSEP」	シロドシン錠 4mg「DSEP」 シロドシン OD 錠 4mg 「DSEP」
一回量	2錠	1錠
飲む回数	1日2回(朝、夕食後)	

### **●どのように飲むか？**

[シロドシン錠 2mg「DSEP」、シロドシン錠 4mg「DSEP」]

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

[シロドシン OD 錠 2mg「DSEP」、シロドシン OD 錠 4mg「DSEP」]

この薬は、口の中で溶かして飲む薬です。舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして、唾液で飲み込みます。

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲むこともできます。

この薬は寝たままの状態では水なしで飲まないでください。

### **●飲み忘れた場合の対応**

決して2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れたときに気づいた場合には、その回は飲まずにとばして、次の決められた時間に1回分を飲んでください。

### **●多く使用した時（過量使用時）の対応**

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは?】

- ・射精障害が起こることがあるので、十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・起立時に血圧低下があらわれることがあります。起き上がる際には注意してください。
- ・めまいなどがあらわれることがあります。高所作業や自動車の運転など危険を伴う作業をする場合には注意してください。
- ・降圧剤を併用している場合は血圧低下があらわれることがあります。異常を感じたら、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

### 副作用は?

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。  
副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。  
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
失神 しつしん	短時間、意識を失い倒れる
意識喪失 いしきそうしつ	意識がなくなる
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。  
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、食欲不振、体がかゆくなる
頭部	短時間、意識を失い倒れる、意識がなくなる
眼	白目が黄色くなる
口や喉	吐き気
皮膚	皮膚が黄色くなる
尿	尿の色が濃くなる

## 【この薬の形は?】

販売名	シロドシン錠 2mg「DSEP」	シロドシン錠 4mg「DSEP」
PTPシート	 表面  裏面	 表面  裏面
剤形	フィルムコート錠	フィルムコート錠(割線入)
外形	  	  
大きさ	6.4mm(直径)	11.0mm(長径)、6.0mm(短径)
厚さ	約 3.2mm	約 3.7mm
重さ	約 104mg	約 208mg
色	白色～微黄白色	
識別コード	SI 2 EP	SI 4 EP

販売名	シロドシン OD錠 2mg「DSEP」	シロドシン OD錠 4mg「DSEP」
PTPシート	 表面  裏面	 表面  裏面
剤形	素錠(口腔内崩壊錠)	素錠(口腔内崩壊錠)(割線入)
外形	  	  
大きさ	6.4mm(直径)	8.0mm(直径)
厚さ	約 3.0mm	約 3.8mm
重さ	約 100mg	約 200mg
色	淡黄赤色	
識別コード	SI d2 EP	SI d4 EP

## 【この薬に含まれているのは?】

販売名	シロドシン錠 2mg「DSEP」	シロドシン錠 4mg「DSEP」
有効成分	シロドシン	
添加剤	ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、D-マンニトール、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウ	

販売名	シロドシン OD錠 2mg「DSEP」	シロドシン OD錠 4mg「DSEP」
有効成分	シロドシン	
添加剤	ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、マル酸ステアリルナトリウム、ステアリン酸、タルク、D-マンニトール、ラウリル硫酸ナトリウム、結晶セルロース、アミノアルキルメタクリレートコポリマーE、クロスポビドン、部分アルファー化デンプン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、スクロース、香料、アラビアガム、乳糖、プロピレングリコール、安息香酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、デキストリン	

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は?

- ・直射日光と湿気を避けて室温(1~30°C)で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら?

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は?】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社:第一三共エスファ株式会社(<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>)

お客様相談室

電話:0120-100-601

受付時間:9:00~17:30(土、日、祝日、当社休日を除く)