

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。

薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

### エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」

|                              |                  |                                                                                                          |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般名：<br>エゼチミブ<br>(Ezetimibe) | 販売名<br>形状（製剤写真等） | エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」<br> |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1. どんな薬

- この薬は、小腸における胆汁性及び食事性コレステロールの吸収を選択的に<sup>そがい</sup> 阻害することにより、血中のコレステロールを低下させます。

#### 2. この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ❌ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。
  - ・過去にエゼチミブ錠「DSEP」に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
  - ・HMG-CoA還元<sup>かんげん こうそそがいざい</sup>酵素阻害剤と一緒に使用する場合で、肝臓に重い障害のある人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
  - ・糖尿病の人
  - ・肝臓に軽度から重い障害のある人
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人
- この薬には一緒に使用する場合に注意が必要な薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

#### 3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

- この薬の使用により、以下のような症状があらわれることがあります。これらの症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

| 主な症状                                                | 考えられる副作用など                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 熱が出る、目の白い部分が黄色っぽくなる、吐き気、吐く、お腹の右上のほう<br>が痛い、皮ふが黄色くなる | <sup>たんせきしょう</sup> 胆石症【フィブラート系薬剤<br>(ベザフィブラートなど)を一<br>緒に使用する人] |

- 使用中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与が中止されます。

#### 4. ほかに知られている副作用

「3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと」に記載されている副作用のほか、比較的よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

| 主な症状                         | 考えられる副作用 |
|------------------------------|----------|
| 便が出にくい                       | 便秘       |
| 皮ふにブツブツができる                  | 発疹       |
| お腹が痛い、水のような便が出る、泥のようなゆるい便が出る | 下痢       |

## 5. 保管方法

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

## 6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：第一三共エスファ株式会社（<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>）

電話：お客様相談室 0120-100-601、受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日、当社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>