*2023年9月改訂(第3版)

貯法:室温保存 有効期間:36ヵ月 日本標準商品分類番号 874291

06

承認番号 販売開始 23100AMX00223 2021年12月

抗悪性腫瘍剤(プロテアソーム阻害剤)

毒薬、処方箋医薬品^{注)} 注射用ボルテゾミブ

ボルテソ"ミフ"注射用3mg「DSEP」

BORTEZOMIB FOR INJECTION DSEPI

注)注意-医師等の処方箋により使用すること

1. 警告

- 1.1 本剤の投与は、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例のみに行うこと。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。
- 1.2 治療初期は入院環境で医師の管理下にて適切な処置を行うこと。
- 1.3 国内の臨床試験において、本剤との因果関係の否定できない肺障害(間質性肺炎)による死亡例が認められている。海外ではまれであるが、国内では本剤との因果関係の否定できない肺障害(間質性肺炎、肺水腫、急性呼吸窮迫症候群、胸水等)がより高頻度に発生する可能性があるため、特に以下の事項に十分注意すること。[8.1、9.1.1、11.1.1 参照]
- 1.3.1 本剤による治療を開始するにあたり、胸部X線検 査、胸部CT検査等を実施し、異常の有無を確認し た上で、治療開始の可否を慎重に判断すること。
- 1.3.2 本剤による治療中及び治療後、特に治療開始後早期は、息切れ、呼吸困難、咳、発熱等の自覚症状や、胸部聴診所見、呼吸数等での異常の有無を慎重に観察すること。必要に応じて動脈血酸素飽和度や胸部CT検査等を適切に実施し、経過を観察すること。本剤による肺障害が疑われた場合には、投与中止も含め適切な処置を行うこと。

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

ボルテゾミブ、マンニトール又はホウ素に対して過敏 症の既往歴のある患者

3. 組成·性状

3.1 組成

販売名	有効成分	添加剤
ボルテゾミブ注射用 3mg「DSEP」	(1バイアル中) ボルテゾミブ3mg 含有	D-マンニトール30mg

3.2 製剤の性状

販売名	剤形	色・性状	pН
ボルテゾミブ注射用 3mg「DSEP」	凍結乾燥 注射剤	の博文は粉末	4.0~7.0 (本剤1バイアルを 生理食塩液3mL又 は1.2mLに溶解し たとき)

** 4. 効能又は効果

- 多発性骨髄腫
- マントル細胞リンパ腫
- 原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫

**5. 効能又は効果に関連する注意

〈多発性骨髄腫及びマントル細胞リンパ腫〉

[17. 臨床成績]の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。 [17.1.1-17.1.5 参照]

**6. 用法及び用量

〈多発性骨髄腫〉

通常、成人に1日1回、ボルテゾミブとして1.3mg/m²(体表面積)を以下のA法又はB法で静脈内投与又は皮下投与する。本剤は最低72時間空けて投与すること。

A法:

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、週2回、2週間(1、4、8、11日目)投与した後、10日間休薬(12~21日目)する。この3週間を1サイクルとし、2又は8サイクルまで投与を繰り返す。3又は9サイクル以降は、週1回、2週間(1、8日目)投与し、13日間休薬(9~21日目)する。この3週間を1サイクルとし、18サイクルまで投与を繰り返す。週1回投与への移行時期は併用する抗悪性腫瘍剤を考慮して選択すること。B法(再発又は難治性の場合に限る):

週2回、2週間(1, 4, 8, 11日目)投与した後、10日間休薬 (12~21日目)する。この3週間を1サイクルとし、投与を繰り返す。

8サイクルを超えて継続投与する場合には上記の用法・用量で投与を継続するか、又は維持療法として週1回、4週間(1、8、15、22日目)投与した後、13日間休薬($23\sim35$ 日目)する。この5週間を1サイクルとし、投与を繰り返す。

〈マントル細胞リンパ腫〉

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人に1日1回、ボルテゾミブとして 1.3mg/m^2 (体表面積)を1.4.8.11日目に静脈内投与した後、10日間休薬($12\sim21$ 日目)する。この3週間を1サイクルとし、6サイクルまで(6サイクル目に初めて奏効が認められた場合は8サイクルまで)投与を繰り返す。本剤は最低72時間空けて投与すること。なお、静脈内投与が困難な場合には、皮下投与することもできる。

〈原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫〉 通常、成人に1日1回、ボルテゾミブとして1.3mg/m²(体表面積)を1、4、8、11日目に静脈内投与又は皮下投与した後、10日間休薬(12~21日目)する。この3週間を1サイクルとし、投与を繰り返す。本剤は最低72時間空けて投与すること。

7. 用法及び用量に関連する注意

〈効能共通〉

- **7.1 本剤の投与については、以下の記載に従って、適切に減量、休薬又は投与中止の判断を行うこと。
 - 7.1.1 多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫
 - ・Grade 3/4*の副作用の場合(末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛を除く)

Grade 3以上の非血液毒性(末梢性ニューロパチー・神経障害性疼痛を除く)又はGrade 4の血液毒性に該当する副作用が発現した場合は、回復するまで休薬する。投与を再開する場合には、本剤の投与による有益性と危険性を慎重に検討した上で、下表を目安として減量等を考慮する。副作用が回復しない場合又は最低投与量(0.7mg/m²)でも再発する場合は、本剤の投与中止を考慮する。[8.6 参照]

Grade 3/4の副作用(末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛を除く)に対する減量の目安

副作用発現時の投与量	減量の目安
1.3mg/m ²	1.0mg/m ²
1.0mg/m ²	0.7mg/m ²
0.7mg/m ²	投与中止

・末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛について 本剤に起因すると考えられる末梢性ニューロパチー又 は神経障害性疼痛が発現した場合は、以下に示す用法 及び用量変更の目安に従って減量、休薬又は中止する こと。[8.4、11.1.3 参照]

末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛に対する用法及び用 量変更の目安

用法及び用量変更の目安
なし
40
1.3mg/m ² の場合1.0mg/m ²
へ減量又は1.0mg/m ² の場合
0.7mg/m ² へ減量
回復するまで休薬。症状が
回復した場合は、0.7mg/m ²
に減量した上で週1回投与に
変更
投与中止
校 分 中止

7.1.2 マントル細胞リンパ腫

新たなサイクルを開始する前に以下を確認すること。

- ・血小板数が $100,000/\mu$ L以上、好中球数が $1,500/\mu$ L以上及びヘモグロビン値が8g/dL以上であること。[8.6 参照]
- ・非血液毒性がGrade 1*又は投与前値に回復していること。

副作用発現時の用法及び用量変更の目安

副作用完現時の用伝及の用重変更の	
副作用	用法及び用量変更の目安
発熱を伴うGrade 3以上の好中 球減少症、7日間を超えて持続す るGrade 4の好中球減少症、血 小板数10,000/μL未満が発現し た場合	好中球数が750/μL以上、血小板数が25,000/μL以上に回復するまで最長2週間本剤を休薬する。 ・本剤休薬後も副作用が上記の基準まで回復しない場合には、本剤の投与を中止すること。 ・副作用が上記の基準まで回復した場合には、本剤の投与量を1段階減量して投与する。(1.3mg/m²の場合1.0mg/m²へ減量、1.0mg/m²の場合0.7mg/m²へ減量)
本剤投与日(各サイクルの第1日 目以外)に血小板数が25,000/μL 未満又は好中球数が750/μL未満 の場合	本剤の投与を最長2日間延期 し、2日を越える延期を要す る場合は本剤を休薬する。
Grade 3以上の非血液毒性が発現した場合(末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛を除く)	Grade 2以下に回復するまで本 剤を休薬する。回復した場合は 本剤の投与量を1段階減量して 投与する。(1.3mg/m²の場合 1.0mg/m²へ減量、1.0mg/m² の場合0.7mg/m²へ減量)
末梢性ニューロパチー又は神経 障害性疼痛が発現した場合	「7.1.1 末梢性ニューロパチー又は神経障害性疼痛について」に従うこと。[8.4、11.1.3 参照]

*NCI-CTCAE v4.0

〈多発性骨髄腫〉

- 7.2 未治療の多発性骨髄腫に対し、本剤単独投与での有効性 及び安全性は確立していない。
- 7.3 週1回投与への移行時期、本剤と併用する抗悪性腫瘍剤等 について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知した上で選択 すること。[17.1.1-17.1.4 参照]

〈マントル細胞リンパ腫〉

- **7.4 本剤単独投与での有効性及び安全性は確立していない。
- **7.5 本剤を含むがん化学療法については、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知した上で、患者の状態や化学療法歴に応じて選択をすること。[17.1.5 参照]
- **7.6 皮下投与の臨床試験成績は得られていない。

8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

- 8.1 肺障害があらわれることがあるので、息切れ、呼吸困難、胸水、咳、及び発熱等の自覚症状や、胸部聴診所見、呼吸数等での異常の有無を慎重に観察すること。また、必要に応じて動脈血酸素飽和度や胸部CT等の検査を適切に実施し、慎重に経過を観察すること。肺障害の危険因子は現時点では明確でないため、肺障害の既往歴のない患者においても、慎重な経過観察を行う必要がある。[1.3.1、1.3.2、9.1.1、11.1.1 参照]
- 8.2 心障害による死亡例、うっ血性心不全の急性発現又は増悪、心嚢液貯留、左室駆出率低下が報告されているため、心障害の既往や症状の危険因子がある場合には、患者の状態には十分に注意すること。[11.1.2 参照]
- 8.3 本剤の投与によりB型肝炎ウイルスの再活性化による肝炎があらわれることがあるので、本剤投与に先立って肝炎ウイルス感染の有無を確認し、本剤投与前に適切な処置を行うこと。[9.1.2、11.1.7 参照]
- 8.4 末梢神経障害があらわれることがあるので、灼熱感、知 覚過敏、感覚減退、錯感覚、不快感、神経障害性疼痛等 のニューロパチーの症状について観察すること。また、 末梢性ニューロパチーが発現する可能性のある薬剤を併 用する場合には注意すること。[7.1.1、7.1.2、9.1.3、 11.1.3 参照]
- 8.5 国内臨床試験では重度の発熱性好中球減少症、好中球減少症(好中球数減少)及び貧血(ヘモグロビン減少)が認められているため、頻回に臨床検査(血液検査等)を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.5 参照]
- 8.6 本剤は血小板減少症を引き起こすことが認められている。 本剤の投与前に毎回血小板数を確認すること。本剤投与 により発現した血小板減少に伴う胃腸出血及び脳出血の 報告例があるので、必要に応じ輸血を考慮すること。 [7.1.1、7.1.2、11.1.5 参照]
- 8.7 本剤の投与により悪心、下痢、便秘及び嘔吐の発現が認められており、制吐剤又は止痢剤による処置を要することがある。脱水症状を予防するため、必要に応じ補液及び電解質補充を行うこと。本剤の投与期間中は嘔吐又は下痢がみられるため、患者には脱水症状を避ける適切な対処方法を指導すること。浮動性めまい、頭部ふらふら感又は失神発作があらわれた場合には、医師の診察を受けるよう患者を指導すること。
 - また、イレウスが報告されているため、便秘を認めた患者は慎重に観察すること。[11.1.6 参照]
- 8.8 肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機 能検査を行うこと。[11.1.7 参照]
- 8.9 低血圧(起立性低血圧を含む)の管理には、必要に応じて 降圧剤の調節、水分補給、ミネラルコルチコイド又は交 感神経作動薬の投与等の支持療法を行うこと。[9.1.4、 11.1.8 参照]
- 8.10 疲労、浮動性めまい、失神、起立性低血圧、霧視が起こ ることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転 等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
- 8.11 腫瘍量の急激な減少に伴い、腫瘍崩壊症候群(tumor lysis syndrome)があらわれることがあるため、予防措置として、高尿酸血症治療剤の投与及び適切な水分補給等を考慮すること。急激に腫瘍量が減少した患者においては血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.9 参照]

〈原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫〉

8.12 本剤を使用する際には、関連文献(「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議公知申請への該当性に係る報告書」等)³⁾を熟読すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 間質性肺炎、肺線維症等の肺障害の既往歴のある患者 投与前に間質性陰影を認めた患者で致死的な急性肺障 害の経過をたどる例が報告されている。[1.3.1、1.3.2、 8.1、11.1.1 参照]
- 9.1.2 B型肝炎ウイルスキャリアの患者又はHBs抗原陰性で HBc抗体陽性若しくはHBs抗体陽性の患者

本剤の投与開始後は継続して肝機能検査や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。本剤の投与によりB型肝炎ウイルスの再活性化による肝炎があらわれることがある。[8.3、11.1.7 参照]

9.1.3 末梢性ニューロパチーの症状(足又は手のしびれ、疼痛又は灼熱感)や徴候のある患者

本剤の投与期間中に症状が増悪(Grade 3以上を含む) するおそれがある。[8.4、11.1.3 参照]

- 9.1.4 失神の既往や症状がある患者、低血圧が発現する可能性のある薬剤を投与中の患者及び脱水状態にある患者患者の状態を十分に観察すること。低血圧(起立性低血圧を含む)が投与期間を通じ報告されている。[8.9、11.1.8 参照]
- 9.1.5 経口血糖降下剤を併用した糖尿病患者

血糖値を注意深く観察し、経口血糖降下剤の用量に留 意して慎重に投与すること。海外臨床試験において、 低血糖及び高血糖が報告されている。

9.3 肝機能障害患者

本剤のクリアランスが低下し、副作用が強くあらわれるおそれがある。[16.6.2 参照]

9.4 生殖能を有する者

妊娠可能年齢にある女性においては本剤投与中及び投与 終了後一定期間は避妊するよう指導すること。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、原則として投与しないこと。動物実験では、妊娠ウサギの器官形成期にボルテゾミブを $0.05 \, \mathrm{mg/kg}(0.6 \, \mathrm{mg/m^2})$ 投与したところ、有意な着床後死亡の増加とそれに伴う生存胎児数の減少が認められた。これらの生存胎児は有意な体重の減少も示した。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の 継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。海外臨床試験において、65歳以上と65歳未満の患者で安全性及び有効性に差は認められなかったが、高齢者では一般に生理機能が低下している。

なお、年齢別でのGrade 3以上の有害事象の発現頻度は、再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第III相 試験 (039試験) の本剤群においては50歳以下で64% (27/42例)、 $51\sim64$ 歳で78% (128/165例)、65歳以上で75% (93/124例)であった。また、海外第II相試験 (024試験及び025試験)においては50歳以下で74% (29/39例)、 $51\sim65$ 歳で80% (104/130例)、66歳以上で85% (74/87例)であった。

10. 相互作用

ヒト肝ミクロソームを用いた*in vitro*試験より、ボルテゾミブがチトクロームP450 3A4、2C19及び1A2の基質であることが示されている。本剤とCYP3A4の基質、阻害剤又は誘導剤を併用している患者においては、副作用又は効果の減弱について注意深く観察すること。

10.2 併用注意(併用に注意すること)

	·—·	
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP3A4阻害剤	ケトコナゾール	これらの薬剤の
ケトコナゾール ^{注)}	(400mg/日を4日間	CYP3A4に対する
等	反復経口投与)と併用	阻害作用により、
	したとき、ボルテゾ	本剤の代謝が阻害
	ミブのAUCは35%増	される。
	加した ⁴⁾ 。	
CYP3A4誘導剤	リファンピシン	
リファンピシン等	(600mg/日を7日間	CYP3A4に対する
	反復経口投与)と併用	
	したとき、ボルテゾ	本剤の代謝が促進
	ミブのAUCは45%低	される。
	下した5)。	

注)国内では外用剤のみ発売

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を 行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 肺障害

間質性肺炎 $(0.2\%, 2.5\%^{\pm 1})$ 、急性肺水腫 $(0.5\%, 0.4\%^{\pm 1})$ 、胸水 $(0.1\%, 1.6\%^{\pm 1})$ 、急性呼吸窮迫症候群 $(0.1\%, 頻度不明^{\pm 1})$ があらわれることがある。国内の臨床試験及び市販後の報告において、本剤との因果関係の否定できない肺障害(間質性肺炎)による死亡例が認められており 11,21 、海外と比較して肺障害の発生頻度が高い可能性がある。なお、肺障害の対処方法及び可能性のあるリスク因子について臨床試験では確認されていない。急性骨髄性白血病に対し、本剤、ダウノルビシン塩酸塩及び高用量シタラビンの24時間持続点滴 $(2000 mg/m^2/H)$ を併用した海外の臨床試験において、本剤との因果関係を否定できない急性呼吸窮迫症候群による死亡が報告されている。[1.3.1, 1.3.2, 8.1, 9.1.1 参照

11.1.2 心障害

うっ血性心不全(1.3%)、心嚢液貯留(0.1%)、心原性ショック(0.1%)、心停止(0.1%)、心肺停止(頻度不明)があらわれることがある。また、投与前の左室駆出率に異常の無い患者においても左室駆出率低下が報告されている。海外臨床試験においてQT間隔延長の報告があるが、薬剤との関連性については明らかになっていない。再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第 \square 相試験において、本剤群及びデキサメタゾン群で発現した心障害の発現頻度はそれぞれ14%及び12%であった。そのうち心不全等(急性肺水腫、心不全、うっ血性心不全、心原性ショック、肺水腫)の発現頻度はそれぞれ<math>5%及び4%であった。[8.2 参照]

11.1.3 末梢神経障害

末梢性感覚ニューロパチー(28.2%)、神経障害性疼痛 (14.8%)、錯感覚(8.6%)、末梢性ニューロパチー (8.1%)、感覚減退(3.6%)、末梢性運動ニューロパチー (2.3%)、灼熱感(0.4%)があらわれることがあり、重症 の感覚性ニューロパチーも報告されている。本剤の投 与により、感覚障害による末梢性ニューロパチーが主 に認められるが、感覚障害と運動障害が混在する ニューロパチーの発現例も報告されている。末梢性 ニューロパチーに加えて、起立性低血圧やイレウスを 伴う重度の便秘等、一部の有害事象に自律神経ニュー ロパチーが関与している可能性があるが、十分な情報 は得られていない。また、本剤の投与により糖尿病性 ニューロパチー等の基礎疾患を悪化させる可能性があ る。再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外 第Ⅲ相試験においてGrade 2以上の末梢性ニューロパ チーを認めた患者では用量調整により末梢性ニューロ パチーの改善あるいは回復が51%で認められた。また、 海外第Ⅱ相試験においてGrade 3以上の末梢性ニュー ロパチーを発現した患者又はGrade 2のニューロパ チーを呈し、投与を中止した患者では、末梢性ニュー

ロパチーの改善あるいは回復が73%で認められた。 [7.1.1、7.1.2、8.4、9.1.3 参照]

11.1.4 ギラン・バレー症候群、脱髄性多発ニューロパチー(頻 度不明)

11.1.5 骨髄抑制

血小板減少(39.0%)、好中球減少(34.8%)、貧血 (21.9%)、白血球減少(17.9%)、リンパ球減少(10.9%)、 発熱性好中球減少症(2.8%)、汎血球減少(0.1%)があら われることがある。骨髄機能が抑制された結果、感染 症(敗血症性ショック等)や出血等の重篤な副作用が発 現することがある。再発又は難治性の多発性骨髄腫を 対象とした海外第Ⅲ相試験における重症の出血(Grade 3以上)の発現率は本剤群で4%、デキサメタゾン群で 5%であった。血小板数は各サイクルの11日目に最低値 に達し、通常は次サイクル開始前までに回復した。血 小板数の減少と回復のパターンは週2回投与の8サイク ルにわたり一貫しており、蓄積性の血小板減少症は認 められなかった。再発又は難治性の多発性骨髄腫を対 象とした海外第Ⅲ相試験において血小板数の最低値の 平均は、投与開始前の約40%であった。再発又は難治 性の多発性骨髄腫を対象とした海外第Ⅲ相試験におけ る投与開始前の血小板数と血小板減少症の重症度との 関係を以下の表に示す。[8.5、8.6 参照]

再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第Ⅲ相試験に おける投与開始前の血小板数と血小板減少症の重症度との関係

投与開始前の 血小板数 ^{注2)}	患者数 (n=331) ^{注3)}	10,000/µL 未満の 患者数(%)	10,000~ 25,000/µLの 患者数(%)
75,000/µL以上	309	8(3%)	36(12%)
50,000/μL以上 75,000/μL未満	14	2(14%)	11(79%)
10,000/μL以上 50,000/μL未満	7	1(14%)	5(71%)

注2)投与開始前の血小板数として50,000/ μ L以上を臨床試験の選択基準とした。注3)投与開始前のデータが1例で不明

11.1.6 イレウス(0.7%)

食欲不振、嘔吐、便秘、腹部膨満感等の症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。[8.7 参照]

11.1.7 肝機能障害

ASTの増加(0.7%)、ALTの増加(0.7%)、 γ -GTPの増加(0.6%)、ALPの増加(0.5%)及び血中ビリルビンの増加(0.6%)等を伴う肝機能障害(B型肝炎ウイルスの再活性化によるものを含む)があらわれることがある。<math>[8.3,8.8,9.1.2参照

11.1.8 低血圧

低血圧(3.0%)、起立性低血圧(2.2%)があらわれることがある。低血圧の機序は不明であるが、一部は自律神経ニューロパチーが関与している可能性がある。[8.9、9.1.4 参照]

11.1.9 腫瘍崩壊症候群(0.3%)

[8.11 参照]

11.1.10 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群)、中毒性 表皮壊死症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN) (頻 度不明)

11.1.11 発熱(12.4%)

本剤の投与日から翌日にかけて高頻度にGrade 1~2の薬剤性の発熱があらわれることがあるので、患者の状態を観察し、必要に応じて解熱剤等による処置を考慮すること。また発熱が持続する場合や呼吸器症状を伴う場合には、肺障害の可能性について注意すること。

11.1.12 可逆性後白質脳症症候群(頻度不明)

痙攣、血圧上昇、頭痛、意識障害、錯乱、視覚障害等 があらわれることがある。

11.1.13 進行性多巣性白質脳症(頻度不明)

本剤の治療期間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察し、意識障害、認知障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、言語障害等の症状があらわれた場合は、MRIによる画像診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

注1)日本人における発現率(多発性骨髄腫を対象とした静脈内投与における 国内臨床試験、特定使用成績調査及び使用成績調査、並びにマントル 細胞リンパ腫、多発性骨髄腫及び全身性ALアミロイドーシスを対象と した国際共同試験(日本人症例のみ)の集計)

11.2 その他の副作用

				I	
		10%以上	10%未満 5%以上	5%未満	頻度不明
	感染症	感染	帯状疱疹、	単純ヘルペス、	気管支肺炎、
			肺炎	鼻咽頭炎、敗血	白癬感染、
			71.74	症、口腔カンジ	
				ダ症、麦粒腫、	/14/
				感染性腸炎、膀	
				胱炎、中耳炎、	
				蜂巣炎、毛包炎	
	血液			出血、白血球数	
				増加、好中球数	
				増加、単球数増	
				加	
Ì	免疫系障害			過敏症	
Ì	代謝・栄養	食欲不振		体重減少、脱	高コレステ
	71720			水、高血糖、高	1
				尿酸血症、低ア	
				ルブミン血症、	
				低血糖症、高ア	
	耐机炉			ミラーゼ血症	高ナトリウ
	電解質			低カリウム血	
				症、低ナトリウ	ム皿症
				ム血症、高カリ	
				ウム血症、高カ	
				ルシウム血症	
	精神神経系		頭痛、不	浮動性めまい、	嗅覚錯誤
			眠症	うつ病、失神、	
				味覚異常、嗜	
				眠、神経痛、不	
				安、痙攣、傾	
				眠、体位性めま	
				()	
k	眼			-	角膜びらん、
	HIX			眼瞼炎、眼部腫	
				脹、ドライア	後天性涙腺
					炎、視力障
				1、散松胆	
	/IC TIM DD			호스트 > 트센	害
	循環器			高血圧、心房細	- 1
				動、動悸、頻	延長
				脈、期外収縮、	
				不整脈、心房粗	
				動、徐脈	
	呼吸器				喀血、上気
				嗽、鼻出血、咽	道の炎症、
				喉頭疼痛、鼻	咽頭不快感、
				漏、肺高血圧症	無気肺、胸
					膜炎、気胸
	消化器	下痢、悪	腹痛	消化不良、口内	
		心、便			下腺腫大
		秘、嘔吐		胃炎、鼓腸、胃	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		DACA GRAFT		腸出血、歯肉	
				炎、嚥下障害、	
				胃食道逆流、腸	
				炎、過敏性腸症	
				候群、歯周炎、	
				レッチング、舌	
				潰瘍、おくび、	
				齲歯	
	肝臓			肝機能異常	肝障害

	10%以上	10%未満 5%以上	5%未満	頻度不明
皮膚		発疹	そう痒症、脱毛 症、蕁麻疹、、 放出血、顔面腫 胀、紫斑、 紅斑、薬疹、 直汗疹、 皮膚 血 血 の の の の の の の の の の の の の の の の の	潤・有痛性 紅斑・発熱 を伴う皮膚 障害(Sweet 症候群)、丘
筋骨格		筋骨格痛	筋痙縮、筋痛、 筋力低下、骨 痛、筋骨格硬 直、関節炎	
腎臓・泌尿器			腎機能障害、排 尿障害(尿閉、 神経因性膀胱 等)、尿中血陽 性	ミクログロ ブリン増加、
全身	疲労、無力症	浮腫	悪寒、疼痛、倦 怠感、口渇、胸 痛、顔面浮腫	
その他			注射部位 静脈の位 反応、、 血中が、レーク 減少、総で、 下の2低、血・ でで、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、、 ので、、、 ので、、、 ので、、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、、 ので、 ので	CRP増加、 腫瘍熱、 PO ₂ 上昇、 血中クレア チニン減少、 総蛋白増加、

13. 過量投与

13.1 徴候、症状

推奨用量の2倍を超えた過量投与により、致命的な転帰を 伴う急性の症候性低血圧及び血小板減少症が報告されて いる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 静脈内投与

1バイアルを日局生理食塩液3.0mLで溶解して使用すること。

14.1.2 皮下投与

1バイアルを日局生理食塩液1.2mLで溶解して使用する

注射液の調製法

投与経路	ボルテゾミブ (mg/バイアル)	日局生理食塩液	ボルテゾミブ 最終濃度
静脈内投与	3.0mg	3.0mL	1.0mg/mL
皮下投与	3.0mg	1.2mL	2.5mg/mL

*14.1.3 本剤の取り扱い及び調製にあたっては、手袋を使用するなど慎重に行うこと。本剤が皮膚又は粘膜に触れた場合には、直ちに石鹸でよく洗うこと。

14.2 薬剤投与時の注意

本剤のバイアルは1回使い切りである。溶解後は8時間以内に使用すること。バイアル中の未使用残液は適切に廃棄すること。

14.2.1 静脈内投与

他の薬剤の混入を避けるため、本剤投与のためのルートを留置して実施すること。他の薬剤が投与されているルートを用いての投与は行わないこと。また、延長チューブを使用した際は、投与後速やかに日局生理食塩液でフラッシングを行うこと。

14.2.2 皮下投与

繰り返し皮下投与する場合には、左右の大腿部、腹部 等に交互に投与するなど同一注射部位を避けること。

15. その他の注意

15.2 非臨床試験に基づく情報

- 15.2.1 動物(サル及びイヌ)を用いた試験において、ボルテゾミブを体表面積換算で臨床推奨用量の約2~3倍量を静脈内投与することにより、心拍数増加、心筋収縮力減弱及び低血圧が認められ、死に至った。この心筋収縮力減弱及び低血圧の状態においても、陽性変力作用を示す薬剤あるいは昇圧剤投与に対する反応は認められた。イヌの試験において、致死用量ではQTc間隔の軽度な延長が認められた。)。
- 15.2.2 動物実験(ラット)において、0.20及び0.15mg/kg (1.20及び0.90mg/m²)群で精巣-精上皮の変性/萎縮及び低用量から卵巣黄体の単細胞壊死が認められた⁷⁾。
- 15.2.3 チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いた*in vitro*染色体 異常試験で、評価を行った最低用量である3.125µg/mL以 上で染色体異常誘発性(構造的染色体異常)を示した⁸⁾。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度


16.1.1 単独投与

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者に、ボルテゾミブ0.7、 1.0又は1.3mg/m²(各n=3、6又は5~7)を単独で、1日1回、 週2回、2週間(1、4、8、11日目)静脈内投与したときの1 日目及び11日目における血漿中ボルテゾミブ濃度を検討した。 各用量群の血漿中濃度推移は類似しており、速やかな分布 相とそれに続く緩やかな長い消失相を特徴とする二相性の 低下を示した。また、最終消失相における分布容積(Vz)よ り、ボルテゾミブの組織移行性が良好であることが示唆さ れた。投与日間での比較の結果、1日目と比較し、11日目 において、消失半減期 $(t_{1/2})$ の延長、全身クリアランス (CL)の低下が各用量群で見られた。このことに伴い、投与 終了時の血漿中濃度(C₀)並びに血漿中濃度-時間曲線下面 積(AUC)も1日目より11日目で高値を示した。一方、用量 間での比較の結果、Coに用量相関性は認められなかったが、 AUCに関しては各試験日において、個体間でのばらつきは 大きいが、用量相関性が認められた9)、10)。

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者にボルテゾミブを0.7、1.0又は 1.3mg/m²で静脈内投与したときの各試験日における血漿中ボルテゾミブの薬物動態パラメータ(解析法: ノンコンパートメントモデル)

薬物動態		0.7mg/m^2		1.0mg/m ²		1.3mg/m ²	
パラメータ	試験日	(n=3)		(n=6)		(n=5~7) ^{注)}	
1175-9		平均值	SD	平均值	SD	平均值	SD
C_0	1	73.75	7.89	144.92	179.31	185.84	57.65
(ng/mL)	11	130.68	71.97	147.19	72.33	187.03	54.31
AUC	1	14.04	0.70	28.58	24.86	46.50	19.89
(ng·hr/mL)	11	112.01	47.74	108.39	52.32	186.60	49.79
t _{1/2} (hr)	1	3.31	0.88	6.81	8.81	16.11	20.75
11/2(111)	11	64.59	30.29	32.46	12.91	57.39	24.92
CL(L/hr)	1	83.35	10.52	105.41	75.66	51.97	18.99
CL(L/III)	11	11.77	4.67	19.63	14.50	12.10	3.73
37-(I)	1	406.92	154.03	520.08	349.87	894.41	682.35
Vz(L)	11	978.51	263.13	731.69	242.35	957.81	350.40


注)1日目:n=7、11日目:n=5



再発又は難治性の多発性骨髄腫患者にボルテゾミブを0.7、1.0又は 1.3mg/m²で静脈内投与したときの各試験日における血漿中ボルテゾミブ濃度推移(平均値+SD)

16.1.2 単独又は併用投与

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫患者に、ボルテゾミブ0.7、1.0又は1.3mg/m²(各n=6、5~6又は3~4)を単独又はメルファラン及びプレドニゾロン併用で静脈内投与したときの血漿中ボルテゾミブ濃度を検討した。その結果、血漿中ボルテゾミブの薬物動態はボルテゾミブ単独投与時とメルファラン及びプレドニゾロン併用で大きく異ならなかった11)。



造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫患者にボルテゾミブ0.7、1.0又は1.3mg/m²を単独(B)又はメルファラン及びプレドニゾロン併用(VMP)で静脈内投与したときの血漿中ボルテゾミブ濃度推移(平均値+SD)

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫患者にボルテゾミブ0.7、1.0又は1.3mg/m²を単独又はメルファラン及びプレドニゾロン併用で静脈内投与したときの血漿中ボルテゾミブの薬物動態パラメータ(解析法: ノンコンパートメントモデル)

薬物動態		0.7mg/m ²		1.0mg/m ²		1.3mg/m ²	
パラメータ	投与法	(n=	=6)	(n=5~	~6) ^{注1)}	(n=3	~4) ^{注2)}
ハラメータ		平均值	SD	平均值	SD	平均值	SD
C _{0.08h}	単独	45.43	10.09	59.42	18.89	120.3	24.53
(ng/mL)	併用	34.40	5.799	69.50	19.46	88.87	19.57
AUClast	単独	28.82	14.64	62.56	24.80	115.0	28.67
(ng · hr/mL)	併用	26.69	12.87	82.77	13.83	75.59	20.43

注1)ボルテゾミブ単独投与時:n=6、メルファラン及びプレドニゾロン併用時:n=5 注2)ボルテゾミブ単独投与時:n=4、メルファラン及びプレドニゾロン併用時:n=3

16.1.3 単独投与

前治療歴のある多発性骨髄腫患者に、ボルテゾミブ 1.3mg/m^2 を単独で、1 H 1 lo、週2回、2週間(1、4、8、 1 H 1 H 1)皮下投与(n = 17)及び静脈内投与(n = 14)したとき 1 H 1 H 1日目における血漿中ボルテゾミブ濃度を検討した。その 結果、ボルテゾミブ皮下投与時のC max は静脈内投与時の 約1/10 であったが、AUClast は両投与間で大きく異ならな かった 1 2 2 (外国人データ)。

前治療歴のある多発性骨髄腫患者にボルテゾミブ1.3mg/m²を皮下投与及び静脈内投与したときの血漿中ボルテゾミブの薬物動態パラメータ(解析法: ノンコンパートメントモデル)

薬物動態	皮下投与(n=17)		静脈内投与(n=14)	
パラメータ	平均值	SD	平均值	SD
Cmax(ng/mL)	20.4	8.87	223	101
tmax(hr)注)	0.50	$(0.08 \sim 1.00)$	0.03	$(0.03 \sim 0.08)$
AUClast(ng · hr/mL)	155	56.8	151	42.9

注)中央値(最小値~最大値)

16.2 吸収

16.2.1 血漿蛋白結合率

ヒトにおけるボルテゾミブの血漿蛋白結合率は $78.9 \sim 85.7\%$ であった $(in\ vitro$ 、限外ろ過法、 $10 \sim 1000$ ng/mL $)^{13}$ 。

16.4 代謝

ヒトにおけるボルテゾミブの主な代謝経路は脱ホウ素化であり、ヒト肝ミクロソームを用いたin vitro試験より、ボルテゾミブが主にチトクロームP450 3A4、2C19及び1A2の基質であることが示されている。チトクロームP450 2D6及び2C9の寄与は小さい。また、ヒト肝ミクロソームを用いたin vitro試験より、ボルテゾミブによるチトクロームP450 1A2、2C9、2D6及び3A4への阻害能は弱いが(IC_{50} =>30 μ mol/L、>11.5 μ g/mL)、チトクロームP450 2C19に対する阻害能(IC_{50} =18 μ mol/L、6.9 μ g/mL)が示されているため、本酵素の基質である薬剤の血中濃度を上昇させる可能性がある。初代培養ヒト肝細胞を用いたin vitro試験より、ボルテゾミブ

によるチトクロームP450 1A2及び3A4の明確な誘導能は認められなかった。

代謝物の活性の有無:脱ホウ素化された代謝物は活性を示さない $^{14), \, 15)}$ 。

16.5 排泄

ヒトにおけるボルテゾミブの排泄経路は特定されていない。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害

クレアチニンクリアランス値(CrCL)で分類した様々な程度の腎機能を有する患者を対象に、ボルテゾミブの薬物動態試験を実施した。また、透析後にボルテゾミブを投与した透析患者も本試験に組み入れた。ボルテゾミブ0.7~1.3mg/m²を週2回静脈内投与したときの8日目のボルテゾミブのクリアランス(CL)は以下の通りであった 16 (外国人データ)。

腎機能の程度別の血漿中ボルテゾミブのCL(8日目)

腎機能の程度	≧60	40~59	20~39	<20	透析群
(CrCL)	$mL/min/1.73m^2$	$mL/min/1.73m^2$	$mL/min/1.73m^2$	$mL/min/1.73m^2$	迈川矸
n ^{注)}	12	9	9	3	8
平均值	30.5	29.6	28.9	27.7	24.7
SD	10.0	18.5	13.5	13.4	10.1

注)薬物動態評価対象例数

16.6.2 肝機能障害

ビリルビン値で分類した様々な程度の肝機能を有する患者を対象に、ボルテゾミブ $0.5\sim1.3$ mg/m²を週2回静脈内投与したときのボルテゾミブの用量で規格化したAUCは以下の通りであった $^{17),18)}$ (外国人データ)。[9.3参照]

肝機能の程度別の血漿中ボルテゾミブの用量で規格化したAUC(8日目)

肝機能の程度	施設基準値	施設基準値の	施設基準値の	施設基準値の
(ビリルビン値)	以下	>1.0~1.5倍	>1.5~3倍	>3倍
n ^{注)}	11	9	8	14
幾何平均值	52.2	51.9	85.0	83.2
変動係数(%)	25.7	90.7	26.6	57.1

注)薬物動態評価対象例数

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈多発性骨髄腫〉

17.1.1 海外第Ⅲ相比較試験(039試験)

再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する海外第Ⅲ相比較試験(039試験)における成績概要は以下のとおりであった。 $1\sim3$ 回の前治療歴を有する患者を対象とする無作為化非盲検群間比較試験のボルテゾミブ群では1.3mg/m²を静脈内投与した。腫瘍増殖抑制期間(TTP)は、デキサメタゾン群の3.5ヵ月(中央値)に対して、ボルテゾミブ群で6.2ヵ月(中央値)であった。生存期間のハザード比は、0.57(95%信頼区間0.40, 0.81; p<0.05)であった。なお、生存期間中央値は、全患者のボルテゾミブ群で16.6ヵ月であった以外は、追跡期間が短くすべて評価不能であった191、201。

海外第Ⅲ相比較試験(039試験)における有効性解析の要約

	全患者		前治療回数1回のみ		前治療回数>1回	
	ボルテ	デキサメ	ボルテ	デキサメ	ボルテ	デキサメ
	ゾミブ	タゾン	ゾミブ	タゾン	ゾミブ	タゾン
評価項目	n=333	n=336	n=132	n=119	n=200	n=217
TTP						
イベント数(%)	147(44)	196(58)	55(42)	64(54)	92(46)	132(61)
中央値(月)	6.2	3.5	7.0	5.6	4.9	2.9
(95%信頼区間)	(4.9, 6.9)	(2.9, 4.2)	(6.2, 8.8)	(3.4, 6.3)	(4.2, 6.3)	(2.8, 3.5)
ハザード比	0.	55	0.	55	0.	54
(95%信頼区間)	(0.44,	0.69)	(0.38,	0.81)	(0.41,	0.72)
p値 ^{注1)}	< 0.0	0001	0.0	019	< 0.0	0001
生存期間						
死亡患者数(%)	51(15)	84(25)	12(9)	24(20)	39(20)	60(28)
ハザード比	0.57		0.	39	0.	65
(95%信頼区間)	(0.40,	0.81)	(0.19,	0.81)	(0.43,	0.97)
p值 ^{注1)}	<0	.05	<0	.05	<0	0.05

注1)無作為化の層別因子により調整したLog-rank検定でのp値

331例中324例(97.9%)に副作用が認められた。主な副作用[10%以上を記載]は、下痢[173例52.3%]、悪心[172例52.0%]、疲労[131例39.6%]、血小板減少[109例32.9%]、食欲不振[100例30.2%]、便秘[99例29.9%]、嘔吐[96例29.0%]、末梢性ニューロパチー[93例28.1%]、発熱[67例20.2%]、錯感覚[65例19.6%]、無力症[64例19.3%]、貧血[63例19.0%]、頭痛[62例18.7%]、発疹[61例18.4%]、筋骨格痛[61例18.4%]、好中球減少[59例17.8%]、腹痛[54例16.3%]、呼吸困難[42例12.7%]、感染[39例11.8%]、末梢性感覚ニューロパチー[38例11.5%]であった²¹¹。[5、7.3 参照]

17.1.2 海外第Ⅲ相試験(MMY3002試験)

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫に 対する海外第Ⅲ相試験(MMY3002試験)における成績概要 は以下のとおりであった。

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫患者を対象とする無作為化非盲検群間比較試験において、メルファラン9mg/m²とprednisone*60mg/m²の併用療法(MP療法)とMP療法にボルテゾミブ^{注1)}(静脈内投与)1.3mg/m²を上乗せしたMPB療法を比較した。腫瘍増殖抑制期間(TTP)は、MP群の15.0ヵ月(中央値)に対して、MPB群で20.7ヵ月(中央値)であった。生存期間は、MP群の43.1ヵ月(中央値)に対して、MPB群では未到達であった²²⁾⁻²⁴⁾。

海外第Ⅲ相試験(MMY3002試験)における有効性解析の要約

每/F奶 血作的域(IVIIVI I 3002的域//C43 V/ 3/6 X/1上/作// V/ 安小				
	MPB	MP		
	n=344	n=338		
TTP				
イベント数(%)	101(29)	152(45)		
中央値(月)(95%信頼区間)	20.7(17.6, 24.7)	15.0(14.1, 17.9)		
ハザード比(95%信頼区間)	0.54(0.42, 0.70)			
p 値 ^{注2)}	0.000002			
生存期間				
死亡患者数(%)	109(32)	148(44)		
中央値(月)(95%信頼区間)	NE(46.2, NE)	43.1 (34.8, NE)		
ハザード比(95%信頼区間)	0.65(0.51, 0.84)			
p 値 ^{注2)}	0.00084			

注1)1サイクルを21日間として、ボルテゾミブ1.3mg/m2を、第1~8サイクルの第1、4、 8及び11日目、第9~18サイクルの第1及び8日目に静脈内投与。

340例中331例(97.4%)に副作用が認められた。主な副作用[10%以上を記載]は、血小板減少[164例48.2%]、好中球減少[163例47.9%]、末梢性感覚ニューロパチー[148例43.5%]、悪心[134例39.4%]、下痢[119例35.0%]、神経障害性疼痛[117例34.4%]、貧血[109例32.1%]、白血球減少[108例31.8%]、嘔吐[87例25.6%]、疲労[85例25.0%]、リンパ球減少[78例22.9%]、便秘[77例22.7%]、食欲不振[70例20.6%]、腹痛[63例18.5%]、感染[59例17.4%]、発熱[55例16.2%]、無力症[54例15.9%]、発疹[48例14.1%]、錯感覚[41例12.1%]、筋骨格痛[41例12.1%]、帯状疱疹[40例11.8%]、不眠症[35例10.3%]であった²¹⁾。[5、7.3 参照]

※:国内未承認

17.1.3 国際共同第Ⅲ相試験(MMY3007試験)

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫に 対する国際共同第Ⅲ相試験(MMY3007試験)における成績 概要は以下のとおりであった。

造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫患者680例(日本人患者24例を含む)を対象とする無作為化非盲検群間比較試験において、ボルテゾミブ^{注1)}1.3mg/m²(皮下又は静脈内投与)、メルファラン9mg/m²及びプレドニゾロン又はprednisone*60mg/m²の併用療法(MPB療法)とMPB療法にダラツムマブ(遺伝子組換え)16mg/kgを上乗せしたDMPB療法を比較した。主要評価項目である無増悪生存期間(PFS)は、DMPB群では未到達、MPB群で17.9ヵ月(中央値)(95%信頼区間:16.1~19.8)であり、DMPB群で統計学的に有意な延長を示した[ハザード比:0.51、95%信頼区間:0.39~0.67、p<0.0001^{注2)}]^{25)、26)}。

注1)1サイクルを21日間として、ボルテゾミブ1.3mg/m²を、第1~2サイクル の第1、4、8及び11日目、第3~18サイクルの第1及び8日目に皮下又は静 脈内投与。

注2)無作為化の層別因子により調整したLog-rank検定でのp値

※:国内未承認

333例(日本人11例を含む)中250例(75.1%)に副作用が認められた。主な副作用[10%以上を記載]は、血小板減少[115例34.5%]、好中球減少[104例31.2%]、末梢性感覚ニューロパチー[92例27.6%]、貧血[39例11.7%]であった 21 。[5.、7.3参照]

17.1.4 海外第Ⅲ相試験 (MMY3021試験)

前治療歴のある多発性骨髄腫患者に対する海外第Ⅲ相試験 (MMY3021試験)における成績概要は以下のとおりであった。1~3回の前治療歴を有する患者を対象とする無作為化非盲検非劣性試験の皮下投与群及び静脈内投与群ではボルテゾミブ1.3mg/m²を投与した。主要評価項目であるサイクル4までの全奏効率(ORR)は、皮下投与群、静脈内投与群ともに42%であり、非劣性が検証された。副次評価項目である腫瘍増殖抑制期間(TTP)及び1年生存率は、静脈内投与群で9.4ヵ月(中央値)及び76.7%、皮下投与群で10.4ヵ月(中央値)及び72.6%であった¹²)。

海外第Ⅲ相試験(MMY3021試験)における有効性解析の要約

14 / 1 / 14 1 M 10 4 (H- (4) (7)	122/01/01 - 20/10
	ボルテゾミブ静脈	ボルテゾミブ皮下
	内投与	投与
サイクル4までの全奏効率(ORR ^{注1)})		
評価例数	73	145
全奏効例数	31	61
ORR(%)	42	42
p 值 ^{注2)}	0.00201	
ORR比(95%信頼区間)	0.99(0.71, 1.37)	
TTP		
評価例数	74	148
中央値(月)(95%信頼区間)	9.4(7.6, 10.6)	10.4(8.5, 11.7)
ハザード比(95%信頼区間)	0.839(0.564, 1.249)	
p值 ^{注3)}	0.38657	
1年生存率(%)(95%信頼区間)	76.7(64.1, 85.4)	72.6(63.1, 80.0)

注1)CR+PR

注2)非劣性検定でのp値

注3)無作為化の層別因子により調整したLog-rank検定でのp値

ボルテゾミブを皮下投与した症例において、147例中124例(84%)に副作用が認められた。主な副作用[10%以上を記載]は、末梢性感覚ニューロパチー[51例35%]、血小板減少[44例30%]、好中球減少[34例23%]、神経痛[34例23%]、貧血[28例19%]、下痢[28例19%]、白血球減少[26例18%]、悪心[24例16%]、発熱[18例12%]であった。なお、皮下投与による局所注射部位反応は85例(58%)に認められた 27 。[5.、7.3 参照]

〈マントル細胞リンパ腫〉

** 17.1.5 国際共同第Ⅲ相試験(LYM3002試験)

造血幹細胞移植の適応とならない未治療のマントル細胞リンパ腫に対する国際共同第Ⅲ相試験(LYM3002試験)の成績概要は以下のとおりであった。

造血幹細胞移植の適応とならない未治療のマントル細胞リンパ腫患者を対象とする無作為化非盲検群間比較試験において、リツキシマブ(遺伝子組換え)375mg/m²、シクロホスファミド750mg/m²、ドキソルビシン50mg/m²、ビンクリスチン1.4mg/m²及びprednisone*100mg/m²の併用療法(R-CHOP療法 $^{\pm 1}$)と、R-CHOP療法のビンクリスチンをボルテゾミブに置き換えたVcR-CAP療法 $^{\pm 2}$)(ボルテゾミブ[静脈内投与]1.3mg/m²、リツキシマブ(遺伝子組換え)375mg/m²、シクロホスファミド750mg/m²、ドキソルビシン50mg/m²及びprednisone*100mg/m²)を比較した。無増悪生存期間(PFS)は、R-CHOP群の14.4ヵ月(中央値)に対して、VcR-CAP群で24.7ヵ月(中央値)に対して、VcR-CAP群で36.3ヵ月(中央値)に対して、VcR-CAP群では未到達であった 28)。

注2)無作為化の層別因子により調整したLog-rank検定でのp値

一	00=##40000 1= 10 19 00 1	17,51 E 31 1/1 × 2,45	
	VcR-CAP	R-CHOP	
	n=243	n=244	
PFS			
イベント数(%)	133(55)	165(68)	
中央値(月)(95%信頼区間)	24.7(19.8, 31.8)	14.4(12.0, 16.9)	
ハザード比(95%信頼区間)	0.63(0.50, 0.79)		
p 値 ^{注3)}	< 0.001		
生存期間			
死亡患者数(%)	71(29)	87(36)	
中央値(月)(95%信頼区間)	NE(56.0, NE)	56.3(47.2, NE)	
ハザード比(95%信頼区間)	0.80(0.59, 1.10)		
p值 ^{注3)}	0.173		

- 注1)21日間を1サイクルとして、リツキシマブ(遺伝子組換え)375mg/m²、シクロホスファミド750mg/m²、ドキソルビシン50mg/m²及びビンクリスチン1.4mg/m²(最大2mg)を1日目に静脈内投与並びにprednisone*100mg/m²を1~5日目に経口投与注2)21日間を1サイクルとして、ボルテゾミブ1.3mg/m²を1、4、8及び11日目に静脈内
- 注2)21日間を1サイクルとして、ボルテゾミブ1.3mg/m2を1、4、8及び11日目に静脈内 投与、リツキシマブ(遺伝子組換え)375mg/m²、シクロホスファミド750mg/m²及 びドキソルビシン50mg/m²を1日目に静脈内投与並びにprednisone*100mg/m²を 1~5日目に経口投与
- 注3)無作為化の層別因子により調整したLog-rank検定でのp値

※:国内未承認

240例(日本人7例を含む)中227例(94.6%)に副作用が認められた。主な副作用[10%以上を記載]は、好中球減少[190例79.2%]、血小板減少[163例67.9%]、白血球減少[100例41.7%]、貧血[86例35.8%]、下痢[57例23.8%]、末梢性感覚ニューロパチー[52例21.7%]、リンパ球減少[48例20.0%]、悪心[44例18.3%]、疲労[42例17.5%]、便秘[41例17.1%]、発熱性好中球減少症[36例15.0%]、発熱[33例13.8%]、食欲不振[31例12.9%]、無力症[29例12.1%]、神経痛[25例10.4%]であった210。[55、7.5 参照]

17.2 製造販売後調査等

再発又は難治性の多発性骨髄腫及び未治療の多発性骨髄腫患者を対象にボルテゾミブを静脈内投与した特定使用成績調査及び使用成績調査において、1186例中1060例(89.4%)に副作用が認められた。主な副作用[10%以上を記載]は、血小板減少[691例58.3%]、白血球減少[332例28.0%]、発熱[299例25.2%]、貧血[216例18.2%]、感覚減退[199例16.8%]、好中球減少[184例15.5%]、便秘[183例15.4%]、下痢[181例15.3%]、末梢性ニューロパチー[170例14.3%]、LDH増加[139例11.7%]、帯状疱疹[134例11.3%]、CRP増加[129例10.9%]、発疹[126例10.6%]であった²⁹⁾。

17.3 その他

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象にボルテゾミブを静脈内投与した国内臨床試験、及び未治療の多発性骨髄腫患者を対象にメルファラン及びプレドニゾロンとの併用でボルテゾミブを静脈内投与した国内臨床試験の安全性評価症例において、133例中133例(100%)に副作用が認められた。主な副作用[30%以上を記載]は、リンパ球減少[131例98.5%]、白血球減少[128例96.2%]、好中球減少[127例95.5%]、血小板減少[126例94.7%]、貧血[88例66.2%]、食欲不振[75例56.4%]、下痢[75例56.4%]、発疹[75例56.4%]、便秘[69例51.9%]、悪心[67例50.4%]、LDH増加[67例50.4%]、CRP増加[66例49.6%]、発熱[52例39.1%]、体重減少[52例39.1%]、末梢性ニューロパチー[52例39.1%]、低ナトリウム血症[51例38.3%]、ALP増加[51例38.3%]、倦怠感[50例37.6%]、嘔吐[47例35.3%]、肝機能異常[47例35.3%]、高血糖[44例33.1%]、高カリウム血症[41例30.8%]であった29)。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

- 18.1.1 ボルテゾミブは、腫瘍細胞のプロテアソームを阻害することにより、その増殖を抑制しアポトーシスを誘導する³⁰⁾。
- **18.1.2** ボルテゾミブは、細胞の増殖やアポトーシスを制御する転写因子NF- κ Bの活性化を阻害する 32)。
- 18.1.3 ボルテゾミブは、NF- κ Bの活性化を阻害することにより、骨髄腫細胞と骨髄ストローマ細胞の接着を阻害し、IL-6等のサイトカインの分泌を抑制し、骨髄腫細胞の増殖を抑制する $^{33)$ 、 34 。

18.2 薬理作用

- 18.2.1 ボルテゾミブは、in vitro試験において、ヒト骨髄腫由来 RPMI8226及びU266細胞株、ヒトマントル細胞リンパ腫 由来SP53、MINO、Grant 519及びJeko-1細胞株並びに 多発性骨髄腫及びマントル細胞リンパ腫患者から分離した 腫瘍細胞の増殖を抑制し、アポトーシスを誘導した。また、ドキソルビシン、ミトキサントロン、メルファラン又はデキサメタゾンに耐性となった骨髄腫細胞株に対しても増殖 抑制作用を示した300、340。
- **18.2.2** ボルテゾミブは、RPMI8226細胞株を移植した担癌マウス において、腫瘍の増大を抑制し、延命効果を示した 31 、 32 。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名:ボルテゾミブ(Bortezomib)

化学名: {(1R)-3-Methyl-1-[(2S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-

carboxamido)propanamido]butyl}boronic acid

分子式: C₁₉H₂₅BN₄O₄ 分子量: 384.24

性 状:白色~微黄白色の粉末又は塊

構造式:

分配係数: k₀=100.87(pH1~8) k₁<0.1(pH8.5以上) (1-オクタノール/水)

溶解性:2-プロパノール又はアセトニトリルに溶けにくい。

20. 取扱い上の注意

包装開封後もバイアルを箱に入れて遮光保存すること。

** 21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

22. 包装

3mg 1バイアル

23. 主要文献

- 1) ベルケイド適正使用ガイド(肺障害発現例の情報含む)
- 2) 向井陽美ほか:臨床血液 2011;52(12):1859-1869
- 3) 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請へ の該当性に係る報告書(ボルテゾミブ:原発性マクログロブリン 血症及びリンパ形質細胞リンパ腫)
- 4) Venkatakrishnan K, et al.: Clin Ther. 2009; 31: 2444-2458
- 5) Hellmann A, et al.: Clin Pharmacokinet. 2011; 50: 781-791
- 6) ボルテゾミブの毒性試験(ベルケイド注射用:2006年10月20日 承認、CTD2.6.2.4)
- 7) ボルテゾミブの毒性試験(ベルケイド注射用:2006年10月20日 承認、CTD2.6.6.3、2012年12月21日承認、CTD2.6.6.3) メルテゾミブの沙角体異常試験(ベルケイド注射用:2006年10
- 8) ボルテゾミブの染色体異常試験(ベルケイド注射用:2006年10 月20日承認、CTD2.6.6.4)
- 9) Ogawa Y, et al.: Cancer Sci. 2008; 99: 140-144
- 10) 社内資料: ボルテゾミブの国内第 I / II 相臨床試験(JPN-101) (ベルケイド注射用: 2006年10月20日承認、CTD2.7.6.2.7)
- 11) 社内資料: 血漿中ボルテゾミブの薬物動態パラメータ(ベルケイ ド注射用: 2011年9月16日承認、CTD2.7.2.3)
- 12) Moreau P, et al.: Lancet Oncol. 2011; 12:431-440
- 13) ボルテゾミブの蛋白結合率の検討(ベルケイド注射用: 2006年 10月20日承認、CTD2.6.4.4)
- 14) ボルテゾミブの代謝の検討(ベルケイド注射用:2006年10月20 日承認、CTD2.6.4.5)
- 15) ボルテゾミブ代謝物の活性の検討(ベルケイド注射用:2006年 10月20日承認、CTD2.6.2)
- 16) 社内資料: 腎機能障害患者におけるボルテゾミブの薬物動態試験(ベルケイド注射用: 2006年10月20日承認、CTD2.5.3)
- 17) LoRusso PM, et al. : Clin Cancer Res. 2012; 18: 2954-2963

- 18) 社内資料: 肝機能の程度別の血漿中ボルテゾミブの用量で規格 化したAUC(8日目)
- 19) Richardson PG, et al.: N Engl J Med. 2005; 352: 2487-2498
- 20) 社内資料: VELCADE for Injection Company Core Data Sheet
- 21) 社内資料:副作用・感染症の発現状況一覧表(M34101-039試験、MMY3002試験、LYM3002試験、MMY3007試験)
- 22) San Miguel JF, et al.: N Engl J Med. 2008; 359: 906-917
- 23) Mateos MV, et al.: J Clin Oncol. 2010; 28: 2259-2266
- 24) 社内資料:海外臨床第Ⅲ相試験(MMY-3002試験)(ベルケイド 注射用:2011年9月16日承認、CTD2.7.6.4)
- 25) 社内資料: DMPB療法を検討した国際共同第Ⅲ相試験 (MMY3007試験)(ベルケイド注射用: 2019年8月22日承認、 CTD2.7.6.1)
- 26) 臨床的有効性及び臨床的安全性に関する医療並びに機構における審査の概略(国際共同第Ⅲ相試験)(ベルケイド注射用:2019年8月22日 審査報告書)
- 27) 海外臨床第Ⅲ相試験(26866138-MMY-3021)(ベルケイド注射 用:2012年12月21日承認、CTD2.7.6.2.1)
- ** 28) Robak T, et al.: N Engl J Med. 2015; 372: 944-953
 - 29) 社内資料:副作用・感染症の発現状況一覧表(調査の合計、 JPN-101試験+JPN-102試験)
 - 30) Hideshima T, et al.: Cancer Res. 2001; 61:3071-3076
 - 31) ボルテゾミブの薬理作用(ベルケイド注射用:2006年10月20日 承認、CTD2.6.2.2)
 - 32) LeBlanc R, et al.: Cancer Res. 2002; 62: 4996-5000
 - 33) ボルテゾミブの薬理作用(ベルケイド注射用:2006年10月20日 承認、CTD2.6.2.2)
 - 34) Wang M, et al.: Leukemia. 2008; 22: 179-185

24. 文献請求先及び問い合わせ先

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-13-12 TEL:0120-100-601

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



第一三共エスファ株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋本町3-5-1

26.2 販売提携



第一三共株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋本町3-5-1