

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

セレコキシブ錠 100mg「DSEP」、セレコキシブ錠 200mg「DSEP」

一般名： セレコキシブ (Celecoxib)	販売名	セレコキシブ錠 100mg「DSEP」	セレコキシブ錠 200mg「DSEP」
	形状（製剤写真等）		

1. どんな薬

- この薬は、プロスタグランジンという炎症や痛みを起こすもとになる物質がつくられるのをおさえ、炎症をしずめたり、痛みをやわらげたりする働きがあります。[非ステロイド性消炎・鎮痛剤 (NSAID)]

2. この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。
 - ・過去にセレコキシブ錠「DSEP」に含まれる成分またはスルホンアミドで過敏症のあった人
 - *過敏症：体がゾクゾクして寒く感じる、ふらつき、汗をかく、熱が出る、ぼんやりしてまわりのことがよく分からなくなる、唇のまわりがはれる、息がしにくいと感じる、かゆみ、皮ふにブツブツができる
 - ・アスピリン喘息のある人、または過去にアスピリン喘息になったことがある人
 - *アスピリン喘息：非ステロイド性消炎・鎮痛剤などを使用したときに起こる喘息発作
 - ・消化性潰瘍のある人
 - ・肝臓に重い障害のある人
 - ・腎臓に重い障害のある人
 - ・心臓の働きがとても悪い人
 - ・心臓の血管の手術を受ける人
 - ・妊娠の最後の時期の人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
 - ・心臓や血管に障害のある人、または過去に心臓や血管に障害があった人
 - ・心臓に障害のある人
 - ・血圧が高い人
 - ・過去に消化性潰瘍になったことがある人
 - ・非ステロイド性消炎・鎮痛剤を長い間使用したことによる消化性潰瘍のある人で、この薬を長い間使用する必要があり、かつミソプロストールという成分の薬による治療を受けている人
 - ・気管支喘息の人
 - ・腎臓に障害のある人、または過去に腎臓に障害があった人
 - ・肝臓に障害のある人、または過去に肝臓に障害があった人
 - ・妊婦（妊娠の最後の時期の人を除く）または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には一緒に使用する場合に注意が必要な薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

- この薬の使用により、以下のような症状があらわれることがあります。これらの症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用など
胸がぎゅっとしめ付けられるような痛みがある、息がしにくいと感じる、冷汗が出る	心筋 梗塞
突然ぼーっとしてしまう、突然意識がなくなる、突然左右同じ側の手足が動かしにくくなる、急な頭の痛み、突然吐いてしまう、突然くらくらする、突然しゃべりにくくなる、急に言葉が出にくくなる	脳 卒中
ぼんやりしてまわりのことがよく分からなくなる、目の白い部分が黄色っぽくなる、皮ふが黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹がパンパンになる感じがする、急に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（明るい～黒ずんだ赤色または黒色に見える）	肝 不全
体が重くて動きたくない感じがする、吐き気、吐く、食欲がない、熱が出る、お腹の上のほうที่痛い、目の白い部分が黄色っぽくなる、皮ふが黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる	肝炎
疲れやすい、体が重くて動きたくない感じがする、力が入らない、吐き気、食欲がない	肝 機能 障害
目の白い部分が黄色っぽくなる、皮ふが黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる	黄疸
尿の量が減る、むくみ、体が重くて動きたくない感じがする	急性 腎 障害
熱が出る、皮ふにブツブツができる、手足などの節々が痛い、吐き気、吐く、下痢、お腹が痛い、むくみ、尿の量が減る	間 質性 腎炎
皮ふが広い範囲で赤くなり、やぶれやすい水ぶくれがたくさんできる、熱が出る、粘膜のただれ	中毒性 表皮 壊死 融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)
熱が出る、目が赤くなってただれる、唇や口内のただれ、周りが膨らんだ丸いブツブツがたくさんできる	皮膚 粘膜 眼 症候群 (Stevens-Johnson 症候群)
体がふわふわと浮いているような感じがする、ふらつき	浮動性 めまい
自分自身またはまわりがグルグル回っている感じがする、ふらつき	回転性 めまい
すぐ眠ってしまう	傾眠
息がしにくいと感じる、息がハアハアして苦しくなる、疲れやすい、むくみ、体重が増える	心機 能 障害
頭が痛い、肩がこる、めまい、ドキドキする、息がハアハアして苦しくなる、顔が赤くなり熱い感じがする、体が重くて動きたくない感じがする	血圧上昇
吐き気、吐く、吐いた物に血が混じる（赤、茶、黒などに見える）、お腹が痛い、胃がムカムカして気持ち悪い、黒い便が出る	消化性 潰瘍
息をするときゼーゼー、ヒューヒューと音がする、息がしにくいと感じる	喘息 発作
尿の量が減る、むくみ、体が重くて動きたくない感じがする	腎 障害

- 自動車運転など：浮動性 めまい、回転性 めまい、傾眠などが起こることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う作業をする場合は、十分に注意してください。

4.ほかに知られている副作用

「3.この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと」に記載されている副作用のほか、比較적으로よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用
お腹が痛い、水のような便が出る、泥のようなゆるい便が出る	げり 下痢
口の中や舌に白い膜ができて、なめらかでなくなる、食べたり飲んだりすると口に口の中が痛む、食べ物やつばが飲み込みにくい、口の中の傷やはれ、食欲がない	こうないえん 口内炎
皮膚にできたできものや傷	ほっしん 発疹

5.保管方法

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6.問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：第一三共エスファ株式会社（<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>）

電話：お客様相談室 0120-100-601、受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日、当社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>