


薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

デュタステリドカプセル 0.5mg AV 「DSEP」

一般名： デュタステリド (Dutasteride)
----------------------------------

販売名	デュタステリドカプセル 0.5mg AV 「DSEP」
形状（製剤写真等）	

1. どんな薬

- この薬は、**前立腺肥大症**のための薬で、ジヒドロテストステロンという**前立腺肥大**にかかわる物質が作られるのを防ぎ、**前立腺**が**肥大**するのを抑えます。

2. この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ⊗ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。  
過去にデュタステリドカプセル AV 「DSEP」に含まれる成分およびデュタステリドカプセル AV 「DSEP」と同じ働きをする他の薬で**過敏症**のあった人  
女性  
子ども  
肝臓に重い障害のある人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。  
肝臓に障害のある人
- この薬には一緒に使用する場合に注意が必要な薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

- この薬は皮膚を通して体内に吸収されることから、女性や子どもはカプセルから漏れた薬に触れないでください。漏れた薬に触れた場合には、ただちにせっけんと水で洗ってください。
- この薬は、**血清前立腺特異抗原\***に影響を与えるので、**前立腺癌**等の検査において**血清前立腺特異抗原**の検査を受けるときは、この薬を飲んでいることを検査を行う医師に伝えてください。  
(\*血清前立腺特異抗原：前立腺癌のスクリーニングにおける重要な指標)

4. ほかに知られている副作用

比較的好くみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用
疲れやすい、体が重くて動きたくない感じがする、力が入らない、吐き気、食欲がない、目の白い部分が黄色っぽくなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる	肝機能障害、黄疸
乳房がふくらむ、乳房のはれや痛み、乳房に熱っぽさを感じる	乳房障害（女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感）
性行為が可能なように陰茎が勃起しない	勃起不全

## 5. 保管方法

光と湿気をさけるため、PTP 包装のまま室温（1～30℃）で保管してください。

## 6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：第一三共エスファ株式会社 (<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>)

電話：お客様相談室 0120-100-601、受付時間：9:00～17:30（土、日、祝日、当社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>