

# エソメプラゾールカプセル 10mg 「DSEP」 エソメプラゾールカプセル 20mg 「DSEP」

## 【この薬は？】

販売名	エソメプラゾールカプセル 10mg「DSEP」 ESOMEPRAZOLE CAPSULES 10mg「DSEP」	エソメプラゾールカプセル 20mg「DSEP」 ESOMEPRAZOLE CAPSULES 20mg「DSEP」
一般名	エソメプラゾールマグネシウム水和物 Esomeprazole Magnesium Hydrate	
含有量 (1錠中)	11.1mg (エソメプラゾールとして 10mg)	22.3mg (エソメプラゾールとして 20mg)

## 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

## 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、プロトンポンプ・インヒビターと呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は胃の中で、酸分泌を抑えます。
- ・次の目的で処方されます。

エソメプラゾールカプセル 10mg 「DSEP」	エソメプラゾールカプセル 20mg 「DSEP」
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 胃潰瘍</li> <li>・ 十二指腸潰瘍</li> <li>・ 吻合部潰瘍</li> <li>・ 逆流性食道炎</li> <li>・ 非びらん性胃食道逆流症</li> <li>・ Zollinger-Ellison 症候群</li> <li>・ 非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制</li> <li>・ 低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 胃潰瘍</li> <li>・ 十二指腸潰瘍</li> <li>・ 吻合部潰瘍</li> <li>・ 逆流性食道炎</li> <li>・ Zollinger-Ellison 症候群</li> <li>・ 非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制</li> <li>・ 低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制</li> </ul>
<p>下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎</p>	

・この薬は、体調がよくなったと判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にエソメプラゾールカプセル「DSEP」に含まれる成分で過敏症のあった人
  - ・アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩を使用している人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・過去に薬剤で過敏症のあった人
  - ・肝臓に障害のある人
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人
- この薬には併用してはいけない薬[アタザナビル硫酸塩(レイアタツツ)、リルピビリン塩酸塩(エジュラント)]や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて医師が決めます。  
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

〔胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison 症候群の場合〕

〔成人〕

1 回量	20mg	
飲む回数	1 日 1 回	
飲む期間	胃潰瘍、吻合部潰瘍	8 週間まで
	十二指腸潰瘍	6 週間まで

〔1 歳以上の幼児及び小児〕

	体重 20kg 未満	体重 20kg 以上
1 回量	20mg	症状に応じて 10～20mg
飲む回数	1 日 1 回	
飲む期間	胃潰瘍、吻合部潰瘍	8 週間まで
	十二指腸潰瘍	6 週間まで

〔逆流性食道炎の場合〕

〔成人〕

逆流性食道炎	1 回量	20mg
	飲む回数	1 日 1 回
	飲む期間	8 週間まで
再発・再燃を繰り返す 逆流性食道炎の維持療法	1 回量	10～20mg
	飲む回数	1 日 1 回

〔1 歳以上の幼児及び小児〕

		体重 20kg 未満	体重 20kg 以上
逆流性食道炎	1 回量	10mg	症状に応じて 10～20mg
	飲む回数	1 日 1 回	
	飲む期間	8 週間まで	

〔非びらん性胃食道逆流症の場合〕

〔成人、1 歳以上の幼児及び小児〕

1 回量	10mg
飲む回数	1 日 1 回
飲む期間	4 週間まで

[非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合]

[成人]

1 回量	20mg
飲む回数	1 日 1 回

[低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合]

[成人]

1 回量	20mg
飲む回数	1 日 1 回

[ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の場合]

[成人]

1 回量	以下の 3 剤を同時に飲みます。 エソメプラゾールとして 20mg アモキシシリン水和物として 750mg(力価) クラリスロマイシンとして 200mg* (力価)
飲む回数	1 日 2 回
飲む期間	7 日間

\*クラリスロマイシンは必要に応じて適宜増量します。ただし、400mg(力価)が上限です。

[ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助(除菌治療が不成功の場合)の場合]

[成人]

1 回量	以下の 3 剤を同時に飲みます。 エソメプラゾールとして 20mg アモキシシリン水和物として 750mg(力価) メトロニダゾールとして 250mg
飲む回数	1 日 2 回
飲む期間	7 日間

●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に 1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回分を飛ばし、次に飲む時間に 1 回分を飲んでください。

●多く使用した時(過量使用時)の対応

脱力、ゆるい便、吐き気等が報告されています。異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用中に血液、肝機能、腎機能等の検査が行われることがあります。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

### 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
ショック	冷や汗が出る、めまい、顔面蒼白(そうはく)、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸(どうき)、息苦しい
汎血球減少症 はんけつきゅうげんしょうじょう	めまい、鼻血、耳鳴り、歯ぐきの出血、息切れ、動悸、あおあざができる、出血しやすい、発熱、寒気、喉の痛み
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
溶血性貧血 ようけつせいひんけつ	体がだるい、めまい、息切れ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい
劇症肝炎 げきしょうかんえん	急な意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
肝不全 かんふぜん	意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)
中毒性表皮壊死融解症 (TEN) ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしゅう (テン)	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、発熱、粘膜のただれ

重大な副作用	主な自覚症状
皮膚粘膜眼症候群（ステイブンス・ジョンソン症候群） ひふねんまくがんしょうこうぐん（ステイブンス・ジョンソンしょうこうぐん）	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱
間質性腎炎 かんしつせいじんえん	発熱、発疹、関節の痛み、吐き気、嘔吐（おうと）、下痢、腹痛、むくみ、尿量が減る
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
低ナトリウム血症 ていナトリウムけっしょう	吐き気、頭痛、嘔吐、けいれん、意識の低下
錯乱状態 さくらんじょうたい	注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをす る、行動にまとまりがない
視力障害 しりょくしょうがい	文字や形がみえにくい、視野の異常

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。  
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	脱力感、疲れやすい、発熱、体がだるい、むくみ、寒気、急激に体重が増える、ふらつき、出血が止まりにくい、出血しやすい、体がかゆくなる、突然の高熱、力が入らない、冷や汗が出る、けいれん
頭部	めまい、意識の消失、意識の低下、急な意識の低下、行動にまとまりがない、注意力が散漫になる、頭痛、問いかけに間違った答えをする
顔面	顔面蒼白、鼻血
眼	視野の異常、白目が黄色くなる、文字や形がみえにくい、目の充血やただれ
耳	耳鳴り
口や喉	咳、血を吐く、喉のかゆみ、喉の痛み、吐き気、嘔吐、歯ぐきの出血、唇や口内のただれ
胸部	息苦しい、息切れ、動悸
腹部	食欲不振、腹痛、お腹が張る
手・足	手足のこわばり、手足のしびれ、関節の痛み、手足が冷たくなる
皮膚	皮膚が黄色くなる、全身のかゆみ、じんま疹、あおあざができる、粘膜のただれ、発疹、皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
筋肉	筋肉の痛み
尿	尿が赤褐色になる、尿の色が濃くなる、尿量が減る

部位	自覚症状
便	下痢、便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)

## 【この薬の形は？】

販売名	エソメプラゾールカプセル 10mg「DSEP」	エソメプラゾールカプセル 20mg「DSEP」
PTPシート	 表面	 表面
	 裏面	 裏面
外形	 	 
剤形	硬カプセル剤(5号)	
内容物	ごく薄い黄色の腸溶性顆粒 (褐色の腸溶性顆粒を認めることがある。)	
色	キャップ:灰色 ボディ:ごく薄い黄赤色	キャップ:青色 ボディ:薄い黄赤色
長径(mm)	11.2	11.2
重さ(mg)	約78	約127
識別コード	DSEP エソメ10	DSEP エソメ20

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	エソメプラゾールカプセル 10mg 「DSEP」	エソメプラゾールカプセル 20mg 「DSEP」
有効成分	エソメプラゾールマグネシウム水和物	
添加剤	白糖・デンプン球状顆粒、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸ナトリウム、クエン酸トリエチル、モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート80 カプセル本体:ヒプロメロース、酸化チタン、塩化カリウム、黒酸化鉄、カラギーナン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄	白糖・デンプン球状顆粒、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸ナトリウム、クエン酸トリエチル、モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート80 カプセル本体:ヒプロメロース、酸化チタン、塩化カリウム、カラギーナン、三二酸化鉄、青色2号、黄色三二酸化鉄

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温(1～30℃)で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合には、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社: 第一三共エスファ株式会社

(<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>)

お客様相談室

電話: 0120-100-601

受付時間: 9:00～17:30(土、日、祝日、当社休日を除く)