

ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠「DSEP」 を服用される患者さんへの服薬指導をお願いします

● ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠「DSEP」の用法及び用量

ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠「DSEP」の1日の投与量はブローカ式桂変法により求められる右記の理想体重に基づく用量となります

女性患者さんの場合

女性患者さんの理想体重(kg) = (身長(cm) - 100) × 0.85

身長	136cm以上154cm未満	154cm以上173cm未満	173cm以上
理想体重	31kg以上46kg未満	46kg以上62kg未満	62kg以上
1回投与量	1錠 (200mg)	1錠 (200mg) と 2錠 (400mg) を 1日おき	2錠 (400mg)

男性患者さんの場合

男性患者さんの理想体重(kg) = (身長(cm) - 100) × 0.9

身長	134cm以上151cm未満	151cm以上169cm未満	169cm以上
理想体重	31kg以上46kg未満	46kg以上62kg未満	62kg以上
1回投与量	1錠 (200mg)	1錠 (200mg) と 2錠 (400mg) を 1日おき	2錠 (400mg)

● すべての患者さんへ、飲み忘れ時の注意をお願いします。

服用し忘れた場合は、絶対に**2回分まとめて一度に服用しない**でください。
1錠と2錠を交互に服用されている患者さんが**次**に服用する際は、**服用し忘れた日の分**を服用してください。

● 製品パッケージに貼付されている患者さん向けの服薬指導箋を患者さんにお渡しください。



✂ 該当しない服用方法のイラストには✕をつけてください。



● 1錠と2錠を交互に服用する患者さんへの服薬指導

1日目にヒドロキシクロロキン硫酸塩錠「DSEP」を1錠服用したら、2日目は2錠、3日目は1錠というように1日おきに服用する量が変わります。
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠「DSEP」のPTPシートをPTPシートホルダーにセットして、患者さんにお渡しください。患者さんには、PTPシートホルダーを活用して、間違えないようにお薬を服用するようご指導ください。

PTPシートホルダーの使い方

- PTPシートホルダーの中面に、PTPシートをセットします。
 - 1列のPTPシートを裏面が見えるように置き、切込みに挟んで固定します。
 - 2列のPTPシートを同様に固定します。
- ホルダーの表面と裏面を留めます
 - ホルダーを二つ折りにして、3ヶ所の「ツメ」をしっかり押し込みます。

