

ビカルタミド錠・OD錠「DSEP」 を服用される 患者さんのご家族の方へ



第一三共エスファ株式会社

ビカルタミド錠・OD錠「DSEP」

を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、前立腺がんに対する男性ホルモンの作用を抑制することで、
がん細胞の増殖を抑える前立腺がんの治療薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の
オーソライズド・ジェネリック (AG) 医薬品です。



*錠剤は実物大です。

服用中に注意していただきたいこと

乳房のふくらみ・痛み、肝機能の低下、からだや顔がほてる、多汗、勃起障害、性欲の低下などの症状があらわれることがあります。



〈乳房の痛み〉



〈ほてり〉



〈勃起障害〉

まれに次のような症状があらわれることがあり、〔 〕内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合は、服用をやめてすぐに医師の診察を受けてください。

- 発熱、発疹、からだのだるい、かゆみ、吐き気、食欲がない、皮膚や白目が黄色くなる〔劇症肝炎、肝機能障害、黄疸〕
- のどの痛み、発熱、歯ぐきや鼻などから出血しやすい、あおざがでる、出血が止まりにくい〔白血球減少、血小板減少〕
- 息切れがする、息苦しい、から咳がでる、発熱〔間質性肺炎〕
- からだのだるい、息切れがする、足がむくむ、急激な胸の痛みや圧迫感を感じる、冷や汗が出る〔心不全、心筋梗塞〕

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

(裏面も必ずお読みください)

ビカルタミド錠・OD錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用してかゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 肝臓の病気にかかっている方
- 他のお薬を服用している方

服用方法について

必ず医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。

- コップ1杯程度の水(またはぬるま湯)で飲んでください。
- (OD錠の場合)唾液や少量の水でも口の中で速やかに溶けるため、「水なし」でも「水あり」でも飲むことができます。ただし、口の粘膜から吸収されることはないので必ず唾液、または水で飲んでください。
- ご自身の判断で、服用する量や回数を変更しないでください。
- このお薬は、毎日つづけて服用することが大切です。医師または薬剤師の指示なしに、途中で服用するのをやめたりしないでください。
- **2回分を一度に飲まないでください。**



飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の服用時間がせまっている場合は1回分とばし、次の通常の服用時間に1回分を服用します。

- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光、湿気を避け、室温にて保管してください。
- 包装から出してお薬のまま保管しないでください。
- 他の人には絶対に渡さないでください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

オーソライズド・ジェネリック (AG) とは？

『きよたく許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

連絡先(医療機関名)



Daichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPBICIP00201-1

2019年5月作成

製造販売元

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPBIC1P00201-1

2019年5月作成