

ピルシカイニド塩酸塩 カプセル「DSEP」 を服用される 患者さんのご家族の方へ




第一三共エスファ株式会社

ピルシカイニド塩酸塩カプセル「DSEP」 を服用される患者さんとご家族の方へ


このお薬は頻脈性不整脈の治療薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の
オーソライズド・ジェネリック (AG※) 医薬品です。

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」



ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」



*カプセルは実物大です。

ピルシカイニド塩酸塩カプセル「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 心臓、肝臓、腎臓の病気にかかっている方
- 血液中のカリウム濃度が低い方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 過去に薬を服用して、かゆみや発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 他のお薬を服用している方



※オーソライズド・ジェネリック (AG) とは？

『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

服用方法について

- 服用量は、患者さんの年齢・症状に合わせて医師が決定し、適宜増減します。

通常 1日3回 服用	1回50mg (1日150mg)	医師判断により増量	1回75mg (1日225mg)
高齢者	1回25mg	患者さんの様子を みながら、医師が 服用量を判断	患者さんの様子を みながら、医師が 服用量を判断
透析患者 さん			患者さんの様子を みながら、医師が 服用量を判断

- 2回分を一度に飲まないでください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲む量を変えたり飲むのを止めないでください。

服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

胸部不快感、胃痛、口が渇く、頭痛、発疹、めまい、吐き気などの症状があらわれることがあります。



まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- 動悸、息切れ、胸の痛み、めまい、気を失う[心室細動、心室頻拍、洞停止、完全房室ブロック、失神、心不全]
- 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる[肝機能障害、黄疸]
- 全身倦怠感、尿量減少、手足や顔のむくみ[急性腎障害]

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

日常生活で注意していただきたいこと

めまい等があらわれることがありますので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作には注意してください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EP5RAGIP00101-1

2021年11月作成

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPSRAG1P00101-1
2021年11月作成