

あなたが飲むおくすりは グリメピリド錠「オーハラ」です

グリメピリド錠「オーハラ」は、すい臓にはたらきかけて
インスリンの分泌を促し、血糖*を下げのおくすりです。

	錠剤	PTPシート
0.5mg 錠	<p>おもて うら (実物大)</p>	
1mg 錠	<p>おもて うら (実物大)</p>	
3mg 錠	<p>おもて うら (実物大)</p>	

*ヘモグロビンA1c(HbA1c)、食後血糖、空腹時血糖
※2016年3月以降随時、錠剤とPTPシートが写真通りに変わります

おくすりの飲み方と量

あなたの症状などにあわせて、お医者さんが決めます。通常、1日0.5～1mgより開始し、1日1～2回朝または朝夕、食前または食後に服用します。維持量は通常1日1～4mgで、必要に応じて適宜増減し、1日最高投与量は6mgまで処方されます。

製造販売元

 大原薬品工業株式会社

販売元

 第一三共エスファ株式会社

おくすり(グリメピリド錠「オーハラ」)を飲む時に注意すること

- コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- 自分の判断でおくすりを中止したり、おくすりを変更したりすると病気が悪くなることがあります。
- 指示された時間に飲むのを忘れてしまったら、1回とばして次の指示された時間から飲んでください。
- 決して2回分を一度に飲まないでください。(低血糖症を起こすことがあります。)
- お医者さんまたは薬剤師の先生の指示通りに飲んでください。
- 誤って多く飲んだときには、お医者さんまたは薬剤師の先生に相談してください。
- 発熱、下痢、嘔吐おうとがあり、または食欲がないため食事ができないときは、お医者さんに連絡して指示を受けましょう。

低血糖の対処法

- だるさ、強い空腹感くうぷくかん、冷や汗、動悸どうき(胸がドキドキする)、手足のふるえ、意識が薄れるいしきうす、などの症状があらわれることがあります。その場合はすぐに砂糖あるいはブドウ糖を摂取し、意識が薄れてきた場合はただちに
お医者さんに連絡してください。
- α -グルコシダーゼ阻害剤(ベイスン、グルコバイ、セイブルなど)と併用をしているときに低血糖症状が認められた場合には**ブドウ糖**をとりましょう。

保護者の方へ

- 小さなお子様の場合には低血糖の症状が分からずに、自分で対処できないことがあるため、「低血糖かな?」と思う症状があらわれたときには砂糖やブドウ糖を摂取させ、よくならないときは主治医にみてもらうようにしてください。