

エゼチミブ錠 10mg「DSEP」 を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、血液中のコレステロールを下げるお薬です。
先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の
オーソライズド・ジェネリック(AG)※医薬品です。

エゼチミブ錠 10mg「DSEP」



●錠剤は実物大です。

※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは？

『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。
先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および
製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

エゼチミブ錠10mg「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などアレルギー症状がでたことのある方
- 肝臓、腎臓、甲状腺、または筋肉の病気にかかっている方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 他のお薬を服用している方

服用方法について

- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- **2回分を一度に飲まないでください。**
飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。
指示通りに飲み続けることが重要です。

服用中に注意していただきたいこと

- 筋肉の副作用として「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。
次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので、すぐに医師または薬剤師に相談してください。



！横紋筋融解症とは...

筋肉の細胞が壊れ、筋肉の痛みや脱力などが生じる症状をいいます。その際、大量の筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出ることで、腎臓がダメージを受け、腎臓の機能が低下する(尿が出にくくなるなど)こともあります。

- 副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。
- ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

保管方法

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温(1~30℃)で保管してください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPEZE1P00201-1

2021年4月作成