

ボグリボース錠「YD」を服用される患者さまへ

食後の過血糖を改善する糖尿病のくすりが処方されています。以下の点にご注意ください。

ボグリボース錠
0.2mg「YD」



ボグリボース錠
0.3mg「YD」



(1)この薬は食事の直前にお飲みください。

ごはんやパン等の食べ物とまざりあって効くくすりですので、**食事の直前**にお飲みください。もし食事前に飲み忘れたときには食事中にお飲みください。食後または空腹時にお飲みになると効果がおちます。

(2)低血糖症を起こすことがあります。

このくすりと他の糖尿病のくすりを併用した場合に、危険な低血糖症を起こすことがあります。

このくすりは砂糖の消化や吸収を遅らせます。他の糖尿病のくすりによる低血糖症に効果のある**砂糖やあめ玉は、このくすりをお飲みの時は効果がありません。必ずブドウ糖**をとってください。また、低血糖がおこったときには、主治医にご相談ください。なお、低血糖がおこっていることをご本人が気づかなかつたり、わからなかつたりすることがありますので、ご家族やまわりの方にも低血糖になった時の対処方法(ブドウ糖の服用)と医師への連絡を頼っておきましょう。


(3)不快な症状が気になる場合は主治医に相談してください。

(裏面も必ずお読みください)

低血糖症

・低血糖症とは

血液中の糖分がすくなくなった状態で、強い空腹感、脱力感、手指のふるえ、冷汗、動悸等が出現したり、体がだるい、生あくび、眼の焦点が合わない、頭重感、考えがまとまらない、おかしい行動、性格の変化、急に腹が立つなどの症状がでる場合もあります。ひどい場合には意識が無くなる事があります。低血糖症状は個人によって症状の出方が違い、同じ人では、だいたい決まっていますので、自分の低血糖の症状の特徴を知っておくことが大切です。これらの症状は血糖を上げることにより速やかに消失します。



・低血糖症が起ったら

低血糖症状を感じたらすぐ、**ブドウ糖(約10g)**を飲んでください。**ブドウ糖**はポケットやバッグ、引出しなどすぐ手のとどく所に持っていてください。あめ玉、氷砂糖やチョコレートなどは効果がありません。低血糖症状が起きたら落ち着いてすぐにブドウ糖を補給して、安静にしてください。

ブドウ糖

・低血糖症を起こさないために

低血糖症を予防するために主治医の指導を守り、くすりの量や飲み方、また食事療法・運動療法はきちんとお守りください。食事時間が遅れたり、運動や労働が過剰になったり、また空腹時の激しい運動は避けるようにしてください。



製造販売元
 株式会社 陽進堂
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

販売元
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携
 第一三共株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋本町3-5-1