

## ボセンタン錠 62.5mg「DSEP」を 服用される患者さんご家族の方へ

**このお薬は、肺動脈性肺高血圧症において肺動脈圧を下げる働きがあります。**

### ボセンタン錠「DSEP」を服用される前に

1. 胎児に影響を与えるおそれがあります。  
このお薬を飲んでいる間は、妊娠しないよう十分注意してください。  
服薬中は経口避妊薬の効果が低下する可能性がありますので、経口避妊薬単独での避妊を避け、服用前・服用中は毎月妊娠検査を受けてください。
2. このお薬を飲んでいる間は、肝臓の機能を損なうことがありますので、服用前及び服用中も毎月1回は肝機能の検査が行われます。  
服用開始後3ヵ月間は2週間に1度の検査が望ましいとされています。  
受診日を守ってください。
3. 貧血や血小板減少、白血球減少等を起こすことがあります。  
服用前と服用開始後4ヵ月間は毎月、その後は3ヵ月に1回、血液検査を受けてください。
4. めまいをひきおこすことがあります。  
自動車の運転及び危険を伴う機械の操作には十分注意してください。
5. お互いのお薬の作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、一般用医薬品も含めて他にお薬を使用している場合や新たに使用する場合は医師または薬剤師に必ずご相談ください。

(裏面も必ずお読みください)

## 服用方法について

### 1. 飲み合わせについて

グレープフルーツジュースはこのお薬に影響しますので、お薬といっしょに飲まないでください。また、セイヨウオトギリソウを含む食品は、このお薬の効果を弱くするおそれがありますので、控えてください。

### 2. 飲み忘れた場合

**2 回分を一度に飲まないでください。**

気がついた時すぐに 1 回分飲んでください。

ただし、次の服用時間が間近の場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

### 3. 誤って多く飲んだ場合

重度の血圧の低下が起こる可能性があります。

異常を感じたら医師または薬剤師に相談してください。

**医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。**

## 服用中に注意していただきたいこと

**次のような症状が起こった場合には、すぐに医師または薬剤師に相談してください。**

1. 服用中に、妊娠した可能性があると考えられた場合、直ちに受診してください。

2. 倦怠感、食欲不振、嘔吐 [重篤な肝機能障害]

3. めまい、のどの痛み、出血しやすい、疲れやすい、顔やまぶたの裏が白っぽい [汎血球減少、白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血（ヘモグロビン減少）]

4. 急激な体重増加、息切れ、動悸 [心不全、うっ血性心不全]

**この説明に書いてあることは、特に注意していただきたいことです。この他にも気になる症状がでた場合やこのお薬について何か分からないことがありましたら、医師または薬剤師に相談してください。**

EPBOS1P00101-1

2016 年 12 月作成