

アゾセミド錠「DSEP」

を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、体内の余分な水分を尿によって排泄し、むくみ(浮腫)などを改善するお薬です。

□ アゾセミド錠30mg「DSEP」

表 裏 側面



□ アゾセミド錠60mg「DSEP」

表 裏 側面



●錠剤は実物大です。

アゾセミド錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 無尿、肝性昏睡、体液中のナトリウム・カリウムが減少している方
- 妊婦、妊娠している可能性がある方、または授乳中である方
- 他のお薬を使用している方

(裏面も必ずお読みください)

服用方法について

- 通常、成人は1日1回2錠(アゾセミド錠30mg)または、1日1回1錠(アゾセミド錠60mg)を服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- 長時間作用型の利尿薬なので、**比較的ゆっくり排尿を促します。**
夜間の休息が特に必要な場合には、夜間の排尿を避けるため、午前中に服用してください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に1回飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして、次の服用時間から1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると、病気が悪化することがあります。指示通りに飲み続けることが重要です。

服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

主な副作用として、発疹、嘔気、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛、口渇、頻尿、めまい、耳鳴、頭痛、脱力感、倦怠感、筋痙攣、関節痛などが報告されています。

その他の重要な注意

- まれに下記のような症状があらわれ、【 】内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

・全身倦怠感、手足の震え、脱力感

【電解質異常(低カリウム血症、低ナトリウム血症など)】

・のどの痛み、発熱(高熱)、筋肉痛

【無顆粒球症、白血球減少】

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 服用中に妊娠された場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。授乳中の方は、授乳を避けてください。



連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPAZO1P00101-1

2022年1月作成