

アゾセミド錠「DSEP」

を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は、体内の余分な水分を尿によって排泄し、むくみ(浮腫)などを改善するお薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一のオーソライズド・ジェネリック(AG※)医薬品です。



●錠剤は実物大です。

アゾセミド錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 無尿、肝性昏睡、体液中のナトリウム・カリウムが減少している方
- 妊婦、妊娠している可能性がある方、または授乳中である方
- 他のお薬を使用している方

※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは？

『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

服用方法について

- 通常、成人は1日1回2錠(アゾセミド錠30mg)または、1日1回1錠(アゾセミド錠60mg)を服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- 長時間作用型の利尿薬なので、**比較的ゆっくり排尿を促します。**
夜間の休息が特に必要な場合には、夜間の排尿を避けるため、午前中に服用してください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に1回飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして、次の服用時間から1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると、病気が悪化することがあります。指示通りに飲み続けることが重要です。

服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

主な副作用として、発疹、嘔気、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛、口渇、頻尿、めまい、耳鳴、頭痛、脱力感、倦怠感、筋痙攣、関節痛などが報告されています。

その他の重要な注意

- まれに下記のような症状があらわれ、【 】内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

・全身倦怠感、手足の震え、脱力感

【電解質異常(低カリウム血症、低ナトリウム血症など)】

・のどの痛み、発熱(高熱)、筋肉痛

【無顆粒球症、白血球減少】

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 服用中に妊娠された場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。授乳中の方は、授乳を避けてください。



連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPAZO1P00201-1

2022年4月作成