

# フェブキソスタット錠「DSEP」

を服用される  
患者さんにご家族の方へ  
〈がん化学療法に伴う高尿酸血症〉



第一三共エスファ株式会社

# フェブキソスタット錠「DSEP」 を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬はがん化学療法に伴う高尿酸血症のお薬です。  
先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の  
オーソライズド・ジェネリック(AG※)医薬品です。

## ■ フェブキソスタット錠10mg「DSEP」



## ■ フェブキソスタット錠20mg「DSEP」



## ■ フェブキソスタット錠40mg「DSEP」




\*錠剤は実物大です。

## フェブキソスタット錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 腎臓の病気にかかっている方
- 肝臓の病気にかかっている方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 他のお薬を服用している方



## ※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは？


『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

## 服用方法について

- このお薬は1日1回服用します。
- がん化学療法開始1～2日前から**1回60mg**の服用を開始します。臨床症状及び血中尿酸値を確認しながら、化学療法開始5日目まで服用します。なお、状態に応じて服用期間を適宜延長します。



- 飲み忘れた場合
  - 化学療法前：医師に相談し、指示に従ってください。
  - 化学療法後：できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 2回分を一度に飲まないでください。**
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。**

## 服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、  
すぐに医師または薬剤師に相談してください。

痛風関節炎、関節痛、四肢不快感、四肢痛、  
下痢、倦怠感などの症状があらわれることが  
あります。



まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる【肝機能障害】
- 全身の皮疹や発疹【過敏症】

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPFEBIP00301-1

2022年5月作成

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)  
**第一三共エスファ株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携  
**第一三共株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPFEB1P00301-1  
2022年5月作成