

# セレコキシブ錠「DSEP」 を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は、「痛みのもと」をつくる酵素のはたらきを  
抑えることで、腫れや痛みを改善します。

## ☐ セレコキシブ錠100mg「DSEP」

表 裏 側面



## ☐ セレコキシブ錠200mg「DSEP」

表 裏 側面



●錠剤は実物大です。



## セレコキシブ錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、喘息、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 胃潰瘍などの胃腸の病気がある方
- 心臓、肝臓または腎臓の病気がある方
- 以前に心臓のバイパス手術などを受けたことがある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある方、または授乳中である方
- 他のお薬を使用している方

(裏面も必ずお読みください)

## 服用方法について

- このお薬は通常1日2回服用します。服用量は患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- 2回分を一度に飲まないでください。**  
飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示通りに飲み続けることが重要です。

## 服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

腹痛、下痢、口内炎、発疹、傾眠、胸の痛み、しゃべりにくい、体の片側や一部のまひ、息切れ、呼吸困難などの症状があらわれることがあります。



## その他の重要な注意

- 服用中に妊娠された場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。授乳中の方は、授乳を避けてください。
- めまいや傾眠（ぼんやりする）などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う作業をするときには十分注意してください。

ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPCEL1P00101-1

2020年5月作成