

# エシタロプラムOD錠「DSEP」 を服用される 患者さんとご家族の方へ



第一三共エスファ株式会社

# エシタロプラムOD錠「DSEP」

を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、脳内の神経伝達物質であるセロトニン濃度を上昇させ、憂うつな気分をやわらげ、不安などの症状を改善します。

## □ エシタロプラムOD錠 10mg「DSEP」



表



裏



側面



## □ エシタロプラムOD錠 20mg「DSEP」



表



裏



側面



\*錠剤は実物大です。

## エシタロプラムOD錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことのある方
- 心臓、腎臓、肝臓の病気にかかっている方
- 低カリウム血症の方
- CYP2C19の活性が遺伝的に欠損している方
- 自殺念慮、自殺企図の既往のある方
- 躁うつ病の方
- 脳の器質的障害のある方
- 統合失調症の素因のある方
- 衝動性が高い併存障害のある方
- てんかんなどけいれん性疾患のある方、または過去にもこれらの疾患と診断されたことがある方
- 出血傾向・素因のある方
- 閉塞隅角緑内障の方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 他のお薬を服用している方



(裏面も必ずお読みください)

## 服用方法について

- **このお薬は1日1回夕食後に服用します。**
- 通常1回10mg服用します。年齢・症状により、医師が適宜増量を判断し、1日最高用量は20mgです。増量は1週間以上の間隔をあけて行います。
- **必ず指示された服用方法に従ってください。**
- 唾液や水で飲み込んでください。ただし、寝たままの状態では服用する場合は、水で服用してください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- **2回分を一度に飲まないでください。**
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- **医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。**

## 服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

眠気、吐き気、めまい、頭痛、口の渇き、倦怠感、発疹、湿疹、蕁麻疹、かゆみ、アナフィラキシー反応、血管浮腫などの症状があらわれることがあります。



眠気

まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、ただちに医師の診療を受けてください。

- 筋肉が発作的に収縮する【**痙攣**】
- 急に精神的に落ち着かなくなる、手足の震え【**セロトニン症候群**】
- 頭痛、集中力の欠如、痙攣【**抗利尿ホルモン不適合分泌症候群**】
- 胸痛・胸部違和感、失神、動悸・息切れ【**QT延長、心室頻拍**】

## 日常生活で注意していただきたいこと

- 眠気、めまいなどがあらわれることがありますので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作を行う時は、注意してください。
- アルコールによって薬の作用が強くあらわれることがありますので、服用中の飲酒は控えてください。
- 健康食品であるセイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品は、セロトニン作用を強める可能性があるため、摂取は控えてください。
- 下記の精神症状があらわれることがありますので、あらわれた場合は医師に相談してください。
  - 急に精神的に落ち着かなくなる、発作的パニック状態、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動的行動、じっとしてられない、異常な気分の高揚の持続。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPESCIPO0201-1

2022年10月作成

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)  
**第一三共エスファ株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携  
**第一三共株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPESCIP00201-1  
2022年10月作成