

ビスプロロール fumarate 錠「DSEP」

を服用される 患者さんとお家族の方へ

虚血性心疾患または拡張型心筋症
に基づく慢性心不全



第一三共エスファ株式会社


ビソプロロール fumarate 「DSEP」

を服用される患者さんご家族の方へ



このお薬は虚血性心疾患や拡張型心筋症に基づく慢性心不全の治療薬です。

先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一のオーソライズド・ジェネリック (AG※) 医薬品です。

ビソプロロール fumarate 0.625mg「DSEP」



ビソプロロール fumarate 2.5mg「DSEP」



ビソプロロール fumarate 5mg「DSEP」



*錠剤は実物大です。

ビソプロロール fumarate 「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 心臓の病気にかかっている方
- 糖尿病の方
- アシドーシスの方
- 末梢神経障害、末梢循環障害のある方
- 未治療の褐色細胞腫の方
- 過去に薬を服用して、かゆみや発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 他のお薬を服用している方


※オーソライズド・ジェネリック (AG) とは？

「許諾を受けたジェネリック医薬品」という意味です。先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

服用方法について

- このお薬は1日1回服用します。
- このお薬は、1回0.625mgから開始し、医師の判断により増量する場合は、2週間以上の間隔で1.25mgに増量します。その後は、4週間以上の間隔で2.5mg、3.75mg、5mgと段階的に増量します。年齢・症状により適宜増減します。



- 2回分を一度に飲まないでください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。
- ただし、次の服用時間がせまっている場合は1回分とばし、次の通常の服用時間に1回分を服用します。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

徐脈、めまい、立ちくらみ、呼吸困難、倦怠感、浮腫などの症状があらわれることがあります。



まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- めまい、息切れ、むくみ **[心不全、完全房室ブロック、高度な徐脈、洞不全症候群]**

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

日常生活で注意していただきたいこと

飲み始めや服用量を増やした時には、めまい・ふらつきがあらわれることがありますので、自動車の運転などの危険を伴う機械の作業はしないでください。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPBISIP00201-1

2023年6月作成

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPBIS1P00201-1
2023年6月作成