

アジスロマイシン錠250mg「DSEP」

を服用される 患者さんにご家族の方へ

1回服用

- 尿道炎
- 子宮頸管炎



第一三共エスファ株式会社

1回服用

アジスロマイシン錠250mg「DSEP」

を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、抗生物質です。感染症の原因となる菌の増殖を阻止
または殺菌する作用があります。

アジスロマイシン錠250mg「DSEP」



*錠剤は実物大です。

アジスロマイシン錠250mg「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。


- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことのある方
- 心臓の病気にかかっている方
- 肝臓の機能が低下している方
- 妊婦・妊娠している可能性がある、または授乳中である方

服用方法について

- 1回4錠を服用してください。
1回の服用で約10日間、作用が持続します。

1日目

10日目



(裏面も必ずお読みください)

服用方法について(つづき)

- 処方されたお薬を、すべて1度に服用してください。
- このお薬は、食事による影響を受けませんので、食後まで服用を待つ必要がありません。すぐに服用いただけます。

服用中に注意していただきたいこと

- 1週間たっても症状の改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。

まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- 高熱
- 冷や汗、顔色が青白くなる
- 息苦しい
- 発疹
- 粘膜(口内、唇、眼など)のただれや水ぶくれ



これらの症状は、薬を飲み終わった直後や数日たってからあらわれることがあります。

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

その他の重要な注意

- このお薬を服用後に意識がもうろうとしたり気を失うことがありますので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作を行う場合には、十分に注意してください。
- 他の病院を受診する場合や薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。

連絡先(医療機関名)



製造販売元
全星薬品工業株式会社
大阪市阿倍野区旭町1-2-7



販売元
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPAZI1P00401-1
2024年2月作成

製造販売元



金星薬品工業株式会社

大阪市阿倍野区旭町1-2-7

販売元(文献請求先及び問い合わせ先)

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

販売提携



Daiichi-Sankyo

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPAZI1P00401-1

2024年2月作成