

# アジルサルタンOD錠「DSEP」

を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は血圧を下げるお薬です。



●錠剤は実物大です。

## アジルサルタンOD錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去にお薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方。
- 腎臓障害のある方、コントロール不良の糖尿病の方、減塩療法中の方。
- 肝障害のある方、脳血管障害のある方。
- 手術前の方、血液透析をしている方。
- 妊婦、妊娠している可能性がある方、または授乳中である方。
- 妊娠する可能性がある方または、妊娠の希望や予定のある方。
- 他のお薬を使用している方（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

（裏面も必ずお読みください）

## 服用方法について

- 通常、成人は主成分として20mgを1日1回服用します。年齢・症状により適宜増減されますが、1日最高用量は40mgです。必ず指示された服用方法に従ってください。
- このお薬は舌の上のにのせるとだ液で溶けますが、口の粘膜からの吸収により効果発現を期待する薬ではありませんので、だ液や水またはぬるま湯で飲み込んでください。
- 寝たままの状態飲む場合は、水またはぬるま湯で服用してください。
- **2回分を一度に飲まないでください。**  
飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間まで8時間以上あけるようにしてください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると、病気が悪化することがあります。指示通りに飲み続けることが重要です。

## 服用中に注意していただきたいこと

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

主な副作用として、発疹、湿疹、かゆみ、めまい、頭痛、下痢などが報告されています。

- 血圧が下がりすぎることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがありますので、高所での作業、車の運転など危険をとまなう機械の操作などには十分注意してください。

## その他の重要な注意

- まれに下記のような症状があらわれ、【 】内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

・顔・舌・のどが腫れる、息苦しい【**血管浮腫**】  
・冷たく感じる、吐く、意識がなくなる

【**ショック、失神、意識消失**】

・尿量が減る、顔や手足がむくむ、熱が出る【**急性腎障害**】  
・手足や唇がしびれる、筋力がおとろえる【**高カリウム血症**】  
・体がだるい、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる【**肝機能障害**】  
・筋肉痛、脱力感、赤褐色の尿【**横紋筋融解症**】

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。

上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 服用中に妊娠された場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。授乳中の方は、授乳を避けてください。



連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPAZL1P00201-1

2024年2月作成