


ポリコナゾール錠「DSEP」 を服用される 患者さんご家族の方へ



第一三共エスファ株式会社

ポリコナゾール錠「DSEP」 を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、真菌(カビの一種)によって起こる感染症を治療するお薬です。



*錠剤は実物大です。

ポリコナゾール錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 他のお薬を服用している方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 肝臓の機能が低下している方
- 不整脈がある方および不整脈を起こしやすい状態にある方
- 高齢の方



服用方法について

- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- 薬は通常、1日2回 食間(食事と食事の間)に服用してください。
- **2回分を一度に飲まないでください。**

飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。
ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして、
次の時間に1回分飲んでください。



医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、
服用を中止しないでください。

(裏面も必ずお読みください)

服用中に注意していただきたいこと


以下のような症状があらわれたら、すぐに医師・薬剤師にお知らせください。

- 風景がまぶしく見える(羞明^{しゅうめい})
- 眼がかすむ、霧がかかったようにものがかすんで見える(霧視^{むし})
- 景色の色が変化して青色や黄色などに見える(色覚異常)
- ものが見えにくい(視覚障害)
- 日光にあたった部分が赤くなったり、かゆくなったりする(光線過敏性反応)
- からだがだるい、全身のむくみ、ふらつき、高熱、冷や汗などの全身症状
- ひどい口内炎、嘔吐、吐き気、食欲不振、下痢などの消化器官の症状
- 胸が痛む、動悸がする、脈が速くなる、息苦しいなどの循環器官の症状
- 発疹やみずぶくれができる、じんましん、皮膚が黄色くなるなどの皮膚症状
- 手足のこわばり、しびれ、歩行困難、筋肉の痛みなどの運動器官の症状


この他にも、気になる症状があらわれた場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

次のような症状は、服用中や服用を中止した後も続くことがあります。


眼への影響



羞明^{しゅうめい}



霧視^{むし}



色覚異常

その他の重要な注意

- 症状が回復するまでは、自動車の運転等の危険を伴う機械操作は行わないでください。
- このお薬を服用している間は、定期的に肝機能検査等が行われます。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPVORIP00501-1

2024年2月作成

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPVORIP00501-1
2024年2月作成