

アトルバスタチン錠5mg・10mg「DSEP」 を服用される患者さんご家族の方へ

おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症について

お薬を服用していて次のような症状がみられましたら、
「横紋筋融解症」(裏面参照)の可能性が
あります。
このような症状がみられましたら、**お薬の服用を中止して、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。**



注意していただきたい初期症状



筋肉が痛い



手足の
ちからが
入らない



尿の色が濃い
(赤褐色になる)



全身がだるい

手足がしびれる・
こわばる



(裏面も必ずお読みください)



おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症とは

筋肉の細胞が壊れることにより、**筋肉の痛みや脱力などが生じる症状**をいいます。

その際、大量の筋肉の成分が血液中に流れ出て腎臓がダメージを受けてしまい、尿が出にくくなるなどの症状がみられることがあります。

腎臓を守るために適切な処置が必要です。表面に記載した**初期症状がみられた場合には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。**

お薬を服用していて体調がおかしいと感じましたら、
医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPATO1P00501-1

2024年2月作成