

ロスバスタチン錠「DSEP」

を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は、血液中のコレステロールを下げるお薬です。
先発医薬品と原薬、添加物および製法等が同一の
オーソライズド・ジェネリック(AG※)医薬品です。



●錠剤は実物大です。

※オーソライズド・ジェネリック(AG)とは？

『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。
先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

(裏面も必ずお読みください)

ロスバスタチン錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などアレルギー症状がでたことのある方
- 肝臓、腎臓、甲状腺、または筋肉の病気にかかっている方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 他のお薬を服用している方

服用方法について

- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- このお薬は1日1回服用します。
- **2回分を一度に飲まないでください。**
飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く1回分を飲んでください。
ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示通りに飲み続けることが重要です。

服用中に注意していただきたいこと

- 筋肉の副作用としてごくまれに「おうもんきんゆうかいしゅう横紋筋融解症」「じゅうしやうきんむりよくしやう重症筋無力症」が起こることがあります。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症または重症筋無力症の可能性がありますので、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

横紋筋融解症



重症筋無力症



- 副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。
- ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

保管方法

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPROS1P01201-1

2024年2月作成