

アマルエット[®]配合錠「DSEP」 を服用される 患者さんにご家族の方へ



第一三共エスファ株式会社

アマレット®配合錠「DSEP」 を服用される患者さんご家族の方へ

このお薬は、血圧と血液中のコレステロールを下げるお薬です。



*錠剤は実物大です。

アマレット®配合錠「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 肝臓や腎臓の病気にかかっている方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 他のお薬を服用している方

服用方法について

- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- このお薬は1日1回服用します。
- 2回分を一度に飲まないでください。**

飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分を飲んでください。
ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。

- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- グレープフルーツジュースはこのお薬に影響しますので、お薬といっしょに飲まないでください。



医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。
指示どおりに飲み続けることが重要です。

(裏面も必ずお読みください)

服用中に注意していただきたいこと

- 筋肉の副作用としてごくまれに「おうちもんきんゆうかいしやう横紋筋融解症」「じゆうしやうきんむりよくしやう重症筋無力症」が起ることがあります。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症または重症筋無力症の可能性があるので、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

横紋筋融解症



重症筋無力症



- 動悸、肝機能障害、頭痛、めまい、ふらつき、かゆみ、ほてり（熱感、顔面潮紅など）、腹痛、全身けん怠感などの症状があらわれることがあります。症状があらわれた場合には服用を中止し、医師または薬剤師に連絡してください。

- 副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。
- ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

その他の重要な注意

- 血圧が下がり、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高いところでの作業や車の運転など危険を伴う機械操作には十分に注意してください。



この他にも、気になることやこのお薬について何か分からないことがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPAMA1P00301-1

2024年2月作成

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)
第一三共エスファ株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPAMA1P00301-1
2024年2月作成