

ロスバスタチン錠 2.5mg/5mg「DSEP」 ロスバスタチンOD錠 2.5mg/5mg「DSEP」

を服用される患者さんとお家族の方へ

じゅうしょうきんむりよくしょう

重症筋無力症について

お薬を服用していて次のような症状がみられましたら、
「重症筋無力症」(裏面参照)の可能性が
あります。
このような症状がみられましたら、**お薬の服用を中止して、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。**



注意していただきたい初期症状



まぶたが下がって開かない



物が二重に見えたり、
眼の位置がずれて見える



むせやすい、飲み込みにくい



物を持ち続けることができない

(裏面も必ずお読みください)



じゅうしょうきんむりよくしょう

重症筋無力症とは

神経と筋肉が接している部分に異常が起こり、
神経からの刺激が筋肉側に伝わりにくくなり、
筋肉を縮める力が弱まる病気です。

筋肉を縮める力が弱まることで、疲れやすくなる、
筋肉に力が入らなくなるなどの症状がみられる
ことがあります。

表面に記載した初期症状がみられた場合には、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

お薬を服用していて体調がおかしいと感じましたら、
医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)



第一三共エスファ株式会社

EPROS1P01701-1

2024年2月作成