

ゾニサミドOD錠25mg「TRESEP」

を服用される
患者さんとご家族の方へ

レビー小体型認知症に伴うパーキンソンズム



第一三共エスファ株式会社

ゾニサミドOD錠25mgTRE「DSEP」 を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬は、レビー小体型認知症に伴う
パーキンソニズムを改善するお薬です。

ゾニサミドOD錠25mgTRE「DSEP」



表



裏



側面



*錠剤は実物大です。

ゾニサミドOD錠TRE「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことのある方
- 肝臓の病気にかかっている方
- 妊娠、妊娠している可能性がある、または授乳中である方
- 他にお薬を服用している方

服用方法について

- このお薬は、レボドパ含有製剤と一緒に、1日1回25mgを服用します。
- このお薬は舌の上にのせるとだ液で溶けますが、口の粘膜からの吸収により効果発現を期待する薬ではありませんので、だ液や水またはぬるま湯で飲み込んでください。
- 寝たままの状態で飲む場合は、水またはぬるま湯で服用してください。
- 2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。

- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。

医師の指示なしに、ご自分やご家族・介護者の判断でお薬の量を加減したり飲むのをやめないでください。

(裏面も必ずお読みください)



服用中に注意していただきたいこと

眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下があらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないでください。

次のような症状がみられましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

眠気、食欲不振、意思に反してからだが勝手に動く（ジスキネジア）、幻覚、吐き気、気力低下、めまい・ふらつき、腹部不快感、体重減少などの症状があらわれることがあります。



眠気



食欲不振



ジスキネジア

まれに次のような症状があらわれる可能性があります。このような場合は、使用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- 急激な発熱、筋肉のこわばり、手足のふるえ〔悪性症候群〕
- 発熱、広範囲の紅斑・水疱、皮膚の脱落
〔中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、紅皮症（剥脱性皮膚炎）〕
- 貧血症状、のどの痛み、全身倦怠感、出血傾向、発熱
〔再生不良性貧血、無顆粒球症、赤芽球癆、血小板減少〕
- 手足の筋肉の痛み、こわばり、しびれ〔横紋筋融解症〕
- 腰背部痛、腹痛、血尿〔腎・尿路結石〕

上記以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

連絡先（医療機関名）



第一三共エスファ株式会社

EPZON1P00201-1

2024年6月作成

