

モンテルカスト^{細粒}「DSEP」 を服用される 小児患者さんにご家族の方へ




第一三共エスファ株式会社

モンテルカスト細粒「DSEP」 を服用される小児患者さんご家族の方へ

このお薬は、空気の通り道である気道を広げて、
ぜんそくの発作がおこりにくい状態にします。

モンテルカスト細粒4mg「DSEP」



モンテルカスト細粒「DSEP」を服用される前に

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 他のお薬を服用している方

服用方法について

- 服用量は、患者さんの症状などにあわせて医師が決めます。
- 1日1回寝る前に服用します。
- スティック分包を開けたら、すぐに1包全部を飲んでください。
(目安は開封後、15分以内です)
- このお薬は口に直接入れるか、室温(30℃)以下のスプーン1杯(約5mL)程度の柔らかい食物、調製ミルクや母乳と混ぜて飲むこともできます。

また、服用後に水などを飲ませても大丈夫です。

- 2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。

ただし、次に飲む時間が近い場合は、1回とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。

- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。



お薬と混ぜてもOK!

医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、量を減らしたりすると、ぜんそくの症状が悪化することがあります。

指示どおりに飲み続けることが重要です。

(裏面も必ずお読みください)

服用中に注意していただきたいこと

以下のような症状があらわれたら、すぐに医師または薬剤師にお知らせください。

じんましん、吐き気、頭痛、発疹、のどの乾き、皮膚が乾燥するなどの症状があらわれることがあります。



じんましん



吐き気



頭痛



発疹

- 小さなお子さんの場合は、副作用であらわれる自覚症状を訴える能力が劣ります。お子さんの状態を十分に観察し、体調がおかしいと感じたら、速やかに医師または薬剤師にご相談ください。
- この他にも、気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

その他の重要な注意

このお薬は、すでに起こっているぜんそくの発作を速やかに止めるお薬ではなく、**発作を予防するお薬**です。発作を止めるには、他のお薬をご使用ください。

連絡先(医療機関名)



Daiichi-Sankyo

第一三共エスファ株式会社

EPMONIP00101-1

2017年6月作成

製造販売元

第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

EPMON1P00101-1

2017年6月作成