

ロキソプロフェンNaテープ50mg / 100mg「DSEP」

を使用される患者さんにご家族の方へ

ロキソプロフェンNaテープ「DSEP」は炎症・痛みを抑えます。

ロキソプロフェンNaテープ50mg「DSEP」



ロキソプロフェンNaテープ100mg「DSEP」



本剤は、原薬・添加物・製法および効能・効果が先発医薬品と同一のオーソライズド・ジェネリック(AG[※])です。

ロキソプロフェンNaテープ「DSEP」を使用される前に

✔ 次のような方はご使用になれません。

- このお薬の成分(ロキソプロフェンナトリウム水和物)に対してアレルギー症状が出たことのある方
- アスピリン喘息と診断されたことのある方
(一部の消炎鎮痛剤(痛み止めや風邪薬)の使用により喘息発作が出たことのある方)

✔ 次のような方は使用前に必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 気管支喘息のある方(アスピリン喘息を除く)
- 皮膚感染症のある方
- 妊婦又は妊娠している可能性のある女性

使用時の注意

1日1回貼りかえてご使用ください



貼る前に汗などの水分をふき取り、皮膚を清潔にしましょう。



傷や粘膜、発疹などがある部位への使用は避けましょう。



使用する部位は少しずつらし、皮膚を休ませる時間をとりましょう。



入浴前にはがし、入浴後30分くらいたってから貼り替えるようにしましょう。

保管上の注意

- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 内袋開封後はチャックを閉めて保管してください。
- 直射日光や高温の場所をさけ、1~30℃の温度で保管してください。

※ オーソライズド・ジェネリック(AG)とは

『許諾を受けたジェネリック医薬品』という意味です。

先発医薬品メーカーから許可を得て製造した、原薬、添加物および製法等が先発医薬品と同一のジェネリック医薬品です。

ロキソプロフェンNaテープ「DSEP」の貼り方


テープを軽く
折り曲げ、
中央のフィルム①
をはがします

肩





→ そのまま患部に
貼ります

→ 両側のフィルム②か③を片方ずつ、
肌にそって外側に引きながら患部に貼ります。



腰



関節への貼り方のコツ

関節などの動く部位に貼る時は、関節を曲げた状態で貼ると皮膚が引っ張られることなく貼れます。また、フィルムをはがす前にはさみで切り込みを入れたり、カットするなどひと工夫すると、よりはがれにくくなります。

半分曲げた状態で貼るか、
テープに切り込みを入れる

引っ張り
すぎない



切り込みの入れ方の例

A



テープの端中央に
切り込みを入れる

B




テープを真ん中で
折り曲げ、中央に
切り込みを入れる

A




B



はがし方のコツ

- 皮膚を押さえながらゆっくりはがしてください。
- 水やぬるま湯で濡らしてからはがすと皮膚への負担を軽くできます。
- 体毛のはえている方向に沿ってゆっくりはがしてください。

体毛の流れに沿って、
はがす角度を小さく、
ゆっくりはがす



クルクルと
丸めるようにはがす

